ANNALES DE PARASITOLOGIE

HUMAINE ET COMPARÉE

TOME V

1^{er} JUILLET 1927

N° 3

MÉMOIRES ORIGINAUX

CONTRIBUTION A LA FAUNE DES ŒSTRIDÉS DU CONGO BELGE

Par J. RODHAIN

Depuis la publication de notre dernier mémoire sur les diptères parasites de l'éléphant et du rhinocéros, qui constitue la troisième partie du travail entrepris en commun avec J. Bequaert (1) dans le but de contribuer à une étude monographique des diptères parasites de l'Afrique, j'ai pu réunir un matériel nouveau assez considérable concernant les œstridés du Congo belge.

J'avais espéré pouvoir en faire le dépouillement avec le concours de mon savant ami, actuellement professeur à la section tropicale de l'Université de Harvard, mais les circonstances l'empêchent momentanément d'apporter sa collaboration à ce travail, auquel sa science consommée d'entomologiste aurait donné plus d'ampleur.

Je dois une grosse part du matériel que j'étudierai dans ce mémoire au zèle intelligent de MM. Vermeesch et Henrotin, agronomes attachés à la station expérimentale d'Api-sur-l'Ouere. Grâce à eux, j'ai pu obtenir les insectes adultes des trois genres d'œstridés, *Pharyngobolus*, *Neocuterebra* et *Ruttenia*, dont les larves sont parasites de l'éléphant d'Afrique et dont les imagos étaient restées inconnues jusqu'ici.

(1) RODHAIN (J.) et BEQUAERT (J.). — Etudes monographiques des diptères parasites de l'Afrique. 3^e partie : diptères parasites de l'éléphant et du rhinocéros. *Bull. biol. de la France et de la Belgique*, LIII, p. 381.

Je suis donc très heureux de trouver ici l'occasion de les remercier, eux, ainsi que leur Directeur M. Magnette, pour la peine qu'ils ont bien voulu s'imposer pour m'aider dans mes recherches.

Je dois une autre part importante de matériel à MM. les Docteurs Dupuy et Minguens, les deux médecins résidents qui se sont succédés à Bukama. Ce sont eux qui m'ont fourni les larves recueillies dans la peau d'*Onotragus leche-leche* ainsi que les mouches de ces larves.

J'ai grand plaisir à leur exprimer ici mes vifs remerciements.

Je suis particulièrement reconnaissant aussi à Mme A. Maréchal qui s'est fort obligeamment chargée de l'exécution des dessins qui illustrent ce travail.

J'étudierai successivement dans ce mémoire :

- 1° La larve au deuxième stade et l'imago de *Neocuterebra squamosa* Grünberg.
- 2° L'insecte adulte et l'œuf de *Ruttenia loxodontis* Rodhain.
- 3° L'imago de *Pharyngobolus africanus* Brauer.
- 4° Les larves de *Strobilæstrus* et *Dermatæstrus*, du Katanga, et l'insecte adulte de ces parasites cuticoles.

I. — Larve au deuxième stade et insecte adulte de *Neocuterebra squamosa* Grünberg

1. LARVE AU DEUXIÈME STADE. — Le deuxième stade larvaire de *Neocuterebra squamosa*, parasite du pied de l'éléphant d'Afrique, n'avait pas été vu jusqu'ici. Nous en avons trouvé plusieurs spécimens parmi les envois qui nous ont été faits par MM. Vermeesch et Henrotin.

Les plus petites ne mesurent à l'état rétracté que 3 mm., 5 de long sur 2 mm., 25 de large.

La forme est cylindrique, avec un léger renflement vers le milieu; la couleur est brunâtre, l'extrémité antérieure est plus claire que la postérieure. Les anneaux 4 à 9 ont sensiblement la même largeur; l'anneau 10 est le plus large.

Le douzième segment, plus étroit, tranche par sa couleur pâle sur l'avant-dernier, dans lequel il est rétracté.

Spinulation. — Les segments 3 à 11 sont couverts d'épines plates, vraies écailles chitineuses en forme de lancette; ces productions sont plus fortes sur les anneaux postérieurs que sur les antérieurs. Rappelons ici que les productions épineuses similaires de la larve au troisième stade constituent des écailles à bords arrondis ou dentés.

Segments céphaliques. — Peu saillants ; bourrelets ocellaires sessiles, portant deux points ocellaires, l'un antérieur ovalaire, plus grand que le postérieur régulièrement arrondi. Les crochets buccaux sont bien développés. Le bourrelet labial antérieur est couvert de vraies épines appointées du type ordinaire. Le bourrelet qui se développe en arrière du cône buccal est dépourvu d'armature épineuse. Les stigmates antérieurs, dans les préparations microscopiques, sont visibles sous forme de deux tubes chitineux qui s'ouvrent au niveau de la cuticule par deux plaques annulaires de chitine, portant de minuscules orifices respiratoires.

Segment postérieur. — Le bord postérieur du 11^e anneau est inerme et tranche par sa couleur pâle sur la cuticule brune couverte d'épines des segments précédents. Il déborde le dernier anneau, est régulier et ne présente pas les deux lèvres saillantes qui le caractérisent chez la larve au 3^e stade.

Le 12^e anneau est emboîté dans l'avant-dernier, il est couvert d'épines vraies, petites et peu chitinisées, d'un jaune clair. L'aire stigmatique est entouré d'un repli saillant qui en arrière est orné de 4 petits bourrelets. Les pérित्रèmes stigmatiques se présentent sous l'aspect de deux fentes droites, à bords peu épaissis, montrant les pertuis ovalaires disposés en deux séries latérales. Chez une larve qui commençait sa dernière mue, ces fentes stigmatiques mesuraient 84 à 86 μ de long sur 20 μ , 15 de large.

Remarque au sujet de la situation des larves de Neocuterebra squamosa dans la plante des pieds des éléphants. — On sait, d'après les observations de Chapin (1), que les larves de *Neocuterebra* se rencontrent dans les couches profondes du derme de la plante des pieds. Mais en face de l'affirmation de Zenker, qui dit avoir recueilli les premières larves décrites par Grünberg, dans le tissu adipeux de la plante du pied, j'ai demandé à M. Vermeesch de s'assurer de la situation précise des parasites.

Voici ce qu'il m'écrivit à ce sujet, à l'occasion d'un envoi de larves, parmi lesquelles se trouvaient des exemplaires au deuxième stade que je viens de décrire :

« La plante du pied montrait de nombreuses crevasses. Les
« larves furent découvertes dans la partie cartilagineuse qui sépare
« la graisse de la corne du pied. Après avoir enlevé la couche de
« graisse qui adhère à cette substance cartilagineuse, on remar-
« quait, à l'endroit où les larves étaient logées, une coloration vio-
« lette rougeâtre (espèce d'inflammation), alors que les endroits
« sains sont plutôt jaunâtres.

(1) CHAPIN. — Cité par J. Rodhain et J. Bequaert (mémoire mentionné plus haut).

« En incisant l'endroit légèrement congestionné, on tombe sur
 « la larve ou la galerie proche dans laquelle elle est logée. La gale-
 « rie mène en oblique, vers une des nombreuses crevasses de la
 « corne du pied, crevasses souvent obstruées par de la terre.

« Aucune trace de galerie n'a été remarquée dans la graisse, en
 « dehors de la substance cartilagineuse. Toutes les larves se tien-
 « nent exactement ou presque à la même profondeur et dans la
 « même position, bien que, comme le dit Chapin, elles sont dispo-
 « sées très irrégulièrement, et comme j'ai pu voir, presque toujours
 « dans la direction de la crevasse qui mène de la plante du pied
 « vers l'intérieur. »

Il semble donc bien que les larves ne pénètrent pas dans la pelote de tissu conjonctif qui forme un coussinet à la plante du pied du grand pachyderme, et que leur présence peut déterminer à la limite du derme et du tissu cellulaire sous-cutané une légère hyperémie, très localisée.

2. INSECTE ADULTE DE *Neocuterebra squamosa* Gr. — J'ai reçu d'Api deux adultes 1 ♀ et 1 ♂ de *Neocuterebra* ainsi que les pupes dont les imagos étaient issus. Les larves d'où provenaient les pupes avaient été trouvées dans les litières des éléphants, et il y a tout lieu de supposer qu'elles étaient sorties d'elles-mêmes de la plante des pieds des pachydermes, par les orifices qu'on trouve dans la corne de la peau, à la face plantaire.

FIG. 1. — Pupa de
Neocuterebra
squamosa. $\times 2$.

PUPE. — Les chrysalides dont sont sortis les imagos mesurent l'une 20 mm. de long sur 11 mm. de plus grande largeur, l'autre 16 mm. sur 8. Elles ont une forme ovalaire allongée, légèrement renflée dans la moitié postérieure. Les stigmates postérieurs sont enfouis profondément dans une fente verticale dont les lèvres sont constituées par la marge postérieure du 11^e anneau, marge dont les saillies latérales se sont rapprochées au point de se rejoindre sur la ligne médiane (fig. 1).

Les stigmates antérieurs fortement saillants apparaissent sous forme de deux petits anneaux jaunes frisés. Lors de l'éclosion, il se détache un opercule correspondant à la portion dorsale des 5 premiers segments.

IMAGO. — Voici les caractères principaux des deux mouches ♂ et ♀ que nous possédons :

Femelle plus grande que le mâle. ♀ 22 mm. sur 6 mm. Couleur

semblable dans les deux sexes. Grosse mouche trapue, d'une couleur bleue sombre, métallique avec beaux reflets verdâtres, surtout sur la partie dorsale de l'abdomen. Tête relativement petite, un peu plus étroite que le thorax. Yeux écartés dans les deux sexes ; plus rapprochés chez le mâle que chez la femelle. Thorax aussi large que long ; abdomen globuleux, recourbé en bas, plus large que le thorax. Les deux recouverts d'une pilosité noire qui sur les flancs et la face ventrale du thorax devient plus longue et plus dense. Pattes noires robustes, moyennement longues, portant une pilosité noire. Griffes puissantes. Ailes longues enfumées, dépassant le corps en arrière.

Tête. — Front saillant ; bande frontale médiane, large, plissée longitudinalement, élargie surtout chez la ♀ vers le ptilidium, elle est rétrécie vers le sommet du triangle ocellaire qui porte des ocelles volumineux et une touffe de poils noirs (Pl. I, fig. 5). Région orbitaire avec reflets bleus métalliques plus large chez la femelle que chez le mâle et portant des poils. Yeux d'un brun clair, nus, relativement petits, ne descendant pas chez la femelle en-dessous de la moitié supérieure de la tête. Face allongée, développée en bas et en arrière. Lunule se prolongeant entre les antennes, en une carène large à laquelle fait suite un clypeus allongé, déprimé dans sa partie inférieure élargie en épistome triangulaire. Cupules antennaires ovalaires, ouvertes vers le bas. Antennes, rouges-jau-nâtres, deux premiers articles courts, le troisième développé en lame de courbet et portant un long chète nu. Gènes avec plis irréguliers et garnies de poils noirs. Péristome allongé latéralement et en arrière. Appareil buccal rudimentaire, palpes globuleux portant chacun une touffe de poils. Trompe courte coudée en arrière et en bas.

Cuillerons. — Développés, fortement enfumés, le thoracique plus volumineux que l'alaire.

Ailes. — Enfumées sur toute leur étendue, plus longues que larges ; alule étroite et allongée. Quatrième nervure longitudinale recourbée en une nervure transverse apicale et rejoignant la nervure costale très près de la troisième nervure longitudinale.

Première cellule marginale postérieure ainsi fortement rétrécie.

Cellule discoïdale allongée vers la base de l'aile. Cellules basales et anales courtes, à peine plus longues que larges.

Cinquième nervure longitudinale prolongée jusqu'au rebord de l'aile (fig. 2).

Affinités de l'imagotype de Neocuterebra. — La discussion des affinités de *Neocuterebra*, basée sur les caractères larvaires du

3^e stade, nous avait fait admettre avec J. Bequaert (1) que le genre *Neocuterebra* ne pouvait être rangé rationnellement dans le voisinage des *Cuterebrinae* d'Afrique et qu'il paraissait se rapprocher davantage des larves cuticoles de certaines *Calliphorinae* africaines du genre *Cordylobia*.

L'étude de l'imago montre, qu'il y a entre les genres *Neocuterebra* et *Cordylobia* des divergences considérables.

FIG. 2. — Aile de *Neocuterebra squamosa*. $\times 5$.

L'habitus général de la face, la nervation alaire, rapprochent l'adulte des *Neocuterebra* des *Dermatobia*. C'est bien en réalité avec les *Æstridæ* de la sous-famille des *Cuterebrinae* que la mouche de la larve du pied de l'éléphant d'Afrique offre le plus d'affinité. Elle s'en écarte pourtant par la présence de palpes et la forme de l'arista.

II. — L'insecte adulte et l'œuf de *Ruttenia loxodontis* Rodhain

FIG. 3. — Pupa de *Ruttenia loxodontis* Rodh. $\times 4$.

1. PUPE. — La pupa affecte la forme d'une poire trapue, très légèrement déprimée de haut en bas, à grosse extrémité postérieure régulièrement arrondie. Les plus grosses mesurent 9 mm de long sur 6 mm de plus grande largeur.

Les stigmates postérieurs comme chez la larve adulte sont situés dorsalement. Les stigmates antérieurs sont visibles en avant sous la forme de deux petites saillies creusées en cupule, d'un jaune clair. Lors de l'éclosion, il se détache un opercule correspondant à la partie dorsale des 5 premiers segments (fig. 3).

La durée de la nymphose est de 24 à 25 jours.

(1) RODHAIN (J.) et BEQUAERT (J.). — *Loc. cit.*

2. IMAGO. — Les deux sexes ont la même couleur. Mouches moyennes de 7 à 8 mm., noires à reflets roux. Thorax et abdomen couverts de poils roux qui, au niveau des deux derniers segments abdominaux, ont des reflets blancs. Tête petite, aussi large que le thorax dont le diamètre antéro-postérieur équivaut au tiers du diamètre vertical. Yeux écartés dans les deux sexes ; bruns-rougeâtres. Thorax un peu plus long que large, abdomen allongé, rétréci à son extrémité postérieure, ailes enfumées, dépassant le corps en arrière.

Tête. — Front non saillant, bande frontale courte, également large dans les deux sexes ; champ ocellaire triangulaire, ocelles relativement volumineux, ovalaires. Région orbitaire garnie de poils, un peu plus élargie chez la femelle que chez le mâle.

Yeux nus, descendant jusqu'aux $6/5$ de la hauteur de la tête. Face allongée, lunule rouge-jaunâtre, triangulaire, se continuant entre les antennes en une petite saillie à rebords arrondis qui se prolonge en une carène très effacée et se développe en bas en un péristome de moyenne largeur.

Cupules antennaires allongées vers le bas, médiana et gènes portant des poils. Arête nasale non saillante sans vibrisses. Antennes d'un rouge-jaunâtre ; les deux premiers articles courts, le deuxième portant une petite touffe de poils. Le troisième article brunâtre, renflé en ovale à grosse extrémité distale, porte à sa base un long chête noir et nu, qui s'élargit à son extrémité libre en forme de palette (Pl. I, fig. 3 et 4).

Péristome couvert de poils se développant latéralement et vers la face postérieure. Appareil buccal rudimentaire ; palpes globuleux, entre lesquels la trompe apparaît comme un petit cône saillant, non coudé.

Thorax. — Dorsulum couvert d'une pilosité rousse, plus dense et plus longue sur le scutellum ainsi que sur les flancs et la face inférieure qui sont franchement velus.

Abdomen. — Plus long que large, rétréci en arrière et légèrement recourbé vers le bas. Quatre tergites visibles ; les trois premiers plus larges que longs, le quatrième aussi long que large, régulièrement rétréci en arrière. Les poils des 3^e et 4^e segments abdominaux sont longs et ont un reflet blanchâtre. Appareil génital externe de la femelle trapu, supporté par un très court segment qui s'invagine dans le 4^e tergite. Hypopigium du mâle muni de deux crochets chitineux.

Cuillérons. — Développés, surtout le thoracique, à rebord épaissi, régulièrement arrondi, garni de poils roux.

Ailes. — Allongées, enfumées, quatrième nervure longitudinale recourbée en une nervure transverse apicale, rejoignant la 3^e nervure qui elle-même s'incurve légèrement vers le bas et se termine après avoir fermé la première cellule marginale postérieure par un court appendice qui n'atteint pas le rebord alaire. Cellule discoïdale allongée vers la base de l'aile.

Cinquième nervure longitudinale prolongée jusqu'au rebord alaire. Alule ovalaire (fig. 4).

Pattes. — Elles ont un développement moyen. Fémurs et tibia jaune-paille ; tarses de même couleur portant à leur extrémité distale une tache noire. La couleur dans les deux sexes est sensible-

FIG. 4. — Aile de *Ruttenia loxodontis* Rodh. $\times 12$.

ment la même ; la pilosité de la face est plus développée chez le mâle que chez la femelle.

Il me paraît impossible de rattacher cet insecte à l'un quelconque des différents groupes que comprend actuellement la famille des *Æstridæ* ; il ne peut y avoir de doute quant au maintien du genre *Ruttenia*, que l'étude de la larve de la peau des éléphants nous avait amené à créer.

Parmi les *Æstridæ* à larves cuticoles, on ne peut faire rentrer le genre *Ruttenia*, ni dans les *Hypoderminæ*, ni dans les *Cuteribrinæ*. La conformation générale de la tête, l'habitus de la face dont les antennes portent un chête tout à fait caractéristique, la nervation alaire, font que le genre *Ruttenia*, occupe parmi les *Æstridæ*, une place à part.

3. ŒUF DE *Ruttenia loxodontis*. — Une des six femelles que nous avons examinées avait l'abdomen distendu par de très nombreux œufs. Ces œufs desséchés montrent après éclaircissement au lactophénol une coque relativement épaisse.

Ils ne mesurent que 523μ de long sur 255μ de large. La coque ovulaire a une épaisseur de 16μ (fig. 5).

Tous étaient au même stade de développement, aucun n'indiquait un début de segmentation embryonnaire. La femelle dont ils provenaient avait été obtenue d'éclosion et tuée pour conservation. Il semble, d'après cela, qu'il sera relativement aisé d'observer la ponte des *Rullenia* en captivité. Il est probable que les œufs sont déposés par la mouche sur le tégument même des éléphants, mais leurs faibles dimensions les rendent difficilement visibles. L'apparition annuelle, temporaire et saisonnière des larves, semble indiquer un développement très lent de ces dernières, mais pourrait cacher aussi une complication dans le cycle évolutif dont l'observation de la ponte et des œufs facilitera l'étude.

FIG. 5. — Œuf de *Rullenia loxodontis* Rodh. $\times 30$.

III. — L'insecte adulte de *Pharyngobolus africanus* Brauer

Cette mouche dont nous avons obtenu, en 1913, par éclosion, plusieurs spécimens qui malheureusement n'avaient pu déplier leurs ailes, a dans son ensemble l'habitus des *Æstrinæ*. C'est un insecte trapu (15 mm. sur 6 mm.), à grosse tête renflée, à thorax large et profond, abdomen court et droit. Les pattes sont courtes et robustes. Les couleurs diffèrent peu dans les deux sexes ; le fond est noir, avec teinte grisâtre, relevé de taches claires sur l'abdomen. Les yeux, d'un rouge brique sur le vivant, sont séparés dans les deux sexes, mais beaucoup plus rapprochés et près de deux fois plus grands, chez le mâle que chez la femelle.

Tête. — Aussi haute que large ; vue de profil, triangulaire, à sommet correspondant au rebord supérieur des cupules antennaires. Les yeux nus, deux fois aussi hauts que larges, sont très écartés chez la femelle où le front occupe plus de la moitié de la largeur de la tête. Ils sont beaucoup plus volumineux chez le mâle, chez lequel ils se rapprochent en haut et en arrière au point de s'accoler au triangle ocellaire, latéralement ils descendent jusqu'au quart inférieur du diamètre vertical de la tête.

Front large chez la femelle. Bande frontale médiane étroite avec plis longitudinaux, s'élargissant en bas près de la cicatrice frontale. Champ ocellaire triangulaire petit. En dehors de la bande médiane,

le front de la femelle présente deux zones distinctes, l'une interne d'un noir brillant parcourue de plis sinueux, irréguliers, l'autre externe orbitaire, terne, couverte d'un enduit gris-bleuâtre. L'une et l'autre zones portent des poils noirs. Chez le mâle, la bande orbitaire est réduite. Dans les deux sexes, les deux zones confondues sans démarcation nette se prolongent latéralement en se rétrécissant, en-dessous du front, jusqu'au rebord inféro-postérieur des yeux.

La cupule antennaire est large et profonde. Les rebords saillants décrivent une ellipse à petit axe vertical ; ils convergent en bas vers la ligne médiane sans se rejoindre, restant séparés par une carène étroite. Cette dernière se continue vers le haut, entre les antennes, jusqu'à la lunule et vers le bas s'élargit en un épistome triangulaire court et peu large. Les antennes sont noires, non saillantes au dehors ; les deux premiers articles antennaires courts ; le 3^e renflé en ovale, aplati latéralement, porte un chète nu.

Les gènes de couleur sombre avec rares poils dessinent un triangle dont le fond est légèrement déprimé, et la base externe présente des plis en relief. Le péristome est élargi vers le haut, et porte de nombreux poils noirs. L'appareil buccal est rudimentaire sans palpes, ne montrant qu'un cône chitineux, globuleux médian, brun-noir, en dessous duquel, aux forts grossissements, on peut observer deux minuscules saillies ovalaires du tégument, dont la signification est difficile à interpréter (Pl. I, fig. 1 et 2).

Thorax. — Il est aussi long que large et profond (6 mm.). Dorsum et scutellum couverts d'une pilosité noire courte, qui s'allonge sur les flancs et la face inférieure.

Abdomen. — Trapu droit, aussi long que large, très légèrement aplati de haut en bas, couvert de courts poils noirs qui s'allongent près des bords postérieurs des segments. Les tergites 2 à 4 portent près de leur bord antérieur des taches d'un gris-bleuâtre constituées par un enduit adhérent au tégument noir. Sternites petits, larges et courts, garnis de poils plus rares que les tergites. Membrane abdominale bien développée. Appareil génital externe du mâle comportant latéralement deux crochets trapus entre lesquels deux petites valves tégumentaires triangulaires à base postérieure cachent l'hypopigium rétracté à l'intérieur du dernier segment abdominal.

Cuillerons. — Développés, le thoracique très volumineux, d'un blanc crémeux, à rebord postérieur régulier.

Ailes. — Hyalines, très légèrement enfumées près de leur base. Plus longues que larges, dépassant de très peu l'abdomen en arrière. Quatrième nervure longitudinale relevée en transverse

apicale, rejoignant la costale tout près de la 3^e nervure, rétrécissant fortement la 1^{re} cellule marginale postérieure (fig. 6). Le tronc basal de cette transverse, avant qu'elle ne se relève, se prolonge vers l'extérieur en une courte nervure appendiculaire. La cinquième nervure longitudinale ne dépasse que très peu la cellule discoïdale et n'atteint pas le rebord alaire. Alule ovulaire, allongée.

Pattes. — Noires, robustes, portant une fine pilosité noire. Fémurs légèrement élargis et garnis de poils plus longs que les autres segments du membre. Tarses courts et épais, griffes puissantes.

La nervation alaire rapproche le genre *Pharyngobolus* des genres *Pharyngomyia* et *Cephenomyia* dont les larves sont fixées aux

FIG. 6. — Aile de *Pharyngobolus africanus* Br. $\times 11$

parois du larynx et de la trachée artère des *Cervidæ*. Les adultes des *Cephenomyia* sont également pourvus d'une pilosité abondante et le rapprochement des yeux chez le mâle existe chez certaines espèces. L'existence d'une membrane abdominale bien développée écarte cependant les *Pharyngobolus* de ces genres.

D'un autre côté, la mouche de la larve du pharynx de l'éléphant africain, offre plus d'une affinité avec les *Æstrinæ sensu stricto*, tels que nous les avons définis avec Bequaert (1). Elle s'en éloigne pourtant aussi, notamment par le rapprochement des yeux chez le mâle, l'absence de palpes et surtout la nervation alaire. Si l'on voulait grouper ensemble le genre *Pharyngobolus* et les quatre genres que nous avons admis dans la sous-famille des *Æstrinæ*, il faudrait modifier les caractères généraux de cette dernière. Ceci entraînerait à une révision d'autres genres d'*Æstridæ*, qu'il n'entre pas dans mes intentions d'entreprendre aujourd'hui.

(1) RODHAIN (J.) et BEQUAERT (J.). — Révision des *Æstrinæ* du Continent africain. *Bull. scient. de France et de Belgique*, L, p. 55.

IV. — Larves de *Strobilæstrus* et *Dermatæstrus* du Katanga Affinités réciproques des genres *Strobilæstrus* et *Dermatæstrus*

Le Docteur Dupuy, résidant à Bukuma (Haut-Louapoula), recueillit en 1924 et 1925 plusieurs lots de larves cuticoles qu'il trouva chez des antilopes « *Songe* », *Onotragus leche-leche* Gray, tuées dans la plaine de Katobwe sur la rive gauche du fleuve, à 30 kilomètres en aval de son poste. Il captura également deux œstrides adultes ♀ sur une « leche » fraîchement tuée.

Un premier examen de ce matériel me fit reconnaître qu'il s'agissait de larves de *Strobilæstrus* et de *Dermatæstrus*. Quant aux mouches, il s'agissait d'insectes non décrits qu'il n'était pas permis de rapprocher avec certitude aux larves extraites de la peau des leche. A ma demande, et d'après mes indications, le Docteur Miguens, successeur de M. Dupuy, voulut bien faire l'élevage des larves cuticoles des leche et me fit parvenir 3 imagos avec les dépouilles pupales d'où ils étaient sortis, ce qui permit d'identifier les insectes capturés par son collègue.

1. LARVES DE *Dermatæstrus* DES LECHES-LECHES GRAY DE KATOBWE. — Ces larves sont toutes arrivées au 3^e stade et appartiennent à une même espèce que nous rapportons à *Dermatæstrus ericksoni* Poppius. Celle-ci a été décrite sur deux exemplaires provenant de *Onotragus smithemani* Lydekker de la vallée du Haut-Louapoula au Katanga (1). Grâce à notre ami le professeur Gedælst, il nous a été permis de comparer nos larves à l'une de celles décrites par Poppius. La larve du musée d'Helsingfors est manifestement plus volumineuse que les nôtres, elle porte sur la face ventrale de l'anneau 11 trois groupes écailleux, alors que les parasites des leches de Katobwe ne sont ornés que d'un seul groupe d'écailles sur le segment abdominal correspondant. Les écailles postérieures de chaque groupe écailleux de la larve décrite par Poppius sont aussi plus allongées que les productions homologues de nos *Dermatæstrus* et leur teinte est plus claire. Ces différences ne peuvent sans doute pas justifier une distinction spécifique entre les deux parasites, mais doivent pourtant inciter à une comparaison attentive des imagos.

Nous avons eu à notre disposition 25 exemplaires des larves de Katobwe et croyons utile d'en donner une description signalant les quelques variantes qu'on peut observer entre elles.

(1) POPPIUS. — Eine neue Art der Cestrident Gattung *Dermatæstrus* Brauer aus central Afrika. *Öfversigt of Finska Vetenskaps societens Förhandlingar*, X, LIX, n° 19, 1906-1907.

Larve au troisième stade. — D'une forme presque régulièrement cylindrique, fort peu aplatie latéralement, légèrement rétrécie aux deux extrémités. Les plus grandes mesurent 20 à 21 mm. de longueur sur 9 mm. de plus grande largeur. La cuticule des individus jeunes est d'un blanc sale, celle des spécimens adultes varie du jaune paille au brun sombre. L'extrémité postérieure de certaines larves adultes est même d'un brun noir.

Le tégument, comme celui des larves d'*Hypoderma*, est garni d'une armature qui comprend des formations chitineuses de deux ordres différents. Les unes constituent de vraies écailles, à extrémités amincies et aplaties de forme variable et d'une couleur gris noirâtre. Elles couvrent les parties antérieures de bourrelets que portent certains segments sur les trois faces et sont invariablement disposées en rétroversion. Les autres sont de vraies épines, très réduites, elles sont implantées en antéversion en groupes ou en rangées irrégulières près des bords postérieurs des anneaux ventraux ou de certains bourrelets latéraux.

Segment céphalique. — Légèrement reporté vers la face ventrale (1). Les deux bourrelets antennaires largement écartés et divergents sont munis chacun d'un seul point ocellaire très distinct. Chez certaines larves les renflements antennaires brunissent entièrement. En dessous et un peu en dedans de la base des antennes émergent deux puissants crochets buccaux, entre lesquels se remarquent chez quelques exemplaires une petite fente anguleuse à sommet supérieur dont les bords dessinent deux lignes brunâtres. Le bourrelet labial antérieur porte un groupe de minuscules épines vraies.

Le post-céphalon est inerme, il se développe en arrière du cône buccal en un bourrelet sur la partie postérieure duquel passe la suture arquée. Celle-ci se prolonge latéralement jusqu'au milieu du 5^e anneau dorsal. Il n'existe pas de traces visibles de stigmates antérieurs.

Segment anal. — La face postérieure du douzième anneau par suite de la réduction des faces dorsales des trois segments précédents est légèrement reportée sur le dos. Les rebords inférieur et supérieur du dernier anneau sont réguliers et couverts d'une très fine spinulation à peine visible. Ils encadrent une aire stigmatique relativement étroite, occupée presque entièrement par deux anneaux épais et saillants d'une chitine noire, incluant dans leur centre déprimé en entonnoir le faux stigmat. Cette plaque de chitine

(1) Comme dans toutes nos publications antérieures sur les larves de diptères parasites, nous considérons l'extrémité céphalique comme formée de deux anneaux.

porte un nombre considérable d'orifices respiratoires régulièrement arrondis. Ils sont disposés en séries linéaires doubles ou triples, dans les intervalles que laissent entre elles des travées massives de chitine qui rayonnent du centre vers la périphérie. Ces travées se distinguent également sur les plaques stigmatiques des larves des *Hypoderma*, mais elles n'ont chez ces dernières ni l'importance, ni la régularité qu'elles présentent chez les *Dermatæstrus*. Les orifices respiratoires eux-mêmes apparaissent comme taillés à l'emporte-pièce dans la plaque chitineuse et ne montrent pas le rebord épaissi qui les circonscrit chez les *Hypoderma*.

L'anus nettement visible se trouve en position médiane immédiatement en arrière des stigmates.

Face ventrale. — Les segments 3 à 11 ont leur bord postérieur garni de nombreuses petites épines implantées en antéversion sur plusieurs rangées irrégulières. Des groupes d'écailles ressortent sur les parties antérieures des anneaux 3 à 10. Ces groupes couvrent en avant des bourrelets en saillie que délimitent des plis plus ou moins profonds de la cuticule.

Les anneaux 4 à 10 portent chacun 3 de ces bourrelets ; ceux-ci ne sont pas distincts sur le 3^e anneau et s'effacent également sur le 11^e segment. Les bourrelets des anneaux 4 à 10 sont munis chacun d'un groupe d'écailles ; sur le onzième seul le bourrelet médian en porte, mais non d'une manière constante. Les groupes écailleux de deux bourrelets voisins peuvent quelquefois confluer.

L'anneau 3 porte un seul groupe d'écailles allongé en bande transversale près du bord antérieur.

Face dorsale. — La face dorsale est dépourvue d'épines et sans bourrelets intermédiaires. Les trois anneaux 3 à 5 portent au-devant de la suture arquée, chacun 3 groupes d'écailles disposés sur 3 bourrelets, séparés par des plis longitudinaux. Le bourrelet médian s'allonge considérablement au niveau des segments 6 à 11 au point de constituer toute la partie dorsale de ces anneaux, les bourrelets externes étant repoussés sur les faces latérales. Ce bourrelet médian allongé est orné de 3 groupes d'écailles sur les segments 6 à 9. Sur ce dernier, les écailles du milieu font souvent défaut.

Faces latérales. — Elles sont constituées par un bourrelet médian et un bourrelet ventral à hauteur des anneaux 3 à 11, auquel s'ajoute un bourrelet dorsal sur les segments 6 à 11 (1). Des plis profonds, irréguliers, délimitent ces bourrelets. Ceux correspondants aux segments 3 à 10 sont munis à leur partie antérieure

(1) En réalité les bourrelets latéraux dorsaux des anneaux 5, 4 et 3 existent mais ils sont répartis entièrement sur la face dorsale en-dedans de la suture arquée.

d'écailles ; ces dernières peuvent manquer sur le bourrelet médian de l'anneau 10. Les bourrelets latéraux ventraux portent en outre près de leur bord postérieur un groupe d'épines en antéverson. Ces épines se retrouvent également, mais non d'une manière constante, sur les bourrelets médians, et, exceptionnellement, il s'en rencontre quelques-unes peu nombreuses à la base postérieure de l'un ou l'autre bourrelet dorsal.

La répartition des bourrelets, écailles et épines du tégument différencie nettement la larve de *Dermatæstrus* de Katobwe de celle de *Dermatæstrus stepticerontis* et de *Dermatæstrus oreotrugi* ; la disposition de ces productions cuticulaires la rapproche de *Dermatæstrus ericksoni* avec laquelle nous l'identifions.

2. L'INSECTE ADULTE DE *Dermatæstrus ericksoni* POPPIUS. — Les deux *Æstridæ* capturées par le Docteur Dupuy sur une leche fraîchement tuée étaient deux femelles ; ultérieurement, le Docteur Miguens obtint d'éclosion d'un lot d'une vingtaine de larves de *Dermatæstrus ericksoni*, 3 insectes parmi lesquels un mâle. La comparaison des mouches montra qu'il s'agissait de la même espèce. Nous la décrivons brièvement ci-dessous.

Insectes mâles et femelles de 10 à 11 mm. de longueur. Abdomen un peu plus étroit que le thorax. Couleur générale brun terne avec reflets blancs d'argent sur l'abdomen.

Tête. — Pas plus large que le thorax, aplatie d'avant en arrière, le diamètre antéro-postérieur mesurant la moitié du diamètre transversal. Yeux séparés dans les deux sexes, brun acajou sombre, ovalaires, descendant latéralement jusqu'au-dessous de la moitié du diamètre vertical de la tête. Front très peu saillant occupant la moitié de la largeur de la tête chez la femelle, un peu plus étroit chez le mâle. Brun noir dans sa partie supérieure, blanc crémeux dans sa partie inférieure. Bande frontale peu accusée, d'un brun clair en bas, noirâtre dans la partie supérieure voisinant le triangle ocellaire.

Zone orbitaire montrant de nombreuses dépressions cupuliformes portant chacune en leur centre un fin poil jaunâtre. Ces dépressions tranchent sur le fond clair du front comme des taches sombres. Latéralement et en haut près du rebord orbitaire ressort une tache brillante brune noirâtre, plus accusée chez le mâle que chez la femelle. Champ ocellaire brun noir, à angles arrondis, ocelles ovalaires, l'antérieur à grand diamètre transversal.

Face allongée d'un blanc crémeux, nue. Fossettes antennaires très espacées, profondes, séparées par une carène à rebord arrondi, prolongement de la lunule frontale, à celle-ci fait suite un clypeus très

élargi, occupant toute la partie inférieure de la face. Deux premiers articles des antennes très courts, le troisième globuleux non saillant paraissant faire corps avec le deuxième et muni d'un chète nu très fin (Pl. I, fig. 6).

Palpes buccaux absents. Appareil buccal représenté par un tubercule chitineux ovalaire à diamètre transversal, d'un brun sombre. Péristome portant les mêmes dépressions en cupule que la zone frontale orbitaire. Gènes triangulaires, entièrement nues.

Thorax. — Un peu plus long que large. Sur le dorsulum ressortent en arrière de la suture et de chaque côté de la ligne médiane deux taches noires brillantes. Une série de zones d'un brun clair munies d'une pilosité rousse, courte et peu dense, délimitent d'autres taches sombres irrégulières moins nettement apparentes, en avant et en arrière de la suture. Au niveau de ces zones claires une pruinosité blanc grisâtre couvre le tégument. Le scutellum d'un brun sale est sculpté de replis sinueux luisants.

Abdomen. — Peu allongé, brun noir à reflets gris d'argent. Marges postérieures des tergites d'un brun clair dépourvues de poils ; parties antérieures noires parsemées de taches à reflets argentés ou dorés, couvertes d'une fine pruinosité blanche ou jaune. Tarrière de la femelle longue, noire ; premier article très allongé portant quelques poils roux et bordé latéralement et à sa face inférieure d'une bande brune.

Pattes. — Moyennes ; tarsi et tibia d'un brun jaunâtre, fémurs aplatis montrant des taches sombres sur les parties médianes et proximales.

Cuillères. — Blancs, très développés, surtout les thoraciques, considérablement plus volumineux que les alaires. Leur surface est finement plissée et leur marge garnie d'un rebord épaissi orné de fins poils. Ce rebord présente une encoche délimitant une expansion dorsale, et une autre ventrale, celle-ci étant la plus étendue.

Ailes. — Allongées, nettement écumées. Nervation semblable à celle des *Hypoderma*. Nervure costale auxiliaire à peine distincte ; cellule discoïdale étroite, première cellule marginale postérieure fermée près du bord de l'aile par une nervure transverse apicale très amincie (fig. 7). La première nervure longitudinale porte près de sa base au-devant de la nervure transverse antérieure une tache noire. A la base de l'aile, à l'angle de la réunion de celle-ci avec l'alule, et empiétant sur cette dernière, ressort une tache noire veloutée. Alules un peu plus longues que larges.

Pupe. — Alors que les larves de *Dermatæstrus*, non déformées, ont un aspect de tonnelet allongé, assez régulier, les chrysalides

montrent un fort épaississement de l'extrémité postérieure, épaississement qu'on retrouve aussi chez les pupes des *Hypoderma*. L'extrémité antérieure est rétrécie et aplatie de haut en bas. Les stigmates caractéristiques sont reportés vers le dos, à la partie supérieure de la face postérieure qui est régulièrement arrondie. Les segments dorsaux, surtout les derniers, apparaissent plus rétractés que les abdominaux dont les 11 et 12^e sont manifestement plus élargis que sur la larve. L'éclosion a lieu par un opercule intéressant les cinq premiers segments dorsaux.

Cet æstride présente avec *Hypoderma clarki* Shuckard, telle que Brauer l'a décrite (1), plusieurs caractères communs, notamment

Fig. 7. — Aile de *Dermataestrus ericksoni*, Pop. $\times 11$.

l'absence de poils sur la face, la faible pilosité générale du corps, les taches alaires. Il en diffère par sa coloration générale. Brauer a rattaché *Hypoderma clarki* au genre *Hypoderma*, faisant remarquer pourtant que la face nue ne se rencontrait guère dans ce genre. Pour nous, il ne peut y avoir de doute que l'*Hypoderma clarki* ne constitue l'adulte d'une des deux espèces de *Dermataestrus* décrites de l'Afrique du Sud.

La comparaison des imagos connues de deux espèces de *Dermataestrus* avec celles déjà nombreuses décrites du genre *Hypoderma* montre une grande similitude de plusieurs caractères importants. La conformation générale de la tête est identique dans les deux genres ; on y trouve le même clypeus élargi, les antennes courtes non saillantes, l'absence de palpes. Chez les *Hypoderma*, la face est velue, tandis que chez les *Dermataestrus*, elle est nue. Il n'existe pas de différence marquante dans la conformation générale du thorax et de l'abdomen. Ce qui ici encore distingue surtout les imagos des deux genres, c'est l'abondance plus ou moins grande de la pilosité.

La nervation alaire chez les deux genres est du même type, par contre les pattes des *Hypoderma* sont plus allongées que celles des

(1) BRAUER. — *Monographie des æstrides*, 1863, p. 159.

Dermatæstrus. Les chrysalides elles-mêmes ont la même forme générale, l'extrémité postérieure en est élargie et les stigmates reportés vers le dos. Les différences entre les imagos des deux genres apparaissent moins tranchantes que celles qui distinguent les larves. Si les productions tégumentaires de ces dernières, épines et écailles, sont identiques, les plaques stigmatiques diffèrent et l'existence de deux puissants crochets buccaux distingue immédiatement la larve adulte de *Dermatæstrus* de celle d'*Hypoderma*. Mais ce dernier caractère différentiel disparaît au deuxième stade larvaire ainsi que nous le verrons plus loin.

Je n'ai pas eu à ma disposition, pour comparaison, un nombre suffisant d'espèces différentes d'*Hypoderma* pour pousser plus à fond l'étude des affinités qui relient les imagos de ce genre à ceux de *Dermatæstrus*. Ces deux genres sont évidemment fort proches l'un de l'autre au point qu'on peut se demander s'il ne conviendrait pas de faire de *Dermatæstrus* un sous-genre d'*Hypoderma*.

3. LARVES DE *Strobilæstrus* DES LECHE DE BUKAMA. LES AFFINITÉS RÉCIPROQUES DES GENRES *Dermatæstrus* ET *Strobilæstrus*. — A côté des larves de *Dermatæstrus ericksoni* Poppius, les Docteurs Dupuy et Miguens ont extrait de la peau du dos des *Onotragus leche-leche* Gray, de la plaine de Katobwe, une série de larves de *Strobilæstrus*.

Toutes indistinctement répondent aux caractères de *Strobilæstrus antilopinus* Brauer, espèce rencontrée primitivement dans la peau de l'*Oreotragus saltatrix* Gray (Klipspringer) et de *Pediotragus campestris* Gray, dans la Colonie du Cap, et pour laquelle Brauer a créé en 1892 un genre nouveau (1).

Depuis, une seule deuxième espèce a été décrite sous le nom de *Strobilæstrus oreotragi* Scheben (2) parasitant le klipbok, *Oreotragus oreotragus* Zimmerman, au Damaraland.

Brauer, lorsqu'il a créé le genre *Strobilæstrus*, a rapporté les larves qu'il a étudiées au deuxième stade, il a insisté sur les différences qui les séparent de celles du deuxième stade d'*Hypoderma*.

La conformation des plaques stigmatiques postérieures est identique dans les deux genres, elles sont composées d'une série d'anneaux chitineux, réguliers, disposés en arc de cercle formant un ensemble réniforme. L'extrémité céphalique des deux genres de larves manque de crochets buccaux. Les principales distinctions résident dans la spinulation et la conformation de la cuticule. La

(1) BRAUER. — Sitz Ber. A. K. Wiss. Wien. Math. Naturw. Kl. C. I., Abt. I, 1892, p. 10.

(2) SCHEBEN. — Centralblatt. Bakt. Parasitenk. Abt. I, L. VI, orig., 1910, p. 53, fig. 1-7.

cuticule de *Strobilæstrus* porte des protubérances tuberculiformes sur les segments 3 à 7 qui donnent au parasite son aspect caractéristique, le tégument ne montre pas les épines dont sont munies les larves d'*Hypoderma* au deuxième stade. Il faut signaler pourtant que sur le dernier segment des *Strobilæstrus* il existe une très fine spinulation que ni Brauer, ni Scheben ne semblent avoir remarqué. L'extrême petitesse des épines exige d'ailleurs, pour son observation, l'emploi de forts grossissements. Quoique l'ensemble des caractères de *Strobilæstrus* rendait probable qu'il s'agissait bien d'une larve au deuxième stade, la preuve qu'il en était réellement ainsi n'était pas faite. Or, parmi les larves récoltées par mes amis de Bukama, s'en trouvent 3 qui sont en voie de mue. Chez l'une d'elles, j'ai pu m'assurer de l'existence de la plaque stigmatique postérieure du troisième stade larvaire et relever certains détails de structure du tégument de ce stade.

L'étude de cette larve est intéressante, en tant qu'elle apporte de nouveaux éléments pour la discussion des affinités du genre *Strobilæstrus* avec les genres *Hypoderma* et *Dermatæstrus*.

Longue de 10 mm. et large de 7 mm., la cuticule d'un blanc sale, elle est aplatie très légèrement dorso-ventralement. Les tubercules caractéristiques des segments 3 à 7 sont fortement rétractés et le ver a perdu son aspect caractéristique de *Strobilæstrus*. En éclaircissant au lactophénol les deux derniers segments, j'ai pu distinguer la plaque stigmatique réniforme du 2^e stade ainsi que la fine spinulation du 12^e anneau. En même temps, les stigmates du 3^e stade ont apparu nettement visibles sous forme d'une plaque de chitine constituant un anneau entièrement fermé, renfermant en son centre le pseudo-stigmate. Cette plaque de formation toute récente est encore d'un brun-clair et peu épaissie ; elle porte un grand nombre de petits orifices régulièrement arrondis dont le rebord chitineux renforcé dessine des cercles analogues à ceux qu'on retrouve sur les stigmates d'*Hypoderma* au 3^e stade. A l'extrémité céphalique se reconnaît l'appareil buccal dépourvu de crochets chitineux proprement dits, tel que cela existe chez les *Strobilæstrus*, mais on y trouve deux plaques triangulaires à base antérieure d'un jaune-clair qui indiquent un début de formation chitineuse. Nous n'avons pu nous assurer de l'existence de proéminences antennaires. Sur la cuticule larvaire sous-jacente au tégument du 2^e stade, on peut distinguer déjà quelques groupes d'écailles couvrant des bourrelets, les uns ventraux et les autres latéraux, correspondant aux productions qu'on retrouve chez les *Hypoderma* et les *Dermatæstrus*.

A quel de ces deux derniers genres, les caractères partiels que

nous venons de relever permettent-ils de rattacher la larve de *Strobilæstrus* au 3^e stade ?

La constitution des plaques stigmatiques la rapproche indubitablement du genre *Dermatæstrus* et seule l'absence de crochets buccaux peut laisser subsister quelque doute sur cette identification. Mais il faut remarquer que la larve n'avait pas achevée sa mue et que l'apparition de l'appareil chitineux buccal peut avoir été en retard sur celle des plaques stigmatiques, il s'agit en réalité de deux systèmes différents. Il n'existe pas à ma connaissance de larves d'*Hypoderma* adultes qui aient les plaques stigmatiques postérieures entièrement fermées. Bauer dit dans sa monographie des *Æstridæ*, que ces plaques varient notablement suivant les espèces et s'écartent plus ou moins de la forme semi-lunaire, mais n'indique pas une inclusion complète du faux stigmate dans un anneau fermé.

J'ai pu examiner de jeunes larves au 3^e stade d'*Hypoderma bovis*, elles montrent des plaques stigmatiques de forme semi-lunaire très accusée, entièrement différente de celle des stigmates postérieurs de la larve de *Strobilæstrus*. Il a été décrit, provenant d'Afrique, deux espèces certaines d'*Hypoderma* dont seuls les stades larvaires sont connus : *Hypoderma corinnæ* Crivelli et *Hypoderma gazellæ* Gedælst. Les plaques stigmatiques postérieures de la larve adulte de l'*Hypoderma corinnæ* sont entièrement distinctes de celles de notre larve de *Strobilæstrus* en voie de mue ; quant aux stigmates de l'*Hypoderma gazellæ*, Gedælst n'en dit rien, ce qui chez un observateur aussi précis et sagace indique bien qu'elles répondent au type habituel. *Hypoderma gazellæ* est d'ailleurs une espèce orientale. Indistinctement, les plaques stigmatiques postérieures des 3 espèces connues de *Dermatæstrus* constituent des anneaux de chitine épais et complets incluant en leur centre, le faux stigmate.

D'autre part, si l'on tient compte de ce que les *Strobilæstrus* et les *Dermatæstrus* ont une répartition géographique souvent superposée, il ne peut guère persister de doute quant aux affinités des deux genres. J'ajouterai que les larves de *Strobilæstrus* ont été récoltées voisinant avec celles de *Dermatæstrus* sur les mêmes animaux et qu'il s'est toujours agi des deux mêmes espèces. Plus de 60 spécimens de *Dermatæstrus ericksoni* Poppius ont été recueillis mêlés à plus de 50 larves de *Strobilæstrus antilopinus* Brauer.

TÊTES D'ESTRIDÉS DU CONGO BELGE

EXPLICATION DE LA PLANCHE. — 1, *Pharyngobolus africanus* Br. ♂, tête vue par la face antérieure ; 2, *Pharyngobolus africanus* Br., tête vue de profil ; 3, *Ruttenia loxodontis* Rodh., tête vue par la face antérieure ; 4, *Ruttenia loxodontis* Rodh., tête vue de profil ; 5, *Neocuterebra squamosa* Grünb. ♀, tête vue par la face antérieure ; 6, *Srobilæstrus antilopinus* Brauer ♀, tête vue par la face antérieure.

CONCLUSIONS

De ce qui précède, il est permis de tirer les conclusions suivantes:

1° *Strobilæstrus* est bien une larve au 2° stade d'un *Dermatæstrus*.

2° *Strobilæstrus antilopinus* Brauer représente le 2° stade de *Dermatæstrus ericksoni* Poppius.

Strobilæstrus antilopinus représente-t-il exclusivement le 2° stade larvaire de cette dernière espèce de *Dermatæstrus*. Nous ne le croyons pas. Ce *Strobilæstrus* a en effet, une aire d'extension beaucoup plus répandue que celle de *Dermatæstrus ericksoni*.

En ce qui concerne le deuxième stade larvaire d'*Hypoderma*, il est connu que les caractères différentiels spécifiques chez les larves après leur deuxième mue sont très peu prononcés, souvent inexistantes.

Il est fort probable qu'il en est de même pour *Dermatæstrus*, dont *Strobilæstrus* constitue le 2° stade larvaire.

Nous trouvons une indication confirmative de cette probabilité dans le fait que jusqu'ici 3 espèces de larves de *Dermatæstrus* sont connues alors que seulement deux espèces de *Strobilæstrus* ont été décrites. Cependant ces dernières ont été signalées plus souvent que les premières.

Ces considérations nous amènent naturellement à examiner lequel des deux genres *Strobilæstrus* ou *Dermatæstrus* doit être maintenu dans la nomenclature systématique des *Æstridæ*.

Brauer a créé les deux genres, dans une même publication et *Strobilæstrus* (1) s'y trouve décrit avant *Dermatæstrus*. C'est donc le premier genre qui doit être maintenu.

Quant à déterminer à quelles espèces de *Strobilæstrus* correspondent les espèces de *Dermatæstrus* connues, tout ce que l'on peut dire actuellement c'est que *Dermatæstrus ericksoni* Poppius devient synonyme de *Strobilæstrus antilopinus* Brauer.

En ce qui concerne *Dermatæstrus strepticerontis* Brauer et *Dermatæstrus oreotragi* Scheben, il est impossible en ce moment de rattacher avec certitude, l'une ou l'autre de ces espèces à *Strobilæstrus oreotragi* Scheben.

Ecole de Médecine tropicale de Bruxelles.

(1) BRAUER. — Über die aus Afrika gekannt gewordenen *Æstriden* und insbesondere über zwei neue, von Dr. Holub aus Sud Afrika Mitgebrachte Larven aus dieser gruppe. Sitz. Ber. K. A. Wiss. Wien. Math. Naturw Classe, C. I., Abt. 1, 1892, p. 10.