

## TRAITEMENT D'UN CHEVAL DOURINÉ PAR LE BAYER 205

Par L. BALOZET, G. LAVIER et H. VELU

Cheval D/15, 10 ans ; entre le 3 août 1922 à l'Infirmierie vétérinaire indigène de Beni-Mellal.

Il présente à ce moment de la parésie des membres postérieurs rendant l'allure du trot impossible ; parésie de la verge ; présence de taches dépigmentées arrondies sur le fourreau et l'extrémité de la verge.

Un chien inoculé le 3 août avec 250 cc. de sang citraté de ce cheval, dans le péritoine, montre le 18 août de l'œdème des organes génitaux avec présence de trypanosomes.

Le cheval est d'abord traité à l'atoxyl, en injections intraveineuses : 10 août : 3 gr. ; 12, 14, 16, 18 et 20 août : 5 gr. ; soit au total 28 gr. en 6 injections et en 11 jours.

Les symptômes paralytiques restent à peu près stationnaires ; l'allure du trot est toujours impossible.

Le traitement par le Bayer 205 est institué : le 6 septembre, 1 gr. intraveineux (en solution à 10 p. 100), le 7, 4 gr., le 9, 2 gr. ; au total, 7 gr. en 4 jours.

Dès le 9 septembre, les symptômes sont très amendés ; une semaine plus tard, ils ont complètement disparu.

L'animal a été revu le 28 octobre et le 8 novembre. Entre ces deux dates, il a pris part avec son propriétaire à des opérations militaires remarquablement dures en montagne. Son cavalier n'a rien remarqué de particulier pendant toute cette période ; la démarche à toutes les allures est normale.

*Laboratoires du Service de l'élevage de Casablanca et de Meknès et  
Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de médecine de Paris.*