Kalicephalus colubri Ortlepp. *Strongylidæ*? Duodénum. Colubridé. Est africain. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 172.

Kalicephalus coronellæ Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac. *Coronella triangulum*. Amérique du Nord. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 176.

Kalicephalus nigeriensis Ortlepp. *Strongylidæ*? Duodénum. Ophidien. Nigéria. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 178.

Kalicephalus indicus Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac et duodénum. *Zamenis mucosus* et *Tropidonotus piscator*. Inde. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 180.

Kalicephalus philodryadus Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac, duodénum et intestin. *Philodryas serra*. Amérique du Sud. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 183.

Kalicephalus parvus Ortlepp. *Strongylidæ*. Estomac. *Coronella getula*. Amérique du Nord. *Journ. of Helminthology*, I, septembre 1923, p. 187.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Hémiptères

Triatoma Bouvieri Larrousse. *Reduviidæ*. Nha-Trang (Annam). *Ann. de Parasitologie*, II, 1924, p. 67.

F. LARROUSSE.

Répertoire des hôtes nouveaux

Lobiraneillus lobatus Lath. Charadriiformes. *Monopylidium macracanthum* Fuhrm. Australie. Maplestone et Southwell. *Annals. trop. Med. and Parasit.*, XVII, 1923, p. 322.

Oncomelania hupensis (Gredler). Prosobranches. *Schistosoma japonicum*. Soochow (province de Kiangsu, Chine). Meleney et Faust. *China med. Journ.*, XXVII, 1923, p. 541.

C. JOYEUX.

Le Gérant : F. AMIRAULT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT (personnel intéressé). — 28.341

PLANCHE I.

Actinomycose bovine souche Lucet (France)

FIG. 1. — Grains avec massues dans le pus des tumeurs. Coloration au picro-carmin glycéринé.

FIG. 2. — Autre aspect des grains du même cas d'actinomycose.

FIG. 3. — Pus écrasé et étalé, puis coloré par la méthode de Gram.

FIG. 4. — Coloration d'un grain par la méthode de Lignières-Spitz.

PLANCHE I

Actinomyctose bovine souche Lucet (France)

Fig. 1a — Grains avec masses dans le pus des tumeurs. Coloration au picro-carmin érythrène.

Fig. 2. — Autre aspect des grains du même cas d'actinomyctose.

Fig. 3. — Pas écrasé et étalé, puis coloré par la méthode de Gram.

Fig. 4. — Coloration d'un grain par la méthode de Lignières-Spitz.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Demoulin, sc.

PLANCHE II

Actinomycose bovine souche Lucet (France)

FIG. 1. — Culture des grains sur sérum de bœuf, âgée de 24 heures. Coloration au Gram des filaments dichotomisés. Il n'y a pas encore de thallospores.

FIG. 2. — Même culture âgée de 2 jours. Coloration au Gram du corps de la colonie constitué surtout par des filaments.

FIG. 3. — La partie efflorescente superficielle de la même colonie de 2 jours colorée au Gram et formée presque exclusivement de thallospores qui ont l'aspect de cocci.

Actinomycose bovine souche Lucet (France)

- Fig. 1. Culture des grains sur sérum de bovin âgé de 24 heures. Colonisation au Gram des éléments histologiques. Il n'y a pas encore de thalassomycètes.
- Fig. 2. Même culture âgée de 2 jours. Colonisation au Gram du corps de la colonie constituée surtout par des thalassomycètes.
- Fig. 3. La partie efflorescente superficielle de la même colonie de 2 jours colorée au Gram et formée presque exclusivement de thalassomycètes qui ont l'aspect de cocci.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Demoulin, sc.

PLANCHE III

Actinomybose bovine souche Lucet (France)

FIG. 1. — Culture âgée de 10 jours sur sérum de bœuf (commencement de liquéfaction).

FIG. 2. — Culture de 10 jours sur gélose, faite en ensemençant la partie filamenteuse d'un premier passage.

FIG. 3. — Culture faite le même jour également sur gélose, mais en ensemençant seulement la partie efflorescente du premier passage.

FIG. 4. — Culture sur gélose âgée de 22 jours.

FIG. 5. — Culture sur pomme de terre simple âgée seulement de 4 jours.

FIG. 6. — Culture sur pomme de terre glycinée âgée de 16 jours.

Plaque III

Actinomyces bovis souche Lucet (France)

Fig. 1. — Culture âgée de 10 jours sur sérum de bœuf (commencement de putréfaction).

Fig. 2. — Culture de 10 jours sur gélose, faite en ensémençant la partie fluide de la Fig. 1.

Fig. 3. — Culture faite le même jour également sur gélose, mais en ensémençant seulement la partie efflorescente du premier passage.

Fig. 4. — Culture sur gélose âgée de 22 jours.

Fig. 5. — Culture sur pomme de terre simple âgée seulement de 1 jour.

Fig. 6. — Culture sur pomme de terre pivotée âgée de 16 jours.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Demoulin, sc.

PLANCHE IV

Actinomycoze bovine souche Palermo (République Argentine)

FIG. 1. — Culture sur gélose âgée de 8 jours.

FIG. 2. — Culture sur gélose âgée de 10 jours.

FIG. 3. — Culture sur pomme de terre simple âgée de 11 jours.

FIG. 4. — La même âgée de 14 jours.

FIG. 5. — La même après 20 jours.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Demoulin, sv.

PLANCHE V

Actinomycoïse bovine souche Palermo (République Argentine)

FIG. 1. — Autre aspect d'une culture de 20 jours sur pomme de terre simple.

FIG. 2. — Culture de 7 jours sur pomme de terre glycéinée.

FIG. 3. — La même après 28 jours de culture.

FIG. 4. — Aspect du fond de la précédente culture après 75 jours.

FIG. 5. — Culture de 6 jours sur sérum.

Actinomyces bovis souche Palermo (République Argentine)

- Fig. 1. — Aspect d'une culture de 30 jours sur pomme de terre stérile.
 Fig. 2. — Culture de 7 jours sur pomme de terre stérile.
 Fig. 3. — La même après 28 jours de culture.
 Fig. 4. — Aspect du fond de la précédente culture après 35 jours.
 Fig. 5. — Culture de 6 jours sur serum.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Demonliu, sc.

PLANCHE VI

Actinomycose bovine souche Laboulaye (République Argentine)

FIG. 1. — Culture de 14 jours sur sérum, en voie de liquéfaction.

FIG. 2. — Culture de 21 jours sur gélose. L'ensemencement a été fait peu de jours après l'isolement de l'*Actinomyces*.

FIG. 3. — Culture de 30 jours sur gélose. L'ensemencement a été fait avec le même microbe que celui de la fig. 2, mais 4 mois après son isolement des lésions.

FIG. 4. — Culture de 9 jours sur pomme de terre simple.

FIG. 5. — La même culture après 19 jours.

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Demoulin, sc.

PLANCHE VII

Actinomycose bovine souche Laboulaye (République Argentine)

FIG. 1. — Autre aspect d'une culture de 22 jours sur pomme de terre simple.

FIG. 2. — Culture de 12 jours sur pomme de terre glycérinée.

FIG. 3. — Culture de 15 jours sur pomme de terre glycérinée provenant d'un second cas d'actinomycose de Laboulaye. L'aspect est tout différent.

FIG. 4. — Culture de 17 jours du premier cas Laboulaye sur pomme de terre glycérinée.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Demoulin, sc.

PLANCHE VIII

Actinomycose bovine souche Bergès (République de l'Uruguay)

FIG. 1. — Culture de 6 jours sur sérum non encore liquéfié.

FIG. 2. — Culture de 3 jours sur gélose.

FIG. 3. — Culture de 8 jours sur gélose.

FIG. 4. — Culture de 30 jours sur pomme de terre simple.

PLANCHE VIII

Actinomyces bovis (République de l'Uruguay)

Fig. 1. — Culture de 6 jours sur agar non encore stérilisé.

Fig. 2. — Culture de 3 jours sur gélose.

Fig. 3. — Culture de 6 jours sur gélose.

Fig. 4. — Culture de 30 jours sur pomme de terre simple.

Fig. 4.

Fig. 3.

Fig. 2.

Fig. 1.

Demoulin, sc.