ANNALES DE PARASITOLOGIE

HUMAINE ET COMPARÉE

TOME II

OCTOBRE 1924

N° 4

MÉMOIRES ORIGINAUX

LES LARVES PRIMAIRES DES TACHINAIRES

A ŒUFS MICROTYPES

Par W. R. THOMPSON

(Suite et fin)

Zenillia pexops B. B.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 262 × 0 mm., 202, environ ; larve : 0 mm., 369 × 0 mm., 190, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires à part les crochets ; organes sensoriels petits, organe antennaire moins long que large.

Segment I avec un groupe de crochets dont la plupart à base étroite et allongée, sur le bord antérieur de la région dorsale. Sur le bord antérieur de la région ventrale, un groupe semblable, dont les éléments sont cependant moins forts que ceux du dos ; entre ces deux groupes, une série pleurale d'éléments très fins et délicats. Sur le bord antérieur du segment II, une bande composée dorsalement de trois rangées, ventralement de quatre et, dans la région pleurale, de 2, les éléments des rangées antérieures à base allongée et étroite, les éléments postérieurs courts et petits. Sur le bord antérieur du segment III, une bande semblable, mais moins large, composée d'éléments beaucoup moins forts. Sur le bord antérieur du segment IV, une bande de crochets encore plus délicats, surtout dans les régions dorsale et pleurale. Sur les segments suivants, les parties dorsale et pleurale de la bande de plus en plus

difficiles à distinguer, les éléments de ces régions très délicats et transparents ; mais la partie ventrale de la bande de plus en plus développée ; les bandes des segments V à VII composées de trois rangées, celles des segments VIII à X de 5 ou 6 rangées et celle du segment XI de 3. En réalité, sur les segments V et VI il apparaît, dans la région ventrale, au bord postérieur, une ligne de crochets très délicats. Sur le bord postérieur des segments VII à X, il y a trois de ces rangées. Le segment XI est en réalité sans crochets, à part deux ou trois éléments très délicats dans la région pleurale antérieure (fig. 28 et fig. II).

Chambres feutrées (fig. II) assez robustes, environ deux fois aussi longues que larges (longueur : 0 mm., 0144 ; largeur : 0 mm., 0072) (fig. 10).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 13) très grande (longueur : 0 mm., 092), l'angle dorso-antérieur de la dent médiane net, mais

FIG. II. — *Zenillia pexops* B. B. A gauche, chambre feutrée et stigmate postérieur ; à droite, une rangée de crochets abdominaux.

la dent dorsale accessoire peu développée, le bord antérieur de la dent faisant avec le bord supérieur de la région antérieure un angle très ouvert, le bord inférieur de la région recourbé en bas mais sans qu'il y ait un angle net à la base de la dent ; région antérieure dans sa moitié antérieure un peu plus de moitié aussi haute que la dent médiane sur son bord antérieur, mais brusquement élargie immédiatement en arrière du milieu, sa moitié postérieure deux fois aussi haute que sa moitié antérieure ; région intermédiaire aussi haute que la moitié postérieure de la région antérieure ; région basilaire bien développée, l'aile dorsale large, quatre fois aussi longue que large, l'aile ventrale un peu moins longue que l'aile dorsale, l'échancrure intra-alare arrondie antérieurement ; plaque de la glande salivaire grande, libre, fortement pigmentée ; plaques latérales antérieures faiblement développées, de forme irrégulière.

Zenillia (Tritochæta) pullata Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 027 × 0 mm., 02, environ ; larve : 0 mm., 036 × 0 mm., 016, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires à part les crochets ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Segment I avec une bande antérieure de crochets en deux rangées, assez irrégulièrement disposées ; au milieu de la face dorsale, 4 crochets à base allongée et étroite et 3 ou 4 autres de la même forme au milieu de la face ventrale ; les autres éléments beaucoup plus petits et délicats, mais souvent à base allongée et étroite, surtout ceux des régions dorsale et pleurale, et ceux de la rangée antérieure dans la région latéro-ventrale. Segment II avec une bande antérieure comprenant dans la région dorsale 4 rangées et ailleurs 3 rangées d'éléments, dont la plupart à base allongée et étroite, seuls les crochets des rangées postérieures courts et petits. Segment III avec une bande d'éléments semblables à ceux du segment II, mais la bande moins large, de 2 ou 3 rangées seulement, les éléments des rangées antérieures moins allongés que ceux du segment précédent. Segment IV avec une longue rangée double de très petits crochets sur le bord antérieur de la région dorsale et avec une bande ventrale d'éléments assez petits mais à base allongée et étroite, très serrés les uns contre les autres et accompagnés par quelques nodules accessoires intercalés entre les sommets des crochets proprement dits ; entre la bande dorsale et la bande ventrale, un espace pleural nu. Sur les segments abdominaux II à VIII inclusivement, une bande de crochets sur le bord antérieur de la région ventrale ; les bandes des segments II à V inclusivement, sont simples et composées d'éléments très petits et très serrés les uns contre les autres ; la bande du segment abdominal VI est triple et comprend une rangée antérieure de petits nodules, une rangée postérieure de très petits crochets et une rangée intermédiaire d'éléments un peu plus grands ; la bande du segment abdominal VII est double mais la disposition des éléments est assez irrégulière. Sur le dernier segment, il n'existe qu'une seule ligne de très petits nodules pigmentés ; le nombre d'éléments dans les bandes ventrales des 7 derniers segments de l'abdomen varie de 50 à 70, selon le segment et l'échantillon considérés (fig. 37).

Stigmates postérieurs assez bien développés, les chambres feutrées 2 fois et demie aussi longues que larges (long. 0 mm., 009 ; larg. 0 mm., 0036) (fig. 46).

Armature buccale (fig. 22) de taille moyenne (long., 0 mm., 063), de forme très caractéristique, ayant la région antérieure très fortement chitinisée, noire et allongée, les régions intermédiaire et

basilaire courtes et faibles, colorées en brun clair ; dent antérieure médiane peu différenciée, le bord inférieur de cette partie de l'organe recourbé en bas antérieurement, mais assez faiblement ; l'angle dorso-antérieur distinct, mais la dent dorsale pas nettement développée, le bord antérieur de la dent inférieure faisant avec le reste du bord dorsal un angle très ouvert, le bord dorsal de la région antérieure proprement dite, faiblement convexe, son tiers intermédiaire légèrement surélevé ; la distance de l'angle dorso-antérieur à l'extrémité postérieure de cette région environ cinq fois la longueur du bord antérieur de la dent médiane, qui se termine en une pointe émoussée ; angle dorso-postérieur de la région antérieure aiguë, prolongé légèrement en arrière au-dessus de la base de la région intermédiaire ; région intermédiaire faisant avec la région antérieure un angle très marqué, de sorte que la partie postérieure de l'organe bucco-pharyngien se dirige en bas et en arrière ; région intermédiaire un peu moins d'un tiers aussi longue que la région antérieure, qui est 2 fois un tiers aussi longue que les deux régions postérieures ensemble ; aile supérieure basilaire à peu près aussi longue que la région intermédiaire, étroite et presque droite, de 6 à 1 fois aussi longue que large ; encoche intra-alaire presque aiguë antérieurement ; plaque de la glande salivaire assez grande, mais assez faiblement chitinisée ; plaques latérales antérieures très allongées, mais cachées en grande partie par la région antérieure.

Masicera sylvatica Fall.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 25 × 0 mm., 21, environ ; larve : 0 mm., 42 × 0 mm., 12, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Sur le segment I, un groupe dorsal d'une douzaine de grands crochets, tous à base allongée ; sur la face ventrale, un groupe de crochets comprenant au moins une trentaine d'éléments à base allongée, mais beaucoup plus délicats que ceux de la région dorsale ; région pleurale presque nue, portant seulement quelques rares crochets faiblement pigmentés. Segment II avec une bande antérieure comprenant 3 ou 4 rangées irrégulières d'assez grands crochets, dont les plus antérieurs allongés, les postérieurs courts, plus grands dans la région ventrale que dans la région dorsale ; segment III avec une bande antérieure traversant la face ventrale et

composée de deux ou trois rangées d'éléments pour la plupart à base allongée, la région dorsale sans crochets. Segment IV avec une courte rangée de 4 crochets, grands et espacés, sur le bord antérieur au milieu de la région ventrale ; derrière ces crochets, une ligne d'éléments extrêmement petits et très pâles qui rejoint latéralement deux ou trois de la même forme, situés du côté externe de la série des grands crochets. Sur chacun des segments V à X inclusivement, une ligne semblable à celle qui existe sur le segment IV, composée de quelques grands crochets espacés, derrière lesquels une ligne d'éléments très petits, à peine visibles, presque incolores. Le nombre des grands crochets varie, selon le segment et l'échantillon considérés, entre 3 et 8. Enfin, sur le bord antérieur du segment XI, une

Fig. III. — *Masicera sylvatica* Fall. Crochets des derniers segments abdominaux.

ligne de six crochets bien plus grands que ceux des segments précédents, arrangés trois de chaque côté, les deux groupes séparés par un espace médian ventral de cuticule nue (fig. III).

Chambres feutrées très courtes, aussi larges ou un peu plus larges que longues (long. 0 mm., 009 ; larg. 0 mm., 0076) (fig. 3).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 25) de taille moyenne (0 mm., 056) ; dent médiane bien différenciée, son bord inférieur faisant avec le bord inférieur de la région antérieure proprement dite, un angle très prononcé ; dent dorsale accessoire bien distincte, derrière elle, deux encoches peu profondes, l'une devant l'autre, de sorte qu'il existe, derrière la dent dorsale accessoire, deux autres dents bien marquées ; dent médiane effilée, 3 fois et demie aussi longue que large à la base, aiguë à son extrémité, la longueur de son bord antérieur un peu plus de la moitié de celle du bord dorsal de la région

antérieure proprement dite ; région antérieure fortement élargie postérieurement, 4 fois aussi haute à son extrémité postérieure qu'à la base de la dent médiane ; région intermédiaire haute mais courte, la distance de l'extrémité antérieure de l'encoche intra-alalaire jusqu'à l'extrémité postérieure du bord dorsal de la région antérieure un peu plus de moitié de la longueur du bord dorsal de la région antérieure proprement dite ; région basilaire bien développée, l'aile dorsale assez fortement recourbée, deux fois aussi longue que la région intermédiaire, 5 fois aussi longue que large, aiguë à son extrémité postérieure, l'encoche intra-alalaire arrondie antérieurement, l'aile inférieure un peu moins longue que l'aile supérieure ; plaque de la glande salivaire grande, pigmentée, avec un petit espace circulaire de chaque côté, près de son extrémité antérieure ; plaques latérales antérieures pigmentées, de forme irrégulière.

Ceromasia rutila Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 24×0 mm., 19, environ ; larve : 0 mm., 33×0 mm., 17, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Segment I avec un groupe dorsal de crochets dont 4 ou 5 à base relativement allongée et étroite, les autres forts mais courts ; ventralement une bande comprenant en son milieu trois ou quatre rangées de crochets assez courts, mais diminuant de largeur latéralement ; dans la région pleurale, un petit intervalle de cuticule nue sépare la bande ventrale de la bande dorsale. Segment II avec une bande antérieure de trois ou quatre rangées de crochets dont les antérieurs seulement à base relativement allongée. Segment III avec une bande antérieure beaucoup moins large, les éléments assez petits, comprenant ventralement une seule rangée un peu irrégulière, dorsalement trois rangées, les éléments antérieurs unciformes, à base un peu allongée, les éléments postérieurs en forme de petits nodules. Segment IV avec une étroite bande antérieure de deux rangées de crochets, ayant une tendance à s'effacer au milieu de la région ventrale ; dans la région ventrale, les éléments antérieurs à base allongée, les éléments postérieurs en forme de petits nodules ; dans la région dorsale, tous les éléments sont noduliformes. Sur les segments V à X inclusivement, une bande antérieure qui n'existe que dans la région ventrale. Sur les segments VIII à X inclusivement, il existe généralement, en outre, une ligne ventrale de crochets, situés sur

le bord postérieur. Le dernier segment du corps ne porte pas de crochets ; les bandes antérieures comprennent des crochets étroitement serrés, les uns contre les autres, relativement faibles, mais à base allongée et, derrière ces éléments, une rangée de nodules microscopiques ; les bandes postérieures sont simples, composées d'éléments très faibles, surtout sur l'avant dernier segment. Le nombre de crochets dans les bandes abdominales varie entre 50 et 80, selon le segment et l'échantillon considéré (fig. 26).

Chambres feutrées courtes, aussi larges que longues (0 mm., 0076 $\times$ 0 mm., 0076, environ) (fig. 26).

Armature buccale (fig. 16) (long. 0 mm., 076, environ), assez grande ; dent médiane peu différenciée, son bord postérieur sur la même ligne recourbée en bas, que le bord inférieur de la région antérieure proprement dite ; bord antérieur de la dent, denticulé, faisant avec le bord supérieur de la région antérieure, un angle très ouvert, la dent accessoire dorsale, peu distincte ; bord supérieur de la région antérieure proprement dite, un peu moins de trois fois aussi longue que le bord antérieur de la dent, qui est environ 2 fois deux tiers aussi longue que large à la base et peu aiguë au bout ; région antérieure à peine élargie en arrière, son bord dorsal un peu plus long que les régions intermédiaire et basilaire ensemble ; région intermédiaire courte mais haute, 2 fois aussi haute que la région antérieure en son milieu ; région basilaire assez bien développée, l'aile supérieure assez peu recourbée, aiguë à son extrémité, 1 fois et demie aussi longue que la région intermédiaire, un peu moins de 4 fois aussi longue que large ; encoche intra-alalaire presque aiguë antérieurement, l'aile inférieure plus allongée que l'aile supérieure ; plaque de la glande salivaire, libre, distincte, mais assez faiblement pigmentée ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Pexopsis aprica Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 214 $\times$ 0 mm., 130 (fig. 4).

Je ne possède pas la larve de cette espèce, dont la biologie est encore inconnue ; les œufs sont microtypes et semblent destinés à être pondus sur des feuilles ; la forme de l'œuf est assez caractéristique : il est de couleur brune et présente au pôle apical un épaississement hémisphérique très densément pigmenté dont la signification est inconnue.

Erycia ferruginea Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 297 $\times$ 0 mm., 238, environ (fig. 6, 8, 11).

Nous avons disséqué plusieurs femelles de cette espèce sans en trouver qui présentaient des œufs murs : la coque de l'œuf est épaisse, colorée en jaune brunâtre et présente une sculpture assez caractéristique ; vu la taille de ces œufs et le fait qu'ils renferment toujours, chez les échantillons examinés, des embryons peu avancés, nous n'osons pas affirmer qu'ils soient déposés sur les feuilles ; chaque femelle en renferme, pourtant, un nombre très considérable, tandis que, chez les espèces déposant leurs œufs sur le corps de l'hôte, il n'existe à la fois dans l'utérus qu'un petit nombre d'œufs.

Prosopæa instabilis Rond.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 20×0 mm., 17, environ.

La larve de cette espèce ressemble de très près à celle de *Ceromastia rutila* Meig. ; elle s'en distingue par la forme de l'armature buccale, qui a la région antérieure plus allongée par rapport aux régions postérieures, par l'aile supérieure, presque 2 fois aussi longue que l'aile inférieure, tandis que chez *C. rutila* l'aile inférieure est presque aussi longue que l'aile supérieure et par la forme des chambres feutrées, trois fois aussi longues que larges chez *P. instabilis*, aussi larges que longues, chez *C. rutila*.

Peau incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets : organes sensoriels petits, organe antennaire moins long que large.

Segment I avec un groupe dorsal et un groupe ventral de crochets, ceux de la région dorsale, forts, mais pas très allongés, ceux de la région ventrale plus faibles. Segment II avec une bande antérieure composée d'une seule ligne de crochets assez forts, sauf dorsalement et ventralement, où la ligne est double. Segment III avec une ligne antérieure de crochets, ceux de la région dorsale, assez forts, ceux de la région ventrale, faibles. Segment IV avec une bande antérieure ventrale de plusieurs rangées de crochets, dont les antérieurs assez forts. Sur les bords antérieurs des segments V à X inclusivement, des bandes semblables, ceux des segments IX et X étant seulement plus larges que les autres. Enfin, au bord antérieur du segment XI deux lignes d'éléments très délicats sur le bord antérieur de la région ventrale. Le nombre de crochets dans ces bandes varie de 25 à 40 environ.

Chambres feutrées petites, environ trois fois aussi longues que larges (long. 0 mm., 0108 ; larg. 0 mm., 0036) (fig. 20).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 23) assez grande (0 mm., 06, environ) ; région antérieure très allongée, 1 fois et quart aussi longue que les régions intermédiaires et basilaires ensemble ; dent ventrale médiane assez faiblement différenciée, pas d'angles net entre le

bord postérieur de la dent et le bord inférieur de la région antérieure proprement dite ; dent dorsale accessoire petite mais distincte ; bord antérieur de la dent médiane faiblement denticulée, 2 fois et demie aussi long que la dent est large à la base ; région antérieure peu élargie postérieurement, allongée, sur son bord dorsal environ 11 fois aussi longue que sa hauteur à la base de la dent médiane ; aile supérieure basilaire droite, environ trois fois aussi longue que large, presque deux fois aussi longue que l'aile inférieure, les deux ailes fortement écartées ; plaque de la glande salivaire grande, mais faiblement pigmentée ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Frontina læta Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 297 × 0 mm., 238, environ ; larve : 0 mm., 450 × 0 mm., 214, environ.

Peau incolore et transparente, sans accidents cuticulaires à part les épines ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Segment I avec une bande assez large, composée dorsalement et ventralement de trois rangées d'épines, mais diminuant de largeur sur les côtés du corps, les éléments dorsaux antérieurs à base allongée et étroite, les éléments ventraux presque aussi forts que ceux du dos. Segment II avec une bande antérieure large, comprenant deux ou trois rangées sur les côtés, quatre rangées dorsalement et ventralement, les éléments antérieurs à base allongée et étroite, ceux de la face ventrale presque aussi grands que ceux de la face dorsale. Segment III avec une bande plus étroite, de deux ou trois rangées dans les régions ventrale et pleurales, de quatre rangées sur le dos, les éléments antérieurs dorsaux, moins forts que les éléments antérieurs ventraux, les éléments postérieurs dorsaux courts et petits. Segment IV avec une courte bande ventrale et une courte bande dorsale, les régions pleurales nues ; la bande ventrale comprend une douzaine de crochets courts et forts, dirigés en arrière, et une série de nombreux éléments très petits mais aigus, situés en arrière et en dehors de la série des grands crochets ; bande dorsale composée de deux ou trois rangées d'épines très petites et faibles. Segments V à X avec une courte bande ventrale de 6 à 12 crochets grands et espacés, dirigés en arrière et accompagnés de quelques éléments petits et faibles. Sur le bord postérieur des segments VIII et IX, une série ventrale de 5 ou 6 grands crochets, dirigés en avant, la série du segment IX accompagnée par une rangée de petits nodules, située immédiatement en avant. Segment X avec

une série ventrale faible, comprenant de chaque côté un ou deux crochets bien moins grands que ceux des segments antérieurs et quelques autres épines très faibles et très petites ; dernier segment sans crochets (fig. 49).

Chambres feutrées assez petites, courtes et larges, presque aussi larges que longues (long. 0 mm., 016 ; larg. 0 mm., 014) (fig. 35).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 24) très grande (0 mm., 104), assez semblable à celle de *Sturmia scutellata* dans sa forme générale, avec une encoche allongée et peu profonde derrière la dent dorsale accessoire ; mais la dent médiane courte et large ; région antérieure avec le bord ventral assez faiblement recourbé en bas, en avant, sans angle net à la base de la dent, qui se termine en une pointe recourbée en bas et qui est environ 1 fois et demie aussi longue que large à sa base ; dent dorsale accessoire distincte mais petite ; derrière elle, une encoche allongée mais peu profonde, qui est moitié aussi longue que le bord antérieur de la dent ventrale ; région antérieure s'élargissant postérieurement, environ deux fois aussi haute en arrière qu'à la base de la dent, son bord dorsal presque quatre fois aussi long que le bord antérieur de la dent ventrale médiane ; région intermédiaire, depuis son angle antérieur dorsal jusqu'à l'extrémité antérieure de l'encoche intra-alaire, environ 1 fois et quart aussi longue que le bord dorsal de la région antérieure ; région basilaire bien développée, l'aile dorsale aussi longue que la région intermédiaire, nettement recourbée ; l'aile inférieure moins allongée que l'aile supérieure ; plaque de la glande salivaire, libre, assez grande ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Pales pavida Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 20 × 0 mm., 142, environ ; larve : 0 mm., 273 × 0 mm., 12, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets.

Sur la face dorsale du segment I, un groupe de 16 ou 18 crochets dont les 8 postérieurs allongés, surtout les 4 postérieurs, qui sont les plus grands de tous ; sur la face ventrale, un groupe semblable, où les éléments postérieurs sont allongés, mais beaucoup plus grêles que les éléments dorsaux ; entre ces deux groupes, un espace pleural, nu ; sur le segment II, une bande à peu près continue de crochets sur le bord antérieur du segment, composée, sauf au milieu de la face dorsale et au milieu de la face ventrale, d'une rangée d'éléments un peu délicats mais à base allongée ; au milieu de la face

dorsale, 3 rangées, dont les éléments pour la plupart grands et à base allongée ; au milieu de la face ventrale les crochets généralement plus courts et plus forts que les autres ; sur le bord antérieur du segment III, une ligne de crochets, dont les éléments ventraux et pleuraux, assez forts, à base allongée et grêle, les éléments dorsaux très petits, presque noduliformes ; sur le segment IV, les crochets antérieurs, noduliformes, en une seule rangée dans la région dorsale, en une double rangée dans la région ventrale, où les éléments antérieurs sont à base allongée, les éléments postérieurs courts, mais tous relativement petits ; entre la bande dorsale et la bande ventrale, un espace pleural, nu ; sur le bord antérieur du segment V, une bande ventrale double de crochets petits et délicats, et, de chaque côté, une courte ligne pleurale d'éléments à peine visibles, séparés de la bande ventrale par un espace de cuticule nue ; sur les segments VI à XI inclusivement les crochets ont le même arrangement, seulement les deux dernières bandes composées ici de 3 rangées, au lieu de 2, la rangée antérieure appartenant morphologiquement, dans ces deux cas, aux bords postérieurs des segments IX et X, respectivement ; les crochets des bandes ventrales sont nombreux, très serrés les uns contre les autres ; leur nombre varie de 50 à 90, selon le segment et l'individu considérés (fig. 40).

La larve est apneustique ; on n'y voit ni stigmates ni chambres feutrées.

Armature buccale (fig. 27) assez grande (long. 0 mm., 064) ; dent médiane très bien développée, son bord postérieur faisant avec le bord inférieur de la région antérieure proprement dite un angle net ; dent dorsale accessoire bien développée, avec un petit denticule net derrière et un autre devant lui ; dent médiane très effilée, trois fois aussi longue que large à la base, la longueur de son bord antérieur moitié de celle du bord supérieur de la région antérieure proprement dite ; la région antérieure fortement élargie en arrière, environ huit fois aussi haute à son extrémité postérieure qu'à la base de la dent médiane ; région intermédiaire aussi haute que la partie postérieure de la région antérieure, la distance de son extrémité antérieure jusqu'à l'extrémité antérieure de l'encoche intra-alaire à peu près égale à la longueur du bord dorsal de la région antérieure proprement dite ; aile dorsale basilaire 1 fois et demie aussi longue que le bord dorsal de la région intermédiaire, un peu élargie vers son extrémité, qui est aiguë, environ deux fois aussi longue que l'aile inférieure ; plaque de la glande salivaire grande, mais faiblement pigmentée ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Monochæta albicans Fall.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 190 × 0 mm., 131, environ ; larve : 0 mm., 262 × 0 mm., 120, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels petits ; organe antennaire moins long que large.

Segment I avec une bande antérieure qui comprend dans la région dorsale 5 ou 6 grands crochets à base allongée, et d'autres plus courts, dans la région ventrale 2 rangées d'éléments courts mais forts ; sur le bord antérieur du segment II, 3 rangées irrégulières, dont l'antérieure composée d'éléments à base allongée et étroite, la postérieure composée d'éléments courts et petits ; segment III avec une bande antérieure composée de 2 ou 3 rangées assez irrégulières de crochets, dont les antérieurs relativement forts, un peu allongés, les postérieurs en forme de petits nodules ; sur les segments IV à X inclusivement, une bande ventrale antérieure composée de deux rangées un peu irrégulières, les éléments antérieurs courts mais assez forts, les éléments postérieurs en forme de petits nodules ; le segment VIII porte une rangée ventrale de crochets sur son bord postérieur ; le segment IX porte une rangée semblable sur le bord postérieur, accompagnée, en outre, par une ligne de nodules située antérieurement aux crochets ; le segment X porte des rangées de petits nodules sur le bord postérieur de la région ventrale ; le segment XI est nu ; les bandes abdominales comprennent en général une soixantaine de petits nodules et crochets (fig. 52).

Chambres feutrées bien développées, environ deux fois aussi longues que larges (long. 0 mm., 0108 ; larg. 0 mm., 0054) (fig. 52).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 29) assez grande (long. 0 mm., 067) ; dent médiane grande, se terminant en une pointe émoussée, son bord antérieur très finement denticulé, son bord postérieur sur la même ligne que le bord inférieur de la région antérieure proprement dite, la dent dorsale accessoire petite mais distincte, derrière elle une encoche peu profonde ; bord antérieur de la dent médiane 1 fois et demie aussi long que large à sa base ; bord dorsal de la région antérieure proprement dite trois fois aussi long que le bord antérieur de la dent médiane ; bord supérieur de la région intermédiaire faisant avec le bord supérieur de la région antérieure un angle presque droit ; la longueur du bord supérieur de la région antérieure proprement dite 2 fois un tiers de la longueur de la région intermédiaire, mesurée de l'extrémité antérieure de son bord dorsal jusqu'à l'extrémité antérieure de l'encoche intra-alair ; région basi-

laire petite, faiblement pigmentée, l'aile supérieure droite de la même longueur que la région intermédiaire, de quatre à cinq fois aussi longue que large, légèrement élargie vers l'extrémité postérieure, qui est tronquée ; l'aile inférieure petite et faiblement pigmentée, moitié aussi longue que l'aile supérieure ; plaque de la glande salivaire faiblement pigmentée, comme les plaques latérales antérieures, dont la forme est irrégulière.

Chez cette espèce, la pigmentation de la région antérieure n'est pas uniforme, comme chez *Zenillia pullata*, la moitié antérieure étant brune sombre, la moitié postérieure brune pâle et l'angle dorsal postérieur n'est pas prolongé en arrière au-dessus de la base de la région intermédiaire.

Brachychæta spinigera Rond.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 285 × 0 mm., 202, environ ; larve : 0 mm., 369 × 0 mm., 155, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Segment I avec une bande antérieure de crochets, s'élargissant dorsalement et ventralement ; les crochets de la région dorsale, grands, les éléments antérieurs à base allongée et étroite, ventralement et latéralement des crochets forts, mais plus courts et plus petits que les éléments dorsaux ; sur le segment II, une bande antérieure de deux ou trois rangées de crochets, plus large dorsalement et ventralement que sur les côtés, les éléments antérieurs de la bande à base étroite et allongée, les éléments postérieurs plus courts ; segment III avec une bande antérieure d'une ou deux rangées de crochets, moins grands que sur les segments précédents ; segment IV ayant sur le bord antérieur une ou deux rangées de petits crochets dans les régions ventrale et dorsale, mais la région pleurale nue ; sur les bords antérieurs des segments V à X inclusivement, une bande antérieure ventrale de petits crochets ; sur les bords postérieurs des segments VII, VIII et IX, une bande ventrale semblable ; les crochets des bandes antérieures se dirigent en arrière, les crochets des bandes postérieures se dirigent en avant ; les bandes antérieures composées de 30 à 35 crochets, les bandes postérieures d'une quinzaine d'éléments (fig. 55).

La larve est apneustique, sans stigmates ni chambres feutrées.

Armature bucco-pharyngienne (fig. 42), allongée et grêle (long. 0 mm., 086, environ) ; région antérieure avec la dent médiane bien différenciée, son bord antérieur faisant avec l'axe longitudinal de

cette région un angle presque droit ; dent médiane assez effilée, environ deux fois deux tiers aussi longue que large à sa base, son extrémité aiguë ; dent dorsale accessoire très petite ; région antérieure légèrement courbée, s'élargissant un peu en arrière, son bord dorsal environ deux fois aussi long que le bord antérieur de la dent ; région intermédiaire assez allongée, la distance de l'extrémité antérieure de son bord dorsal à l'encoche intra-alaire, égale à la longueur du bord dorsal de la région antérieure ; aile basilaire dorsale légèrement recourbée, allongée, environ 9 fois aussi longue que large, plus longue que la région intermédiaire ; aile basilaire inférieure assez fortement écartée de l'aile supérieure, sa partie pigmentée moitié aussi longue que cette dernière, assez large mais faiblement colorée ; plaque de la glande salivaire faible, à peine pigmentée ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière, colorées en brun clair comme le reste de l'armature.

Histochoëta marmorata Fabr.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 285 × 0 mm., 214, environ ; larve : 0 mm., 416 × 0 mm., 202, environ.

Peau incolore et transparente, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels très petits, l'organe antennaire moins long que large.

Segment I avec une bande antérieure comprenant dorsalement 3 ou 4 rangées de crochets, à base allongée et étroite, des éléments pleuraux relativement faibles, des éléments ventraux, en 2 ou 3 rangées, forts, mais plus courts que ceux du côté dorsal ; sur le bord antérieur du segment II, une forte bande de 2 ou 3 rangées de crochets, dont les éléments antérieurs dorsaux à base étroite et très allongée ; sur le bord antérieur du segment III, une rangée simple de crochets forts mais courts ; sur les bords antérieurs des segments IV à X inclusivement, une courte ligne de crochets forts, courts et espacés, dans la région ventrale comprenant de 4 à 5 éléments ; en outre, les segments VII, VIII et IX portent quelquefois aussi, sur leurs bords postérieurs, au milieu de la face ventrale, quelques crochets, dirigés en avant, tandis que les autres se dirigent en arrière ; enfin, le segment XI porte sur son bord antérieur ventral, 2 crochets séparés par un intervalle assez grand.

Chambres feutrées grandes mais courtes, aussi larges que longues (long. 0 mm., 016 ; larg. 0 mm., 016, environ).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 39) assez grande (long. 0 mm., 096, environ) ; bord inférieur de la région antérieure droite ; bord antérieur de la dent sur la même ligne courbée que le reste

du bord dorsal de la région antérieure ; ces deux régions séparées par la dent accessoire dorsale qui est petite, mais nette ; la dent médiane environ aussi large au niveau de la dent dorsale accessoire que la longueur de son bord antérieur, se terminant en une pointe aiguë et recourbée en bas en forme d'un petit crochet ; bord antérieur de la dent un peu moins de moitié aussi long que le reste du bord supérieur de la région antérieure ; région s'élargissant fortement en arrière, plus de deux fois aussi haute à son extrémité postérieure, qu'au niveau de la dent accessoire dorsale : région intermédiaire se rétrécissant en arrière à peu près aussi longue que la totalité de la région antérieure ; région basilaire à peu près aussi longue que la région intermédiaire ; l'aile dorsale nettement courbée, environ 6 fois aussi longue que large ; l'aile ventrale faible, la longueur de sa partie pigmentée environ moitié de celle de l'aile dorsale ; plaques latérales antérieures, et plaque de la glande salivaire à peine visibles dans les échantillons examinés.

Hebia flavipes R.-D.

La larve de cette espèce ressemble étroitement au premier stade, à celle de *H. marmorata* et je n'ai pu trouver jusqu'ici de bons caractères pour les séparer ; la région antérieure paraît être moins large par rapport à sa longueur chez *H. flavipes* que chez *H. marmorata* ; le crochet terminal de la dent médiane est net et bien développé chez *H. marmorata*, généralement faible, chez *H. flavipes* ; les crochets abdominaux sont chez *H. flavipes* plus grands et un peu plus nombreux que chez *H. marmorata* ; la rangée de crochets sur le bord antérieur du segment XI comprend ici de 5 à 7 crochets ; mais tous ces caractères paraissent sujets à variation ; des études plus approfondies sur un matériel plus riche nous permettront seulement de savoir s'il est possible de distinguer ces 2 espèces au stade primaire (fig. 30, 43, 51).

Gonia

Les larves du genre *Gonia* se distinguent facilement de celles de tous les autres tachinaires que nous connaissons ; les plaques latérales antérieures de l'armature buccale s'appliquent l'une contre l'autre au-dessus de la région antérieure et se prolongent en avant en une dent allongée et aiguë ; l'aile dorsale basilaire est droite, allongée, et brusquement renflée au bout ; sur la face dorsale du premier segment se trouve un groupe de crochets, courts, forts, épais et très chitinisés, qui forment ensemble un amas dense et noir où l'on distingue difficilement les éléments individuels.

Gonia capitata Deg.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 25 × 0 mm., 154 ; larve : 0 mm., 33 × 0 mm., 14.

Peau incolore, sans accidents cuticulaires à part les crochets ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Le segment I porte sur le bord antérieur de la région dorsale (fig. 34), un amas dense et noir composé d'une dizaine de crochets forts, épais et très pigmentés ; sur le bord antérieur de la région ventrale, une rangée double de petits crochets, courts et assez faiblement pigmentés ; sur le bord antérieur du segment II, une bande de 2 ou 3 rangées de crochets assez faiblement pigmentés, les éléments antérieurs de la région dorsale à base allongée et étroite ; au milieu du bord antérieur ventral, un groupe d'éléments assez forts mais courts ; sur le bord antérieur du segment III, une bande étroite irrégulièrement double, les éléments antérieurs dorsaux et pleuraux, à base étroite et allongée, les autres relativement faibles, étroits et courts ; sur le bord antérieur du segment IV, une bande complète et étroite, irrégulièrement double à certains endroits, composée d'éléments en général assez faibles, courts et étroits ; sur le bord antérieur du segment V, une bande semblable, simple, mais largement interrompue dans la région pleurale qui est nue ; sur les segments VI à X inclusivement, l'arrangement est semblable à ce que nous venons de décrire ; mais au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'extrémité postérieure, les éléments de la bande dorsale deviennent de plus en plus faibles, comme le font également ceux de la partie externe de la bande ventrale, à l'exception de quelques-uns situés à l'extrême bout de cette bande, qui restent forts ; ce groupe d'éléments, à base allongée et étroite, constitue ainsi sur chaque segment un îlot pleural, relié à la bande ventrale seulement par une série de crochets, petits, faibles et peu visibles ; enfin, le dernier segment du corps porte sur le bord antérieur de la face ventrale, une série de crochets dirigés en arrière, comprenant 8 ou 10 éléments très grands et très forts, les plus grands mesurant environ 0 mm., 014 de long sur 0 mm., 0036 de large et de part et d'autre de cette série, quelques éléments accessoires moins forts.

En plus des crochets, il existe chez cette larve, sur le premier segment du corps, de chaque côté, sur la surface dorso-latérale, une étroite bande chitinisée de couleur brun claire, de 10 à 14 fois aussi longue que large, qui part du bord externe du groupe des grands crochets dorsaux et s'en va en arrière vers le bord postérieur du segment.

Chambres feutrées moins de 1 fois et demie aussi longues que lar-

ges (long. 0 mm., 0108), tronquées postérieurement mais arrondies antérieurement vers la jonction avec la trachée maîtresse (fig. 38).

Organe bucco-pharyngien (fig. 36) grand (long. 0 mm., 081) ; région antérieure rétrécie à la base de la dent médiane, s'élargissant brusquement en arrière, à son extrémité postérieure environ 3 fois aussi haute que derrière la dent ; cette dernière bien développée, son bord antérieur droit ou très légèrement convexe, son bord postérieur aussi, aiguë à l'extrémité, 1 fois et demie aussi longue que large à la base, la dent accessoire dorsale petite mais distincte ; bord dorsal de la région antérieure légèrement sinué, faisant avec le bord supérieur de la région intermédiaire un angle très fort ; région intermédiaire large, sa longueur, depuis l'angle dorso-antérieur jusqu'au niveau de l'encoche intra-alalaire, presque égale à celle de la région antérieure ; ailes dorsale et ventrale de la région basilaire, parallèles et droites, l'aile dorsale, étroite, allongée et tout à fait rectiligne, environ 6 fois aussi longue que large, brusquement renflée au bout ; l'aile ventrale environ moitié aussi longue que l'aile dorsale, 2 fois et demie aussi large ; l'encoche intra-alalaire arrondie en avant ; plaque de la glande salivaire fusionnée latéralement avec les bords inférieurs de la région intermédiaire, une encoche semi-circulaire entre son bord postérieur et le bord antérieur de l'aile basilaire ventrale ; plaques latérales antérieures se fusionnant au-dessus de la région antérieure, prolongées antérieurement en une dent effilée et aiguë, la partie libre de la dent environ moitié aussi longue que le bord antérieur de la dent médiane ; partie ventrale de la plaque assez large, se terminant en un crochet court, large et aigu, dont l'extrémité dépasse légèrement le bord antérieur de la dent médiane.

Gonia cilipeda Rdi.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 262 × 0 mm., 190, environ ; larve : 0 mm., 416 × 0 mm., 167, environ.

Peau incolore et transparente, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels très petits, l'organe antennaire moins long que large.

Le segment I porte sur le milieu de la face dorsale, un amas dense et noir, composé d'une dizaine de crochets, forts, épais et très pigmentés ; sur la face ventrale, une bande de crochets relativement faibles, à base étroite et assez allongée, derrière lesquels quelques éléments minuscules ; sur le bord antérieur du segment II, une bande irrégulièrement double, comprenant des éléments à base étroite et allongée, surtout dans les régions dorsale et pleurales, les éléments dorsaux à base allongée mais large, les éléments pleuraux,

à base allongée et très étroite, plus allongée et plus étroite que chez *G. capitata*; segment III avec une bande antérieure irrégulièrement double; les éléments ventraux petits et faibles, les éléments pleuraux à base allongée et étroite, les éléments dorsaux forts, à base allongée et assez large; derrière les crochets dorsaux, une rangée de nodules microscopiques; sur le bord antérieur du segment IV, une bande antérieure complète, irrégulièrement double dans la région ventrale, où les éléments sont faibles et dans la région dorsale; les crochets antérieurs latéro-dorsaux et un groupe de 3 ou 4 crochets pleuraux, assez forts, à base allongée; les autres éléments faibles; sur le segment V, une bande largement interrompue dans la région pleurale, qui est nue; les éléments dorsaux très faibles, ceux de la bande ventrale, également faibles, surtout près des extrémités latérales de la bande, toutefois, les 3 ou 4 derniers éléments grands, forts, à base allongée et étroite; sur le bord antérieur des segments VI à X inclusivement, l'arrangement est semblable à ce qui vient d'être décrit; toutefois, la partie dorsale de la bande se raccourcit et s'efface progressivement sur les segments VI et VII et sur ce dernier segment n'est représentée que par quelques éléments à peine visibles, même sous un très fort grossissement; le bord antérieur dorsal des segments VIII à XI inclusivement, est nu; sur tous les segments, jusqu'au segment X inclusivement, le groupe de crochets pleuraux est composé d'éléments beaucoup plus longs et plus forts que les autres et les éléments entre ce groupe et le reste de la bande ventrale sont faibles; enfin, comme chez *G. capitata*, sur le bord antérieur ventral du segment XI, il existe une série de 8 à 10 éléments très grands, très forts et très pigmentés, à base étroite et allongée, les plus grands mesurant environ 0 mm., 029 x 0 mm., 0027 (fig. 56).

De chaque côté de l'amas dorsal de crochets sur le premier segment du corps, il existe une étroite bande de cuticule pigmentée, de couleur brun claire, qui s'étend en arrière presque jusqu'au bord antérieur du segment suivant.

Chambres feutrées deux fois aussi longues que larges, à peu près cylindriques, non piriformes, mais se rétrécissant légèrement vers la jonction avec la trachée maîtresse (long. 0 mm., 009) (fig. 33).

Organe bucco-pharyngien (fig. 32) fort et bien développé (long. 0 mm., 09), un peu plus grand que celui de *G. capitata*, très semblable à celui de cette dernière espèce dans sa forme générale, la seule différence vraiment notable étant dans la forme de l'aile dorsale basilaire, qui est ici environ six fois aussi longue que large, tandis que, chez *G. capitata*, elle est au moins huit fois aussi longue que large, la tige de l'aile étant chez *G. cilipecta* moins grêle que chez *G. capitata* et son expansion terminale plus forte.

Gonia divisa Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 26 × 0 mm., 17.

Les larves de cette espèce que j'ai pu examiner sont insuffisamment développées et je ne puis par conséquent en donner encore une description exacte ; par l'ensemble de ses caractères, la larve de *G. divisa* se rapproche beaucoup de celle de *G. capitata* ; mais l'aile dorsale basilaire, dont la tige est étroite, comme chez cette dernière espèce, paraît ici moins allongée. Toutefois, pour savoir vraiment si ces deux espèces, qui se distinguent très facilement à l'état adulte, peuvent être séparées au premier stade, il faudra examiner avec soin des échantillons plus avancés en âge que ceux dont je dispose (fig. 41, 48).

Gonia ornata Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 274 × 0 mm., 202, environ ; larve : 0 mm., 37 × 0 mm., 15, environ.

La larve de cette espèce présente tous les caractères que nous venons de signaler chez les autres espèces du genre *Gonia* ; mais elle se distingue facilement de toutes celles que nous avons pu examiner, par la forme de l'armature buccale, très grande et très allongée, se terminant en avant par deux dents aiguës et à peu près de la même grandeur, séparées par une profonde encoche angulaire, au fond de laquelle se trouve une paire de denticules petits mais nets.

La larve est plus grêle et plus effilée que celles des autres espèces de *Gonia* décrites dans ce travail.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Le segment I porte sur le dos un amas dense et noir, composé d'une dizaine de crochets forts, épais et très pigmentés ; sur le bord antérieur ventral, des crochets faibles existent ; sur le bord antérieur du segment II, une triple bande de crochets, les éléments antérieurs des régions dorsale et pleurales, à base allongée et étroite, les autres assez faibles ; sur le bord antérieur du segment III, une bande irrégulièrement double, composée d'éléments en général faibles et petits ; sur le segment IV, une bande semblable, dont les éléments sont tous très petits et faibles, à part un groupe de 2 ou 3 crochets pleuraux, plus forts que les autres, et à base étroite et allongée ; sur les segments V à X inclusivement, l'arrangement est le même, la ligne de crochets dorsaux étant toujours visible ; sur le bord antérieur du segment XI, une ligne dorsale de crochets très faibles et une ligne ventrale de 7 ou 8 éléments très grands, à base étroite et allongée.

Sur le premier segment, il existe comme chez les espèces déjà décrites, la bande de cuticule chitinisée qui part du bord externe de l'amas des crochets dorsaux et se termine en arrière près du bord antérieur du segment II.

Chambres feutrées cylindriques, allongées, presque trois fois aussi longues que larges (long. 0 mm., 0108, larg. 0 mm., 0036) (fig. 31).

Armature buccale (fig. 45) très allongée (long. 0 mm., 104), mais pas très large (dans le sens dorso-ventral), de la même forme générale que chez les autres *Gonia* ; mais la longueur des régions intermédiaire et postérieure ensemble, mesurées depuis l'extrémité antérieure du bord dorsal de la région intermédiaire, jusqu'à l'extrémité de l'aile dorsale basilaire, deux fois celle de la région antérieure ; l'aile dorsale basilaire environ deux fois aussi longue que l'aile inférieure, sa tige large, presque moitié aussi haute que la région antérieure à sa base ; l'expansion terminale de l'aile supérieure grande, triangulaire, presque trois fois aussi haute que la tige ; dent supérieure de la région antérieure très forte, seulement un peu moins allongée que la dent inférieure ; la dent supérieure convexe en dessus, droite en dessous, se terminant en une pointe peu aiguë ; la dent ventrale droite, en dessus et en dessous, très aiguë au bout ; entre les deux dents, une encoche angulaire profonde, au fond de laquelle se trouvent deux petites denticules accessoires de forme triangulaire, situées sur la base du bord interne de la dent inférieure ; plaques latérales et plaque de la glande salivaire comme chez les autres espèces du groupe.

Pseudogonia cinarescens Rond.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 08 × 0 mm., 056, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les épines ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large à la base.

Le bord antérieur de chacun des trois segments thoraciques porte une bande complète d'épines ; les crochets dorsaux du segment I les plus forts, à base étroite et un peu allongée ; les épines des deux segments suivants, assez faibles, sauf au milieu de la région ventrale, sur le segment II, où les crochets sont forts et courts ; ces deux bandes pour la plupart simples, celle du segment II irrégulièrement double ou triple dans la région ventrale ; sur le bord antérieur des segments IV à X inclusivement, une ligne ventrale de crochets courts et espacés, mais assez forts ; derrière ces éléments, sur chaque segment, une ligne de petits nodules accessoires ; sur les seg-

ments abdominaux le nombre de ces crochets varie entre 4 et 7, sauf pour l'avant-dernier qui en porte une douzaine ; le dernier segment du corps est sans crochets.

Chambres feutrées très petites (0 mm., 0072 $\times$ 0 mm., 0054, environ), un peu plus longues que larges, légèrement renflées au milieu.

Armature bucco-pharyngienne (fig. 57) relativement petite, ayant 0 mm., 052 de long ; dent médiane bien développée, son bord antérieur faisant avec l'axe longitudinal de la région antérieure un angle presque droit, environ deux fois et demie aussi longue que la largeur de la dent à sa base, aiguë à son extrémité ; dent accessoire dorsale petite mais nette ; région antérieure s'élargissant en arrière, trois fois aussi haute à son extrémité postérieure qu'à la base de la dent ; son bord supérieur trois fois aussi long que le bord antérieur de la dent ; région intermédiaire se rétrécissant derrière son extrémité antérieure, sa largeur dorso-ventrale vers le milieu environ la moitié de celle de l'extrémité postérieure de la région antérieure ; la distance de son extrémité antérieure sur le bord dorsal jusqu'au niveau de l'encoche intra-alaire, un peu plus grande que la longueur du bord supérieur de la région antérieure ; région basilaire bien développée, l'aile dorsale moins longue que la région intermédiaire, son bord inférieur légèrement courbé, son bord dorsal anguleux, par suite d'un élargissement de l'aile au niveau de son tiers postérieur ; aile ventrale moins allongée que l'aile dorsale, se fusionnant antérieurement avec la plaque de la glande salivaire, de façon à laisser entre cette dernière plaque et le bord inférieur de la région intermédiaire une encoche ou incision assez profonde qui se termine en arrière à angle aigu ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Cnephalia bisetosa B. B.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 250 $\times$ 0 mm., 190 environ ; larve : 0 mm., 370 $\times$ 0 mm., 160, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les épines ; organes sensoriels petits, organe antennaire moins long que large à la base.

Segment I avec une bande antérieure de crochets, la partie médiane dorsale de la bande comprenant une douzaine d'éléments forts, grands et épais, ne formant pas toutefois un amas dense et noir comme chez les *Gonia*, le reste de la bande composé de crochets beaucoup plus petits, mais forts et aigus, arrangés en une série simple sur les côtés du corps, se dédoublant irrégulièrement sur la face ventrale ; le segment II avec une bande antérieure irrégulièrement

double, les éléments ventraux forts et courts, comme ceux du milieu de la face dorsale, les éléments latéraux plus délicats, ceux de la région antérieure à base étroite et allongée ; segment III avec une double rangée antérieure de crochets bien plus délicats, ceux de la région ventrale quelquefois assez forts ou à base allongée, ceux des côtés plus faibles, ceux de la région dorsale pour la plupart courts, pâles et très petits ; segment IV avec une bande antérieure ventrale qui monte un peu sur les côtés, comprenant 8 grands crochets et une série accessoire d'éléments faibles et petits, les grands crochets se trouvant dans la partie médiane ventrale de la bande ; segment V avec une bande semblable, mais interrompue latéralement, de façon à isoler de chaque côté du corps un groupe de 4 épines très petites et très pâles ; sur les segments VI à IX inclusivement, on trouve un arrangement semblable, mais généralement le petit groupe de crochets pleuraux est absent ; les grands crochets sont en général au nombre de 7 ; le segment IX présente, cependant, en outre, sur son bord postérieur, une série de 10 grandes épines dirigées en avant, accompagnées de quelques éléments plus faibles ; en face de cette bande, sur le bord antérieur ventral du segment X, se trouve une rangée semblable de 6 ou 7 grands crochets, accompagnés par des éléments de petite taille, plus nombreux que dans la bande postérieure du segment IX ; le segment XI est nu (fig. V a).

Chambres feutrées courtes et petites, presque aussi larges que longues, se rétrécissent un peu en avant (long. 0 mm., 0072 ; larg. 0 mm., 0063, environ) (fig. 53).

Armature bucco-pharyngienne (fig. 54) bien développée (long., 0 mm., 072) ; dent antérieure faisant avec l'axe longitudinal de la région antérieure un angle presque droit, étroite et allongée, presque cinq fois aussi longue que large à la base (fig. 58), ses bords antérieurs et postérieurs droits ; dent supérieure bien différenciée, mais petite ; région antérieure moins de deux fois aussi longue, sur son bord dorsal, que le bord antérieur de la région médiane, élargie en arrière, sa hauteur à son extrémité postérieure presque trois fois aussi grande qu'à la base de la dent ; région intermédiaire peu rétrécie, presque aussi haute que la région antérieure à sa base ; la distance de l'extrémité antérieure de son bord dorsal à l'extrémité antérieure de l'encoche intra-alalaire, environ $\frac{5}{7}$ de la longueur du bord dorsal de la région antérieure ; aile basilaire dorsale (fig. IV a) un peu plus longue que la région intermédiaire, diminuant graduellement de hauteur jusqu'à son extrémité postérieure, qui est recourbée ventralement et se termine en une pointe arrondie ; aile ventrale un peu plus de moitié aussi longue que l'aile dorsale ; plaque de la glande salivaire soudée au bord inférieur de la région intermédiaire

sur toute la longueur de son bord externe, les deux sclérites séparés seulement par une ligne pâle ; le bord inférieur de la plaque salivaire sur la même ligne droite que le bord inférieur de l'aile basilaire ventrale ; plaques latérales antérieures de forme irrégulière.

Cnephalia multisetosa Rond.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 274 × 0 mm., 202, environ ; larve : 0 mm., 33 × 0 mm., 26, environ.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part

FIG. IV. — a, *Cnephalia bisetosa* B. B. b, *C. multisetosa* Rond.
Extrémité postérieure de la région basilaire de l'armature buccale.

les épines ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large à la base.

Le segment I avec une bande antérieure d'épines, simple sur les côtés, irrégulièrement double, dorsalement et ventralement, sa partie dorsale composée d'éléments bien plus grands que ceux des régions pleurales et ventrale, les crochets dorsaux toutefois moins grands que chez *C. bisetosa* ; segment II avec une bande antérieure irrégulièrement double, où les antérieurs sont pour la plupart à base étroite et allongée ; au milieu de la région ventrale, quelques crochets courts et forts, mais moins grands que chez *C. bisetosa* ; segment III avec une bande antérieure double, d'éléments tous assez faibles, ceux de la région dorsale moins forts que ceux de la région ventrale, la différence toutefois moins nette que chez *C. bisetosa* ; sur les segments IV à IX inclusivement, une bande ventrale antérieure, comprenant de 5 à 7 crochets assez grands, accompagnés par des élé-

ments plus petits, le groupe de grands crochets disposés à travers le milieu du bord antérieur, dans la région ventrale, les petits éléments arrangés derrière et en dehors de cette série, la différence de taille entre les deux sortes moins grande que chez *C. bisetosa*; en outre, de chaque côté du corps, sur tous ces segments, une série de plusieurs éléments très faibles et grêles, séparés de la bande ventrale par un espace pleural nu; cette série pleurale comprend, chez *C. multisetosa*, de 4 à 7 éléments; sur le bord postérieur du segment IX, 7 ou 8 crochets assez grands mais moins forts que chez *C. bisetosa* dirigés en avant; sur le bord antérieur du segment X, 4 ou 5 éléments assez grands, accompagnés par une série d'autres beaucoup plus petits; le segment XI sans crochets (fig. V b).

Chambres feutrées très petites, légèrement renflées au milieu,

FIG. V. — a, *Cnephalia bisetosa* B. B. b, *C. multisetosa* Rond.
Crochets ventraux des derniers segments de l'abdomen.

moins de deux fois aussi longues que larges (0 mm., 0072 $\times$ 0 mm., 0045, environ).

Armature buccale (fig. 47) un peu moins grande que chez *C. bisetosa* (long. 0 mm., 068), mais très semblable dans sa forme générale; chez *C. multisetosa*, la dent antérieure (fig. 44) fait avec l'axe de la région antérieure un angle moins aigu que chez *C. bisetosa* et l'aile dorsale supérieure (fig. IV b) est moins allongée comparée à l'aile ventrale inférieure; les deux figures dans le texte feront ressortir ces différences, qui sont peu apparentes, les deux espèces étant à ce stade assez difficile à séparer.

Rhacodineura antiqua Meig.

DIMENSIONS : Œuf : 0 mm., 13 $\times$ 0 mm., 10, environ; larve : 0 mm., 142 $\times$ 0 mm., 095, environ (larve entourée par la membrane vitelline).

Le matériel dont je dispose ne comprend que des larves non encore complètement développées ; des études plus approfondies sont donc nécessaires.

Peau transparente et incolore, sans accidents cuticulaires, à part les crochets ; organes sensoriels petits, l'organe antennaire moins long que large.

Sur le segment I, un groupe dorsal de 6 grands crochets, à base étroite et allongée (longueur, environ 0 mm., 0144), les autres crochets de ce segment, faibles, à part quelques éléments courts et forts sur la face ventrale ; sur le bord antérieur du segment II, une rangée de crochets assez faibles, souvent à base étroite et un peu allongée ; derrière le segment II, la forme des bandes d'épines est difficile à distinguer ; mais il paraît y avoir 8 ou 9 bandes complètes, composées chacune d'une seule rangée d'épines assez faibles, et situées sur le bord antérieur des segments.

Larve apneustique, ni stigmates, ni chambres feutrées visibles, chez les échantillons que j'ai examinés.

L'armature bucco-pharyngienne (fig. 50) est petite (long. 0 mm., 054) et diffère par sa forme de celle de toutes les autres espèces du groupe ; la dent antérieure ventrale est grande et très large, aussi large à la base que la longueur de son bord antérieur ; son extrémité est aiguë, son bord antérieur droit ; entre son bord postérieur et le bord inférieur du reste de la région antérieure, il n'existe pas d'angle net ; la dent accessoire dorsale est aiguë, quelquefois presque aussi longue que la dent inférieure, son bord inférieur faisant avec le bord supérieur de la dent ventrale un angle largement ouvert, mais assez net ; bord supérieur de la région antérieure, légèrement convexe, seulement un peu plus allongée que la distance du sommet de la dent accessoire dorsale, au sommet de la dent ventrale ; la hauteur de la région antérieure à sa base égale à environ la moitié de la distance entre les sommets des deux dents ; la distance entre l'extrémité antérieure du bord dorsal de la région intermédiaire et le bord antérieur de l'encoche intra-alaire, environ 1 fois et demie la longueur du bord dorsal de la région antérieure ; aile basilaire ventrale courte, effacée, aile dorsale allongée, droite, aiguë au bout, presque aussi longue que la région antérieure ; plaque de la glande salivaire peu visible ; plaques latérales antérieures de forme vaguement triangulaire.

La larve de cette espèce vit en parasite chez les forficules (*F. auricularia* L., *F. tomis* Kol.), où sa biologie a été étudiée par Rodzianko, Nielsen et Pantel ; on prétend aussi l'avoir élevée des chenilles de *Tæniocampa* et de *Lymantria* ; mais ces faits ont besoin d'être confirmés.

BIBLIOGRAPHIE

- BEZZI et STEIN. — *Kat. der Paläarktischen Dipteren*, III, 1907.
 NIELSEN (J.-C.). — *Saertryk of Vidensk. Meddel. fra Dansk naturh. Foren*, 64, 1912.
 — *Ibid.*, 66, 1915.
 PANTEL (J.). — *La Cellule*, XXVI, 1^{er} fas., 1910.
 — *Bull. Soc. Ent. France*, n° 8, 1916.
 STRICKLAND (E.-H.). — *Canadian Dept. of Agriculture, New Series, Bull.* 26, 1923.
 THOMPSON (W.-R.). — *C. R. Soc. Biol.*, LXXV, 1913, p. 559.
 — *Ibid.*, LXXVIII, 1915, p. 717.
 — *Bull. Soc. Ent. France*, n° 12, 1920.
 — *Bull. Biol. France-Belgique*, LVII, fas. 2, 1923 (a).
 — *Annales des Epiphyties*, IX, 1923 (b).
 TOWNSEND (C.-H.-T.). — *U. S. D. A., Bur. Ent. Tech. Ser.* n° 12, Pt. VI, 1908.
 — *Ann. Ent. Soc. America*, IV, n° 2, 1911.

EXPLICATION DES PLANCHES (1)

Planche XXII

- FIG. 1. — *Sturmia scutellata*, R.-D. Armature buccopharyngienne de la larve primaire, vue de côté : a. i. aile inférieure de la pièce basilaire ; a. s. aile supérieure de la pièce basilaire ; d. a. dent dorsale accessoire ; d. m. dent ventrale ou médiane ; p. c. place du canal salivaire ; p. l. plaque latérale antérieure ; r. a. région antérieure ; r. i. région intermédiaire.
 FIG. 2. — *Sturmia bella* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 3. — *Masicera sylvatica* Fall. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.
 FIG. 4. — *Pexopsis aprica* Meig. Œuf, vu de côté.
 FIG. 5. — *Sturmia bella* Meig. Deux dernières rangées des crochets ventraux, et chambres feutrées des stigmates postérieurs.
 FIG. 6. — *Erycia ferruginea* Meig. Œuf, vu par la face dorsale.
 FIG. 7. — *Exorista fimbriata* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 8. — *Erycia ferruginea* Meig. Sculpture du chorion de l'œuf, dans les régions latérales.
 FIG. 9. — *Exorista Westermanni* Zett. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 10. — *Zenillia pexops* B. B. Chambre feutrée et stigmate postérieur.
 FIG. 11. — *Erycia ferruginea* Meig. Sculpture du chorion de l'œuf, dans les régions centrales.
 FIG. 12. — *Exorista Westermanni* Zett. Chambres feutrées et stigmates de la larve primaire.
 FIG. 13. — *Zenillia pexops* B. B. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 14. — *Phryno vetula* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 15. — *Exorista Westermanni* Zett. Peigne infra-buccale de la larve primaire.

(1) Les divisions des échelles qui accompagnent les figures sont toujours égales à 0^{mm},01.

Planche XXIII

- FIG. 16. — *Ceromasia rutila* Meig. Armature buccale de la larve primaire.
 FIG. 17. — *Exorista fimbriata* Meig. Deux dernières rangées de crochets ventraux de l'abdomen.
 FIG. 18. — *Phryno vetula* Meig. Deux dernières rangées de crochets ventraux de l'abdomen.
 FIG. 19. — *Exorista Wesermanni* Zett. Deux dernières rangées de crochets ventraux de l'abdomen.
 FIG. 20. — *Prosopæa instabilis* Rond. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la larve primaire.
 FIG. 21. — *Phryno vetula* Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.
 FIG. 22. — *Zenillia pullata* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 23. — *Prosopæa instabilis* Rond. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 24. — *Frontina lacta* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 25. — *Masicera sylvatica* Fall. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 26. — *Ceromasia rutila* Meig. A gauche, chambre feutrée et stigmate postérieur ; à droite, les crochets d'une bande ventrale abdominale.
 FIG. 27. — *Pales pavidus* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 28. — *Zenillia pexops* B. B. Les trois dernières bandes de crochets abdominaux, vues de côté.

Planche XXIV

- FIG. 29. — *Monochæta albicans* Fall. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 30. — *Hebia flavipes* R.-D. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 31. — *Gonia ornata* Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la larve primaire.
 FIG. 32. — *Gonia cilipeda* Rond. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 33. — *Gonia cilipeda* Rond. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la larve primaire.
 FIG. 34. — *Gonia capitata* Deg. Extrémité antérieure de la larve primaire : à droite le groupe des crochets dorsaux (c. d.) du premier segment, avec le ruban chitineux latéral (r. l.).
 FIG. 35. — *Frontina læta* Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la larve primaire.
 FIG. 36. — *Gonia capitata* Deg. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 37. — *Zenillia pullata* Meig. Les deux dernières rangées des crochets ventraux abdominaux.
 FIG. 38. — *Gonia capitata* Deg. Chambres feutrées et stigmates postérieurs de la larve primaire.
 FIG. 39. — *Histocheila marmorata* Fabr. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.
 FIG. 40. — *Pales pavidus* Meig. Bande ventrale de crochets abdominaux.
 FIG. 41. — *Gonia divisa* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.

FIG. 42. — *Brachychæta spinigera* Rond. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.

FIG. 43. — *Hebia flavipes* R.-D. Chambre feutrée et stigmate postérieur de la larve primaire.

Planche XXV

FIG. 44. — *Cnephalia multisetosa* Rond. Extrémité antérieure de l'armature buccopharyngienne.

FIG. 45. — *Gonia ornata* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.

FIG. 46. — *Zenillia pullata* Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.

FIG. 47. — *Cnephalia multisetosa* Rond. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.

FIG. 48. — *Gonia divisa* Meig. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.

FIG. 49. — *Frontina læta* Meig. Crochets d'une bande ventrale abdominale.

FIG. 50. — *Rhacodineura antiqua* Meig. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.

FIG. 51. — *Hebia flavipes* R.-D. Les trois dernières bandes de crochets abdominaux, vues de côté.

FIG. 52. — *Monochæta albicans* Fall. Bande de crochets abdominaux ; à droite, chambres feutrées et stigmates postérieurs.

FIG. 53. — *Cnephalia bisetosa* B. B. Chambres feutrées et stigmates postérieurs.

FIG. 54. — *Cnephalia bisetosa* B. B. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.

FIG. 55. — *Brachychæta spinigera* Rond. Bande ventrale de crochets abdominaux.

FIG. 56. — *Gonia cilipeda* Rond. Crochets ventraux des deux derniers segments de l'abdomen.

FIG. 57. — *Pseudogonia cinarescens* Rond. Armature buccopharyngienne de la larve primaire.

FIG. 58. — *Cnephalia bisetosa* B. B. Extrémité antérieure de l'armature buccopharyngienne.