

NOTES ET INFORMATIONS

Parasites des poules à Formose. — Dans le dernier numéro de ces *Annales*, à propos des cestodes de poules en Indochine, j'ai dit (II, p. 317, en note) que l'*Hymenolepis exigua* ne paraissait pas encore avoir été signalé à Formose. Après la publication de mon travail, le D^r Isobé m'a donné connaissance d'un mémoire de Sugimoto (1) qui le mentionne dans la province de Schinohiku (Formose). Comme ce mémoire, écrit en japonais, est difficile à se procurer, je crois intéressant de reproduire ici la liste des helminthes de poules trouvés par l'auteur dans cette région :

- Hymenolepis exigua* Yoshida.
- Davainea tetragona* (Molin).
- Davainea echinobothrida* (Mégnin).
- Philophthalmus gralli* Mathis et Léger.
- Echinostomum echinatum* (Zeder).
- Heterakis perspicillum* (Rud.).
- Heterakis vesicularis* Frölich.
- Filaria mansoni* Cobbold.
- Tropisurus gallineis* Sugimoto.
- Dispharagus nasutus* (Rud.).

Ch. JOYEUX.

Phlébotomes observés dans de nouvelles localités françaises. — Mon ami le docteur Lavier m'a remis à déterminer quelques phlébotomes qu'il a capturés au cours de l'été dernier à Dijon et à Banyuls-sur-Mer. Nous avons relevé les espèces suivantes :

Dijon (Côte-d'Or), début du mois d'août, dans sa chambre, une ♀ de *Phlebotomus perniciosus* Newstead. Lesne a déjà signalé la présence de Phlébotomes dans la Côte-d'Or (Capture du *Phlebotomus papatasi* Scop. en Bourgogne. (*Bull. Soc. Ent. France*, 1909, p. 333 et 1912, p. 410).

Banyuls-sur-Mer (Pyr. Orientales), fin août et début de septembre, nombreux phlébotomes capturés dans les locaux du laboratoire Arago, principalement dans les lieux d'aisance. Nous avons relevé deux espèces :

1° *Phlebotomus perniciosus* Newstead, 1 ♂, 3 ♀.

2° *Phlebotomus minutus* Rondani, nombreux exemplaires ♂ et ♀.

La capture de cette espèce est particulièrement intéressante ; *P. minutus* n'était connu de France que des environs de Marseille, où il avait été signalé par Pringault. (Les Phlébotomes dans la région marseillaise. *Bull. Soc. de pathol. exot.*, XIII, 1920, p. 809.)

F. LARROUSSE.

(1) SUGIMOTO (S.). — Parasites des poules dans la province de Schinchiku (Formose). *Taiwan-Nojiho*, avril 1923 (en japonais).

Phlébotomes de la région parisienne. — Cette année, j'ai capturé de nouveau à Bourg-la-Reine (Seine), localité située à 6 km. environ au sud de Paris, deux femelles de *Phlebotomus papatasi*, les 16 juillet et 11 août. Ces deux animaux ont été pris dans une maison, au moment où ils se disposaient à piquer, le premier le soir, vers 21 heures, le second le matin, vers 11 heures. Pendant ces deux mois de juillet et d'août, d'autres exemplaires ont été vus ou ont piqué, mais n'ont pas pu être saisis.

Je note donc la persistance de *P. papatasi* dans cette localité où je l'observe presque chaque année depuis 1914 (1), toujours au mois de juillet ou au commencement d'août. Le fait est d'autant plus intéressant que dans les autres localités de la région parisienne où des phlébotomes ont été signalés avec certitude, c'est toujours *P. perniciosus* qui a été capturé (localités du D^r Joyeux à Savignies près Beauvais, Oise, et du D^r Parrot à La Garenne, Seine) (2). Seul Legendre (3) dit avoir trouvé plus au nord, à Vignacourt, dans la Somme, le *P. papatasi*, mais la détermination de son insecte, faite sur un échantillon écrasé, est trop douteuse pour qu'on en puisse faire état.

Il reste donc que la localité de Bourg-la-Reine est en France la plus septentrionale où *P. papatasi* ait été rencontré avec certitude et se maintienne depuis une dizaine d'années.

La détermination de mes échantillons a été confirmée soit par le D^r Parrot, soit par le D^r Larrousse à qui j'adresse tous mes remerciements.

M. LANGERON.

(1) *Bull. Soc. de pathol. exot.*, IX, 1916, p. 573-576.

(2) *Bull. Soc. de pathol. exot.*, XVI, 1923, p. 16-17.

(3) *C. R. Soc. de biol.*, LXXIX, 1916, p. 25.