MUSPICEA BORRELI SAMBON 1925 ET CANCERS DES SOURIS

Par E. BRUMPT

Le très intéressant Nématode qui fait l'objet de ce travail a été découvert par A. Borrel, puis revu par Haaland (1905), à l'Institut Pasteur de Paris. En 1906, j'ai eu l'occasion de trouver quelques exemplaires de ce ver chez une souris cancéreuse du petit élevage que j'entretenais au Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris. Diverses recherches que j'avais entreprises à cette époque m'empêchèrent d'étudier ce parasite au point de vue systématique et biologique, comme me l'avait conseillé Borrel et comme j'en avais l'intention.

En 1911, Haaland a retrouvé le nématode de Borrel, en petit nombre d'ailleurs, une cinquantaine d'exemplaires en tout, chez 50 p. 100 des souris normales qu'il examinait à Londres et chez un certain nombre de souris cancéreuses. Tous les vers étudiés par lui étaient des femelles vivipares, pourvues d'un tube digestif aboutissant à un anus terminal. Ce même parasite est retrouvé deux fois, chez la souris, en Allemagne par Marsh et Wülker en 1916.

C'est en 1925 seulement que la « filaire » (1) de Borrel a été étudiée au point de vue zoologique par Sambon. Cet auteur, utilisant le matériel qui lui fut fourni par Borrel à Strasbourg, donne une description sommaire du ver d'après des préparations montées dans du baume du Canada et le nomme *Muspicea borreli*.

Sambon, n'ayant eu à sa disposition que des animaux montés et n'ayant pas étudié d'animaux vivants ou conservés, a commis un certain nombre d'erreurs. C'est ainsi qu'après Haaland (1911), il signale un tube digestif complet. D'après lui, la bouche serait simple ; l'œsophage serait suivi, selon toute apparence, d'un bulbe subsphérique ; l'intestin serait droit, à parois minces, d'un diamètre uniforme et l'anus s'ouvrirait entre les lobes de la queue. La larve elle-même aurait un œsophage avec un léger renflement bulbaire, un intestin droit et la bouche serait probablement pourvue de six papilles.

(1) On verra plus loin, au sujet de la place qui doit être fixée à ce ver dans la classification qu'il paraît impossible, dans l'état actuel de nos connaissances, de le faire entrer dans le sous ordre des filaires.

L'appareil génital de la femelle adulte a été bien vu par Sambon. Cet auteur pense cependant que le vagin, qu'il n'a pu voir que d'une façon incertaine, s'ouvre vers le milieu du corps. Comme le travail de Sambon est accompagné d'excellents dessins reproduisant les vers étudiés par lui, il est incontestable que sa description correspond à la « filaire » de Borrel.

Des nématodes que je rapporte sans hésitation à *Muspicea borreli* ont été rencontrées une fois à Lyon par Arloing et Josserand en 1927, chez la souris, dans une masse médiastinale et dans une glande salivaire où une femelle bourrée de larves, coupée transversalement en trois points différents, se voit nettement sur la figure donnée par ces auteurs.

Enfin, en 1929, Dobrovolskaia-Zavadskaia et Kobozieff ont recherché ce parasite chez 35 souris femelles cancéreuses et chez cinq mâles dont deux non cancéreux. Des *Muspicea* ont été rencontrés chez quatre femelles et chez un mâle ; l'une d'elles avait dix mois, l'âge des quatre autres souris variait entre 16 et 25 mois et demi.

RECHERCHES PERSONNELLES

Vers la fin de l'année 1929, j'ai eu l'occasion de retrouver des *Muspicea borreli* chez un certain nombre de souris, infectées expérimentalement par diverses espèces de *Schistosoma* (*S. bovis*, *S. hæmatobium* et *S. mansoni*). Comme, d'autre part, les souris cancéreuses sont très fréquentes dans mon élevage, j'ai cru intéressant de rechercher systématiquement ces vers chez toutes les souris autopsiées. Avec la collaboration de deux jeunes naturalistes, Mlle Vuillet et M. Desportes, j'ai pu arriver très rapidement à avoir un abondant matériel d'étude et à réunir dans mes collections des centaines d'exemplaires de tout âge, appartenant tous au sexe femelle, le seul qui existe d'ailleurs, puisque ce ver, comme je le démontrerai plus loin, est un hermaphrodite protandrique d'un type très particulier.

Technique employée. — Borrel a décrit (1928) une méthode qui lui permet de mettre les *Muspicea* en évidence dans la peau et les glandes mammaires des souris. Bien que cette méthode soit excellente, je ne l'ai pas employée faute de temps, et je me suis contenté d'enlever la peau, de la mettre dans l'eau physiologique avec le corps de la souris pour rechercher les vers du tissu sous-cutané qui se détachent facilement seuls et encore mieux si la face interne de la peau est grattée avec un scalpel. Au bout de quelques minutes, le corps de la souris est ouvert et les viscères sont lavés dans l'eau

physiologique où de nouvelles *Muspicea* peuvent être récoltées si la souris est bien parasitée. Mais ces recherches ne suffisent pas

FIG. 1. — Fragment de muscle d'une omoplate renfermant 96 vers à tous les stades de développement. Il y avait également dans ces muscles plusieurs douzaines de larves libres, généralement un peu plus grosses que celles de l'utérus ou que celles qui viennent d'être évacuées de cet organe, ce qui semble indiquer que ces larves, comme celles de *Trichinella*, subissent un certain développement dans le corps de leur premier hôte (Souris 360 XI, âgée de 7 mois 1/2).

pour évaluer leur fréquence car très souvent les vers se trouvent dans l'épaisseur des muscles (fig. 1), des glandes salivaires, des

glandes médiastinales ou de diverses masses adipeuses, en particulier dans celle qui se trouve entre les deux omoplates de la souris. La recherche systématique des *Muspicea* dans les divers muscles et organes du corps donne des résultats très importants :

Voici, à titre d'exemple, les chiffres de parasites observés chez la souris 136 bis XI, très infestée :

Souris 136 bis XI, mâle âgé de 8 mois au moment de la mort provoquée par une infestation par *S. bovis* datant de 189 jours :

Tissu cellulaire sous-cutané	136	<i>Muspicea</i> de tout âge.	
Cavité abdominale et surface des viscères. .	32	—	—
Muscles des omoplates	14	—	—
— intercostaux droits	4	—	—
— intercostaux gauches	0	—	—
— abdominaux gauches	0	—	—
— abdominaux droits	0	—	—
Poumons et cœur	0	—	—
Ganglions médiastinaux	3	—	—
Glandes salivaires	21	—	—
Ganglion cervical	2	—	—
Œsophage (paroi)	1	—	—
Autres parties du tube digestif	0	—	—
Tissu conjonctif vésical	1	—	—
Total des vers récoltés	214	—	—

Tous les exemplaires récoltés étaient des femelles. Comme diverses parties de la peau et des muscles ont été fixées pour obtenir des coupes, on peut admettre que cet animal, pesant 19 gr. 95, renfermait au moins 400 *Muspicea* et un nombre considérable de larves à divers stades de développement dans son corps.

Souris 360 XI, mâle âgé de 7 mois 1/2 au moment de la mort provoquée par une infestation intense à *S. mansoni* datant de 101 jours. Poids total : 15 gr. 030.

Tissu cellulaire sous-cutané	133	<i>Muspicea</i> de tout âge.	
Cavité abdominale et pleurale	56	—	—
Muscles des omoplates	96 (fig. 1)	—	—
— intercostaux	2	—	—
— abdominaux	15	—	—
— fessiers	12	—	—
— —	0	—	—
— des joues	0	—	—
Langue	0	—	—

Muscles de la queue	0	<i>Muspicea</i> de tout âge.	
Diaphragme	4	—	—
Poumons	0	—	—
Œsophage, estomac, intestin, palais	0	—	—
Mésentère	8	—	—
Tissu conjonctif rénal	5	—	—
Vessie	0	—	—
Organes génitaux	0	—	—
Foie (dilacéré)	1	—	—
Total des vers récoltés	332	—	—

Ici, comme dans tous les autres cas étudiés, les vers récoltés étaient tous des femelles à divers stades de développement. Au chiffre de 332, il faudrait ajouter celui des nombreux vers restés dans les pièces fixées et dans celles non examinées.

Description de la femelle adulte renfermant des embryons mûrs.

— Les *Muspicea*, comme il est facile de s'en rendre compte sur les figures 2, 3 et 4, illustrant ce travail, sont des vers de petite taille, mesurant, une fois arrivés à leur complet développement, quand leur utérus est rempli de larves et avant que l'évacuation de ces dernières n'ait commencé, les longueurs suivantes, exprimées en millimètres (1), pour douze exemplaires pris au hasard : 4,44 ; 4,21 ; 4,10 ; 4,1 ; 4 ; 3,93 ; 3,885 ; 3,77 ; 3,66 ; 3,66 ; 3,55 ; 3,55. Au niveau de sa plus grande largeur, c'est-à-dire dans le cinquième antérieur, le corps présente un diamètre de 220 à 240 μ .

Les vers les plus petits observés chez les souris mesuraient $520 \mu \times 25 \mu$; à ce stade, on ne rencontre que des spermatozoïdes dans la partie utérine de leurs organes génitaux. Les vers renfermant des œufs dans leur utérus mesurent de 2,15 à 3,25 millimètres ; quand les larves éclosent, le ver grandit encore et atteint les dimensions données ci-dessus.

Le corps, relativement épais, s'amincit graduellement de l'extrémité antérieure à l'extrémité postérieure terminée par deux lobes latéraux. La partie antérieure lisse ne porte pas d'orifice buccal. La partie postérieure présentant deux lobes latéraux est dépourvue d'orifice anal. Le corps de l'animal est blanc, nacré, transparent ; les œufs et surtout les embryons sont brillants à la lumière réflé-

(1) Les *Muspicea* ne se déformant pas dans l'eau physiologique, dans laquelle elles meurent d'ailleurs assez rapidement il est inutile de les tuer avec de l'eau chaude pour avoir des sujets comparables, entre eux au moment de la prise des mensurations.

FIG. 2. — *Muspicea borreli* adulte, mesurant 4 millimètres, dont l'utérus est rempli de larves. Remarquer la forme caractéristique du ver dont le diamètre s'atténue assez régulièrement d'avant en arrière.

chie. La cuticule (1), incolore, épaisse sauf au niveau du pôle antérieur, est assez résistante ; elle présente des stries transversales très accentuées, allant en s'élargissant depuis le pôle antérieur, où leurs intervalles mesurent $1 \mu 675$, jusqu'au point de jonction du premier tiers avec le second tiers du corps, où elles mesurent $6 \mu 66$. A partir de ce point jusqu'à l'extrémité du corps, les intervalles des stries restent constants et mesurent $8 \mu 32$. Les cercles cuticulaires placés entre deux stries sont saillants et sont un peu plus étroits que ces dernières.

Sur une surface s'étendant tout autour de la tête sur une longueur de 30μ , en arrière du pôle lisse antérieur, on observe une cinquantaine de petits tubercules ayant 1μ de diamètre.

Les téguments de ces vers ne sont pas agglutinants comme ceux de certains nématodes et un simple lavage dans l'eau physiologique suffit pour les débarrasser des corps étrangers avec lesquels ils sont en contact.

L'assise sous-cuticulaire ou hypoderme est peu visible chez les vers adultes dont l'utérus, distendu par les embryons mûrs, vient s'accoler à l'étui musculo-cutané ; par

(1) Comme chez la plupart des nématodes la cuticule est composée de plusieurs assises qu'il est facile de mettre en évidence après macération du ver dans l'acide acétique en solution à 1 p. 100, pendant une demi-heure environ.

contre, chez les animaux plus jeunes, cette couche, constituée par une masse protoplasmique parsemée de noyaux clairs renfermant un nucléole unique et volumineux, est facile à voir au niveau des lignes latérales et parfois au niveau des lignes médianes. Malgré l'utilisation des colorations vitales au bleu de méthylène, au bleu azur, etc..., il m'a été impossible de mettre en évidence les limites cellulaires signalées chez d'autres nématodes par divers auteurs (Retzius, 1906 ; Rauther, 1907), cités par Seurat (1920).

FIG. 3. — Exemple adulte de 4 millimètres chez lequel on aperçoit nettement la glande ventrale (*gl. v.*) et le cordon cellulaire (*c. c.*) probablement homologue de l'intestin moyen des mermithidés.

Bien que les *Muspicea* présentent des mouvements et contractent ou étendent leur corps, je n'ai pu distinguer nettement leur appareil musculaire que sur des coupes (fig. 4, pl. XII). Cependant, des noyaux de 20 μ , plus volumineux que ceux des champs latéraux et pourvus d'un caryosome également très gros (6 μ), faciles à voir de profil, sur la paroi du corps à des intervalles de 350 à 400 μ appartiennent certainement aux cellules musculaires.

L'enveloppe musculo-cutanée des *Muspicea* est interrompue par deux bandes latérales relativement larges (fig. 3, pl. XI), naissant au pôle antérieur et se terminant dans les lobes de la queue. Ces champs latéraux, terminés en pointe à leurs deux extrémités, sont

constitués par une masse protoplasmique parfois vacuolaire, renfermant de gros noyaux de 12 à 15 μ , à gros nucléoles de 3 à 4 μ , placés les uns derrière les autres.

Les lignes dorso-ventrales, bien que plus grêles que les champs latéraux, se voient parfois assez bien à frais après usage de l'azur II; elles se voient surtout très bien sur les coupes de certains exem-

FIG. 4. — Ver adulte de 3 mm. 5, trouvé dans le tissu sous-cutané, presque entièrement vidé de ses embryons qui ont gagné le tissu conjonctif. Pendant que cet exemplaire était dessiné, comme on le voit sur cette figure et comme je l'ai observé différentes fois sur d'autres animaux adultes, et sans que la lamelle couvre-objet ait exercé sur lui une pression particulièrement considérable, des embryons ont été évacués par la partie antérieure du corps. Cette région pourvue d'une cuticule très mince, se rompt sous l'influence de la pression que l'utérus bourré de larves exerce sur elle.

plaires colorés à l'hématoxyline phosphotungstique (fig. 4, pl. XII).

La cavité générale du ver renferme, en plus des organes génitaux et du cordon cellulaire, dont je parlerai plus loin et que je considère comme l'homologue de l'intestin moyen des mermithidés, deux volumineuses cellules, situées dans la partie postérieure du corps, souvent cachées par l'extrémité de l'ovaire postérieur et le cordon cellulaire. Ces cellules s'observent facilement chez quelques individus, en particulier chez ceux qui ont vidé leur contenu uté-

rin. Elles sont vacuolaires, situées à $350\ \mu$ de l'extrémité caudale chez un exemplaire de $1.750\ \mu$; elles sont sphériques ou ovalaires, et mesurent de 35 à $50\ \mu$; leur noyau a un diamètre de 7 à $9\ \mu$. Je les considère comme des cellules phagocytaires bien que je n'aie pu les étudier expérimentalement.

Malgré le matériel abondant, frais ou conservé, que j'ai eu à ma disposition, il m'a été impossible de mettre en évidence l'appareil excréteur chez les animaux adultes. Chez les larves, cependant, j'ai observé (fig. 7, p. 320) un canal réfringent cuticulaire, dont on peut voir la mue en *mc*, dont le trajet est rapidement caché par les cellules somatiques et qui semble devoir être rapporté à l'appareil excréteur, à moins qu'il ne s'agisse d'un œsophage rudimentaire, ce qui est peu probable.

Il existe, chez tous les exemplaires, deux volumineuses glandes (*gl. v.*, fig. 5), situées sur la face ventrale, encore très visibles chez les vers ayant évacué leurs embryons. Ces glandes ne semblent pas aboutir à un orifice excréteur cutané. Leur extrémité antérieure effilée se perd, au niveau de l'anneau nerveux, dans la masse hypodermique constituant la ligne médiane ventrale ; leur partie postérieure, arrondie, est parfois en contact, peut-être même en continuité protoplasmique, avec quelques autres cellules ayant également un protoplasme finement granuleux. Ces deux glandes mesurent environ $100\ \mu$ de long sur 30 à $40\ \mu$ de large ; leur noyau sphérique présente un diamètre d'environ $15\ \mu$.

Ces glandes peuvent être comparées aux appareils excréteurs unicellulaires, encore appelés glandes cervicales, signalés chez divers nématodes (*Rhabdias bufonis* ; spiruridés adultes et larvaires, etc.) ou encore aux glandes œsophagiennes de divers anguillulidés comme celles des *Aphelencus*. Mais comme, d'une part, elles ne semblent pas aboutir à un pore excréteur cutané et comme, d'autre part, les *Muspicea* ne possèdent pas d'œsophage, il est actuellement impossible de les rapporter avec certitude aux uns ou aux autres.

Le système nerveux est toujours difficile à voir malgré la grande transparence et la petite taille des animaux étudiés. Il semble constitué par une masse ganglionnaire ventrale, située à $250\ \mu$ environ du pôle antérieur chez les animaux adultes, composée d'un certain nombre de cellules et envoyant une commissure dorsale et quelques filets nerveux antérieurs et postérieurs rarement visibles.

Tube digestif (?). — Contrairement à ce qui a été écrit par Haaland (1911) et par Sambon (1925), ce ver ne présente ni bouche, ni œsophage, ni anus. Les embryons de 300 et $400\ \mu$, et les plus petits exemplaires atteignant $520\ \mu$, $575\ \mu$ et $720\ \mu$ étudiés étaient dépourvus de ces organes.

L'extrémité antérieure du ver (fig. 5) est recouverte d'une cuticule amincie, lisse, dépourvue de structure, sur laquelle il n'existe

FIG. 5. — Extrémité antérieure du ver de 2 mm. 6 représenté en entier dans la fig. 8. Remarquer l'extrême minceur de la partie antérieure du ver, sur laquelle s'insèrent les deux lignes médianes *lv* et *ld* et les deux champs latéraux *Clg* et *Cld*; *l*, ligament faisant suite au cordon cellulaire plein se perdant sous le système nerveux *sn*; *gl.v.*, glande ventrale; *ovs*, ovaire supérieur. L'animal est vu de trois quart.

pas d'orifice, ainsi qu'il résulte d'études faites sur des animaux vivants examinés dans l'eau physiologique, l'eau distillée et dans des solutions colorantes diverses (bleu azur II, bleu de méthylène, rouge neutre, etc.).

D'ailleurs, s'il y avait une bouche, elle serait revêtue d'une cuticule réfringente, faisant suite à celle du corps et se prolongeant dans l'œsophage où elle serait facile à voir comme chez tous les nématodes de petite taille qui en sont pourvus. Toutefois, on voit s'insérer sur la couche profonde du pôle antérieur un faisceau protoplasmique, renfermant des noyaux assez rares, qui se rétrécit un peu après sa naissance puis s'élargit légèrement en arrière ; c'est le champ médian ventral. Il s'étend sur la ligne médiane ventrale jusqu'au niveau des deux grandes cellules (*gl. v*, fig. 5), situées derrière l'anneau nerveux. C'est certainement cette ligne médiane protoplasmique qui a été prise pour l'œsophage par Sambon qui, n'ayant eu à sa disposition que des vers conservés dans le baume du Canada, n'a pu étudier ni la structure fine de cette masse hypodermique, ni ses connexions.

On voit partir de cette ligne médiane, au-dessous du ganglion nerveux, un fin cordon renfermant quelques granulations réfringentes (*l*, fig. 5). Ce cordon se renfle bientôt et devient une masse constituée par de grandes cellules accolées bout à bout, présentant de nombreuses granulations réfringentes masquant parfois leur noyau (*c c*, fig. 3, 4, 6, 8, 10). Ce cordon est sinueux à son origine comme s'il avait pris cette forme après avoir abandonné la paroi antérieure ; il est également sinueux à sa partie postérieure, terminée en cul-de-sac, peut-être pour des raisons identiques ; pendant tout le reste de son trajet, il est plus ou moins rectiligne et il croise parfois obliquement l'utérus. Ce cordon cellulaire peut être comparé au tube digestif atrophié, transformé en corps adipeux, des mermithidés. Si cette formation est autre chose qu'une ébauche de tube digestif, je ne vois pas du tout à quel autre organe des nématodes elle peut être comparée.

Un fait certain c'est que, malgré l'absence de tube digestif fonctionnel, les vers s'accrois-

Fig. 6. — Exemple de 3 millimètres rempli d'œufs en voie de segmentation. On voit nettement à gauche du ver le cordon cellulaire plein déjà signalé dans les précédentes figures.

sent normalement, peuvent atteindre une taille de 4 millimètres et être bourrés d'embryons. La cuticule de ce nématode doit donc être perméable, comme celle des acanthocéphales qui sont dépourvus de tube digestif à tous les stades de leur existence ou comme celle de certains mermithidés, tels qu'*Allantonema mirabile*, parasite dans la cavité générale d'*Hylobius pini*, dont la femelle adulte est dépourvue d'intestin.

Développement des organes génitaux. — En dépit de l'examen de nombreuses *Muspicea*, il m'a été impossible de constater d'au-

FIG. 7. — Extrémités supérieures de quatre embryons évacués par une femelle adulte. Remarquer la mue (M) qui entoure l'animal et le canal réfringent (C) qui se trouve à la partie antérieure du corps. Il s'agit bien d'une mue striée et non d'une enveloppe ovulaire ainsi que la présence de la mue canaliculaire (m. c.) permet de l'affirmer.

tres mues que celle présentée par la larve mûre venant de quitter l'utérus (fig. 7). Il est cependant bien probable que ce nématode, comme la plupart des espèces parasites et comme presque toutes les espèces libres étudiées, présente quatre mues comme E. Maupas (1899, 1900) l'a démontré au cours de ses nombreuses et mémorables recherches. Si les trois dernières mues n'ont pu être étudiées dans le cas de ce parasite, cela tient très probablement à la rapidité avec laquelle elles s'accomplissent dans les tissus où elles doivent être difficiles à distinguer des éléments conjonctifs parmi lesquels elles sont probablement englobées. C'est pourquoi, dans

l'impossibilité de décrire l'aspect de l'appareil génital après chaque mue, comme cela se fait généralement, je me contenterai de signaler ce que j'ai pu constater.

Chez l'embryon, il est facile de voir, après coloration à l'azur II ou même à frais, dans la partie médiane et centrale du corps, une masse qui peut être considérée comme l'ébauche des organes génitaux.

Chez une larve de $575 \mu \times 27 \mu$, cette masse centrale se distingue

FIG. 8. — Ver de 2 mm. 6 chez lequel l'utérus, encore rempli de spermatozoïdes, ne renferme aucun œuf. Les ovaires (*ov. s* et *ov. i*) sont bien développés et sur le point d'éliminer leurs produits dans l'utérus (*ut*) remplissant encore les fonctions de réceptacle séminal. *Cl*, un champ latéral.

assez facilement, car le corps est plus transparent que celui de l'embryon ; elle mesure 110μ et est déjà encadrée par les lignes latérales. Chez un exemplaire de $720 \mu \times 32 \mu$, cette ébauche mesurait 210μ .

Chez une larve un peu plus âgée, ayant $742 \mu \times 35 \mu$, on voit que le contenu de cette masse médiane s'est dissocié et a donné naissance à des éléments que nous considérons comme des spermatozoïdes. Ils sont contenus dans un sac hyalin, le futur utérus, présentant deux masses cellulaires situées à chaque extrémité, masses qui grossissent lentement dans les stades suivants et donneront l'ovaire supérieur et l'ovaire inférieur (fig. 8, 9 et 10).

Quand la larve atteint 1 mm. 1 (fig. 10) ou 1 mm. 7 (fig. 9), on peut voir facilement la structure des organes génitaux. Ces organes

sont constitués sur le type amphidelphe, avec cette particularité que dans le cas des *Muspicea* il n'existe pas de vulve et que l'utérus, bien que ses deux extrémités soient coiffées d'un ovaire en forme de cône plus ou moins allongé, semble fonctionner d'abord comme testicule puis comme réceptacle séminal. La paroi de l'utérus présente des noyaux cellulaires volumineux, faisant saillie dans sa cavité. Il n'existe pas d'oviducte distinct ; les œufs sortent de l'ovaire et tombent directement dans l'utérus où ils rencontrent les spermatozoïdes.

L'ovaire est pourvu d'un rachis, visible parfois à frais chez les animaux écrasés et plus facilement après action de l'acide acétique.

Les spermatozoïdes de $1\ \mu\ 5$ de diamètre environ, sphériques quand ils sont morts, présentent un gros noyau sphérique excentrique accolé à un pôle et ayant un peu plus de $1\ \mu$. Pendant leur vie, ils sont agités de mouvements browniens et présentent le plus souvent un prolongement de 5 ou 6 μ , plus rarement deux. Ces pseudopodes (?) disparaissent quand les spermatozoïdes sont tués, par l'azur II par exemple. Le nombre des spermatozoïdes est peu élevé et assez difficile à déterminer. Cependant, dans certains cas favorables, quand l'utérus est bien visible, j'ai pu en compter 250 chez un ver de 1 mm. 545 et parfois jusqu'à 350. Les spermatozoïdes sont plus denses que le liquide utérin et, pour les voir, il faut faire des coupes optiques au niveau de la zone la plus profonde de l'utérus. Ils sont surtout nombreux aux deux extrémités de cet organe, au point où les ovules sortiront, attirés probablement vers ces points par un chimiotactisme spécial.

La descente des œufs dans l'utérus se fait quand les *Muspicea* présentent une longueur d'environ 2 mm. Les ovules sont probablement tous fécondés, car il est exceptionnel de rencontrer des œufs en dégénérescence ; par contre, on observe dans l'utérus, à côté d'œufs évoluant normalement, des cellules nucléées mesurant de 5 à 8 μ de diamètre, représentant peut-être des ovocytes trop jeunes pour être fécondés.

Les œufs fécondés évoluent simultanément et assez rapidement, puisque, chez une souris de cinq ou six semaines, j'ai pu observer une *Muspicea* dont l'utérus renfermait des larves mûres. Il est à peu près impossible de compter le nombre de larves présentes dans un utérus, mais il est facile de compter les embryons avant leur éclosion. Je donne ci-dessous (entre parenthèses), le nombre d'embryons trouvés chez un certain nombre de femelles dont la longueur est indiquée en millimètres : 3,35 (276) ; 2,9 (206) ; 2,7 (183) ; 2,666 (177) ; 2,510 (172) ; 2,5 (175) ; 2,444 (231) ; 2,444 (213) ;

FIG. 9. — Ver de 1 mm. 7, montrant le développement des ovaires. *ov. s.*, ovaire supérieur ; *ov. i.*, ovaire inférieur ; *sp.*, spermatozoïdes ; *ut.*, utérus.

FIG. 10. — Ver de 1 mm. 1. On voit nettement chez cet exemplaire les cellules de la paroi utérine (*C ut*) ; *ov. s.*, ovaire supérieur ; *ov. i.*, ovaire inférieur ; *ut.*, utérus ; *sp.*, spermatozoïdes flottant dans le liquide utérin ; *c. ut.*, cellules de la paroi utérine ; *cc*, cordon cellulaire plein ; *cl*, champ latéral.

2,444 (157) ; 2,35 (152) ; 2,35 (156) ; 2,333 (200) ; 2,25 (148) ; 2,156 (160).

On obtient ainsi une moyenne de 186 embryons par ver pour les 14 exemplaires étudiés. Plus tard, quand les embryons se développent, l'utérus se distend de plus en plus : il s'allonge en arrière et surtout en avant ; il arrive ainsi en contact avec la partie antérieure du ver où la cuticule et la couche hypodermique sont extrêmement minces. A ce stade, les ovaires sont atrophiés et le parasite n'est plus qu'un sac rempli d'embryons, comme on peut le voir sur les figures 2, 3 et 4 et sur la figure 1 de la planche XI.

Hermaphrodisme des *Muspicea*. — Dans son très important mémoire sur l'histoire naturelle des nématodes de Berbérie, Seurat (1920) signale que les nématodes dichogamiques libres, étudiés par Maupas, sont protandriques et que leurs tubes génitaux commencent par produire des spermatozoïdes s'emmagasinant dans la partie profonde des utérus, puis des œufs qui se forment plus tard. D'après Maupas, ce mode d'hermaphrodisme n'assure pas d'une manière parfaite la conservation de l'espèce, car les spermatozoïdes étant moins abondants que les œufs, beaucoup de ces derniers ne sont pas fécondés et avortent.

Dans le cas des *Muspicea*, les conditions sont un peu différentes, puisque c'est la partie médiane, indépendante des futurs ovaires et qui deviendra plus tard l'utérus, qui semble produire les spermatozoïdes. D'autre part, comme ce ver, au lieu de pondre ses embryons au fur et à mesure de leur formation, les garde dans son utérus distendu à l'extrême, on peut affirmer que sa reproduction est assurée aussi parfaitement que possible.

Comme, chez les nématodes, le gonochorisme est la règle et l'hermaphrodisme bien vraisemblablement une adaptation secondaire, on peut se demander quel est le sexe qui est devenu hermaphrodite chez les *Muspicea*. Ces animaux ne présentant d'orifice génital à aucun stade de leur développement, le problème est plus difficile à résoudre que chez les Rhabditidés libres, étudiés par Maupas, qui présentaient nettement le type femelle. Il est donc nécessaire de se baser sur la structure des organes de l'animal bien développé (fig. 6 et 7) pour constater que ceux-ci sont du type amphidelphe et que, si la vulve existait, elle se trouverait au milieu du corps, en un point où ne se rencontre jamais l'orifice sexuel chez les mâles de nématodes. Il s'agit donc ici, comme cela est presque toujours le cas chez les nématodes, d'un hermaphrodisme apparu secondairement, sous des influences bien difficiles à découvrir, chez la forme femelle de l'espèce étudiée ici.

Fécondation. — Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à l'arrivée des ovules dans l'utérus et il est probable que ce phénomène doit se produire très vite, car tous les embryons d'un utérus sont à peu près au même stade de développement, ce qui indique une fécondation simultanée de tout le contenu utérin.

Autofécondation. — Si l'existence de l'autofécondation est parfois difficile à mettre en évidence chez les animaux, elle existe certainement dans certains groupes, chez de nombreux mollusques pulmonés (1) en particulier, où, bien que facultative dans certains cas, elle est suffisante pour assurer la perpétuité de l'espèce, et chez certains nématodes, comme Maupas l'a observé.

Dans le cas des *Muspicea*, l'autofécondation peut être affirmée d'une façon indiscutable, puisque ces animaux ne possèdent aucun orifice vulvaire.

Chez les Rhabditidés étudiés par Maupas, cet auteur avait pu observer tous les passages entre la fécondation croisée facultative et l'autofécondation. Chez le *Rhabditis viguieri*, par exemple, il existe, à côté de femelles hermaphrodites, des femelles pures au nombre de 10 à 20 p. 100 qui se laissent féconder sans difficulté par des mâles ayant conservé leur appétit sexuel. Chez *Rhabditis marionii* et *R. duthiersi*, en plus des femelles hermaphrodites vraies, il existe des femelles dissogoniques chez lesquelles un ovaire fonctionne suivant le mode hermaphrodite en donnant d'abord des spermatozoïdes, puis des ovules, tandis que l'autre ovaire fonctionne suivant le type dioïque en ne donnant que des ovules. Enfin, l'existence des mâles ataviques ayant perdu tout instinct sexuel chez certaines espèces, chez *Rhabditis caussaneli*, par exemple, où Maupas a pu trouver 14 mâles de ce type pour 10.000 femelles hermaphrodites, montre comment ont évolué ces formes et comment l'hermaphroditisme s'est substitué au gonochorisme.

Le nombre encore trop restreint de *Muspicea* étudiées par moi ne me permet pas d'affirmer qu'il ne se produit pas de temps à autre un mâle atavique, mais un fait certain, c'est qu'ici ce mâle ne pourrait en aucun cas modifier la descendance de cette espèce, puisque ces vers étant dépourvus de vulve, la fécondation croisée ne pourrait avoir lieu.

Habitat. Longévité. Répartition suivant les élevages. — Par la méthode d'investigation signalée plus haut (p. 310), j'ai pu établir

(1) Depuis la note préliminaire que j'ai publiée en 1928 sur l'autofécondation des pulmonés, note dans laquelle je donnais un bref historique de cette question, j'ai eu l'occasion de constater ce phénomène chez le *Planorbis boissyi*, hôte intermédiaire du *Schistosoma mansoni*.

que les *Muspicea* se rencontrent à peu près partout dans le corps de la souris ; quelques exemplaires ont même été vus dans la séreuse recouvrant l'intestin, la vessie, et dans le tissu conjonctif situé entre les reins. Aucun exemplaire n'a été rencontré dans les poumons, le cœur, le rein.

Pour pouvoir étudier toutes les formes jeunes et âgées trouvées chez les animaux, le mieux est de rassembler les produits de lavage de la peau, du corps et des viscères dans un verre à pied, de décanter et de choisir, avec un binoculaire, les animaux que l'on désire étudier et qu'il est facile de capturer avec une pipette. Si le temps manque, il suffit pour conserver les vers d'ajouter du formol à 5 p 100 pour avoir un matériel excellent, car ces animaux conservent leur forme dans ce liquide, restent très transparents et peuvent encore être très bien colorés par des solutions d'azur II.

Le nouveau mode d'organisation de mes élevages me rendra possible d'ici peu l'étude épidémiologique de l'infection des souris par les *Muspicea*. Mais, dès maintenant, je crois bon de signaler les grandes différences qui s'observent dans des élevages neufs identiques où les mêmes ectoparasites se rencontrent. On pourra également remarquer que les parasites sont beaucoup plus nombreux chez les animaux baignés fréquemment, dans le but de les infecter avec des schistosomes, que chez les animaux des élevages neufs jamais baignés. En étudiant plus loin le mode de transmission de ce ver, j'essaierai d'expliquer ces faits.

I. — *Elevages neufs* (1) :

Elevage A. — 10-12 (0) ; 10-12 (0).

— B. — 12 (0) ; 10 (0) ; 14 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 8 (0).

— C. — 12 (1) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 4 (0) ; 4 (0) ; 4 (0) ; 2 (0) ; 12 (0) ; 1 1/2 (0) ; 1 1/2 (0).

— D. — 8 (2) ; ? (0) ; 8 1/2 (0) ; 8 1/2 (0).

— E. — 1 1/2 (4) ; 1 1/2 (3) ; 2 (0) ; ? (0).

— F. — 8 (0) ; 8 (0) ; 2 (0).

— G. — 12 (0) ; 8 (19) ; 10 (0) ; 10 (0).

— H. — 12 (10) ; 12 (1) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 8-10 (0) ; 2 1/2 (0) ; 2 1/2 (0) ; 2 1/2 (1) ; 2 1/2 (0) ; 2 1/2 (0) ; 2 1/2 (0) ; 2 1/2 (1) ; 2 1/2 (0) ; 12 (0) ; 12 (0).

— I. — 5-6 (0) ; 10 (0) ; 9-10 (1) ; 11 (0).

(1) Les animaux dont l'âge en mois est en chiffres gras sont ceux qui présentaient des adénocarcinomes plus ou moins développés au moment de l'autopsie. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de *Muspicea* trouvées chez chacun de ces animaux.

- Elevage J. — 10 (10) ; ? (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ; 12 (0) ;
13 (1).
— K. — 8-10 (0) ; 8-10 (0) ; 8-10 (0) ; 2 (0) ; 10 (0) ;
12 (0) ; 13 (0) ; 13 (0).
— L. — 10 (2) ; 9-10 (0) ; 8-10 (0) ; 8-10 (0) ; 6 (1) ; 2 (0) ;
1 3/4 (0) ; 1 (0) ; 1 (0) ; ? (0) ; 10 (0) ; 10 (0).
— N. — 12-12 (0) ; 10-12 (0) ; ? (1) ; 12 (0) ; 6 (8).
— O. — 1 3/4 (0) ; 3 (0) ; 12 (0).
— Q. — 10-12 (0) ; 10 (0) ; 12 (0).

II. — *Elevages infestés* avec diverses espèces de schistosomes. Toutes les souris des cuves ci-dessous ont été baignées plusieurs jours de suite dans de l'eau renfermant des cercaires. Certaines d'entre elles ont été baignées isolément avec des cercaires provenant d'un seul mollusque, dans le but d'obtenir des infections à un seul sexe ; les autres ont été baignées ensemble et ont pu se contaminer sous l'influence directe ou indirecte du bain.

- Cuve 1. — *S. hæmatobium*. Infection par un seul mollusque, bain individuel ; 5 (+). Dissection incomplète, le corps ayant été donné à manger à des souris (exp. 665 XI et 680 XI) ; 5 (2) ; 5 (4) ; 5 (0) ; 5 (0) ; 5 (8) ; 5 (1) ; 5 (3) ; 5 (2) ; 5 (0) ; 5 (1) ; 5 (2).
— 2. — *S. bovis*. Infection par des cercaires de plusieurs mollusques ; animaux baignés en commun. 8 1/2 (9) ; 8 1/2 (6) ; 8 (214) ; 8 (2) ; 7 (68).
— 3. — *S. mansoni*. Infection par plusieurs mollusques ; baignés en commun. 8 1/2 (0) ; 8 1/2 (0) ; 6 (5).
— 4. — *S. mansoni*. Infection par plusieurs mollusques ; baignés en commun. 7 1/2 (327) ; 7 1/2 (20) ; 7 1/2 (1) ; 7 1/2 (3) ; 7 1/2 (25) ; 7 1/2 (7) ; 7 (118) ; 7 (44) ; 7 (19) ; 6 1/2 (31).
— 5. — *S. bovis*. Infection par plusieurs mollusques ; baignés en commun. 10 1/2 (10) ; 9 (0) ; 4 1/2 (62) ; 4 1/2 (12) ; 4 1/2 (55) ; 4 1/2 (22) ; 4 1/2 (a. n.) ; 4 1/2 (a. n.) ; 4 1/2 (—) ; 4 (a. n.). Ces quatre dernières souris n'ont pas été disséquées complètement car leur corps a été donné à manger à des souris neuves (exp. 665 XI et 680 XI) ; 4 (24) ; 3 1/2 (160) ; 3 1/2 (2) ; 3 1/2 (1) ; 3 1/2 (2) ; 3 1/2 (23) ; 3 1/2 (2) ; 3 (99) ; 3 (2) ; 3 (25) ; 3 (10) ; 2 (17).

(1) Le point d'interrogation indique que l'âge des souris est inconnu.

- Cuve 7. — *S. bovis*. Infection par un seul mollusque ; bain individuel. 4 (0) ; 4 (1) ; 4 1/2 (0) ; 4 1/2 (0) ; 4 1/2 (2) ; 5 1/2 (1) ; 5 (0) ; 6 (0).
- 8. — *S. mansoni* et *S. hæmatobium*. Bain en commun avec des cercaires de plusieurs mollusques. 4 1/2 (10) ; 4 1/2 (51) ; 4 1/2 (32) ; 4 (19).
- 9. — *S. mansoni*. Infection par des cercaires de plusieurs mollusques ; bains en commun. 3 1/2 (16).
- 10. — *S. mansoni*. Infection par des cercaires de plusieurs mollusques ; bain en commun. 3 1/2 (0) ; 3 1/2 (8) ; 3 1/2 (0) ; 2 1/2 (0).
- 11. — *S. hæmatobium*. Bain en commun dans de l'eau renfermant des cercaires de plusieurs mollusques. 5 (7) ; 5 (1).
- H. S. — *S. mansoni*. Cercaires de plusieurs mollusques. Bain collectif. 5 (10) ; 5 (9) ; 5 (1) ; 5 (44) ; 5 (10) ; 5 (32).
- H. S'. — *S. bovis*. Infection par un seul mollusque ; bain individuel. 4 1/2 (6) ; 4 1/2 (2) ; 4 1/2 (4).

La longévité de ces vers dans l'organisme est impossible à établir, car, ignorant le mode d'infestation des souris, il est impossible de les mettre à l'abri d'infestations nouvelles afin de déterminer l'âge des vers qu'elles hébergent. Tout ce que l'on peut dire c'est que les souris ne semblent pas s'immuniser rapidement. C'est ainsi que, chez la souris 360 XI, âgée de 7 mois 1/2 (fig. 1, p. 311), on pouvait observer des exemplaires très jeunes à côté d'exemplaires mûrs, ce qui prouve que la présence de ces derniers n'empêchait pas l'évolution des jeunes, et que Dobrovolskaia-Zavadskaia et Kobozieff (1929) ont trouvé des *Muspicea* chez des souris ayant 2 ans, 1 mois et deux semaines.

Evolution. Mode d'infestation des souris. — Les *Muspicea* adultes peuvent éliminer leurs larves ayant de 300-350 μ de longueur sur 21-23 μ de large, soit dans les muscles et le tissu conjonctif, comme cela a déjà été signalé par Borrel, puis par Haaland, soit à la surface de la peau comme je viens de le constater et comme les microphotographies des planches XII, XIII et XIV en donnent une exacte représentation. Ces larves ne se rencontrent jamais dans le sang. En présence de ces faits, de nombreuses hypothèses peuvent être émises pour expliquer les voies de sortie et les voies d'accès des parasites.

Les microphotographies 5, 6, 7, pl. XII ; 8, 9, 10, 11, pl. XIII ; 12 et 13, pl. XIV, permettent de suivre l'arrivée des *Muspicea* sous la peau

et l'évacuation des larves dans le milieu extérieur. Le rejet des larves se fait en somme comme dans le cas de la filaire de Médine et on peut se demander s'il n'existe pas un hôte intermédiaire, parasite de la souris, détriticoles ou coprophage, susceptible d'assurer son évolution. Je dirai de suite que cet hôte, s'il existe, n'a pas encore été rencontré, malgré l'examen de nombreux ectoparasites, puces et acariens et celui d'acariens détriticoles très communs dans tous les élevages.

On pouvait encore se demander si les embryons rejetés sur le sol n'étaient pas susceptibles d'évoluer et de donner soit des larves infectieuses, soit une génération sexuée comme on l'observe chez divers rhabdiasidés. Cette hypothèse est probablement à rejeter, car la longévité des *Muspicea* et de leurs larves est extrêmement faible, aussi bien dans le corps des animaux parasités où tous les parasites meurent en moins de 24 heures, que dans les milieux de culture, sur de la gélose nutritive par exemple.

D'ailleurs, en maintenant pendant un peu plus de deux mois un certain nombre de souris sauvages (exp. 561 XI et 708 XI), indemnes de *Muspicea* (1), dans des cuves, habitées pendant longtemps par des souris très parasitées par les *Muspicea* et renfermant de nombreuses puces adultes et larvaires et divers acariens, aucune d'elles n'a été infestée, ce qui démontre que le ver n'évolue pas dans ces conditions.

Il est d'ailleurs permis d'admettre, en se basant sur les expériences 665 et 680 XI, signalées ci-dessous, qu'il n'y a ni hôte intermédiaire ni évolution dans le milieu extérieur et que l'infection se fait par léchage de la peau, au point où les vers évacuent leurs larves, et ingestion de ces dernières, soit par la souris déjà parasitée, ce qui est probable, soit par une autre souris. Il y aurait en somme des migrations des larves comparables à celles observées dans le cas de la trichine, avec cette différence que les formes adultes se formeraient dans le tissu du corps dans le cas de *Muspicea*. La larve, rejetée à la surface de la peau, serait susceptible de poursuivre son évolution après certaines migrations dans le corps de la souris, comme les larves de *Strongyloides* et divers strongylidés qui, même ingérées, doivent passer à travers les muqueuses et atteindre les poumons et la trachée avant de se fixer et d'évoluer dans le tube digestif qui est leur habitat normal.

J'ai déjà dit plus haut que les larves de *Muspicea* étaient abondantes en certains points des tissus et parfois dans le tissu sous-

(1) Plus de trente exemplaires de souris sauvages capturés au Museum d'histoire naturelle ou à mon laboratoire se sont montrés négatifs.

cutané où elles se comportent comme celles des filaires du genre *Onchocerca* et d'où elles pourraient être extraites par un certain nombre d'ectoparasites suceurs de sang. Toutefois, si ce mode de sortie est possible, il reste à démontrer, car, jusqu'à ce jour, aucune larve jeune ou âgée n'a été vue chez un ectoparasite (1) des souris de mon élevage. Si les larves des tissus ne sont pas extraites des points où elles se trouvent, on peut admettre que, comme pour beaucoup de parasites, la ponte des femelles a été faite dans des conditions peu favorables à la conservation de l'espèce et que les larves se trouvent dans une impasse, tandis que celles qui sont déposées sur les téguments ont seules des chances d'évoluer. Cependant, comme les larves des tissus semblent y vivre dans de bonnes conditions et probablement longtemps sans que leur développement puisse se produire sur place et comme, d'autre part, les souris se dévorent parfois dans les élevages quand leur nombre est trop grand et leur nourriture insuffisante, on peut admettre que toutes les larves des *Muspicea*, qu'elles soient accumulées dans les tissus ou mises en liberté à la surface de la peau, peuvent avoir de grandes chances d'arriver dans le tube digestif de divers exemplaires de souris. L'ingestion des larves éliminées par la peau par la souris hôte expliquerait, par la possibilité de l'auto-infestation, l'intense parasitisme de certaines souris et l'ingestion de chair parasitée rendrait compte de la diffusion du parasitisme chez les individus neufs.

La fréquence et l'intensité de l'infection des souris baignées fréquemment s'expliqueraient par le ramollissement de la peau qui faciliterait l'arrivée des *Muspicea* et le rejet de leurs larves ainsi que par l'ingestion plus facile par les souris qui, pendant plus d'une heure après le bain et dans le but de se sécher, lèchent toute la surface accessible de leur corps.

N'ayant eu que des résultats négatifs par l'examen de plusieurs centaines de puces et d'acariens, j'ai essayé de vérifier l'hypothèse de l'infestation par la voie digestive en faisant ingérer de la chair de souris parasitées à des souris neuves provenant d'élevages où les *Muspicea* semblent absentes (2).

Voici les résultats obtenus dans deux expériences par ingestion de chair et de peau parasitées :

(1) Au laboratoire de Borrel à Strasbourg, Larrousse a disséqué plus de mille puces et divers ectoparasites sans aucun résultat (communication verbale).

(2) Il est très difficile d'affirmer que les *Muspicea* sont totalement absents dans un élevage d'une cuve déterminée. C'est ainsi que c'est parfois seulement à la 5^e ou à la 6^e souris autopsiée complètement que ce parasite peut être découvert mais alors toujours en très petit nombre, un ou deux exemplaires par exemple, chez des animaux de plusieurs mois ou d'un an.

Expérience 665 XI. — Huit jeunes souris (666-673 XI), âgées de 4-5 semaines, de la cuve d'élevage L où les *Muspicea* ont été vues seulement deux fois (un seul exemplaire dans un cas et deux dans l'autre, sur 11 souris autopsiées), sont mises dans un bocal avec les cadavres des souris 487 XI et 488 XI, le 22 mars 1930, à 15 heures.

La souris 666 meurt quatre heures plus tard. L'estomac plein de chair renferme deux *Muspicea* mortes avec des embryons immobiles. Aucun ver ni aucun embryon n'a pu être retrouvé dans les parois de l'estomac ni dans le produit de raclage de cet organe.

La souris 667 meurt le 23 mars, environ 20 heures après le repas. Aucun ver ni aucune larve n'ont pu être décelés dans l'estomac, le foie, les poudons, la peau, la cavité générale.

La souris 668 meurt 24 heures après le repas. Autopsiée immédiatement, les organes se montrent négatifs comme dans le cas précédent.

La souris 669 meurt un peu plus tard, sans que l'autopsie ait pu être pratiquée.

Les souris 670, 671, 672 et 673, sacrifiées le 68^e jour après le début de l'expérience, présentent, la première, un parasite, les deux suivantes aucun, et, la dernière, quinze *Muspicea*, dont deux jeunes sans œufs, quatre avec œufs, et neuf avec des embryons mûrs.

Cette expérience est peu concluante. Cependant, comme les souris n'ont pas été placées individuellement dans des bocaux avec de la chair de souris parasitée, il n'est pas permis d'affirmer que toutes aient ingéré des *Muspicea* adultes et aient eu ainsi l'occasion de s'infester.

Expérience 680 XI. — Quatre souris (690-693 XI), de 6-7 semaines, de l'élevage F, où trois souris témoins, âgées de 2, 8 et 8 mois, se sont montrées indemnes de *Muspicea*, sont placées dans un bocal, le 23 mars 1930, avec le cadavre frais de la souris 499 XI et le 30 mars avec celui de la souris 530 XI riche en *Muspicea*.

La souris 693 XI meurt le 2 avril, soit dix jours après le premier repas et trois jours après le second. L'autopsie ne révèle aucune *Muspicea*.

La souris 690, sacrifiée le 60^e jour après le premier repas, héberge 16 *Muspicea* dans les fragments de tissus examinés et certainement beaucoup d'autres dans ceux donnés à ingérer aux souris 917-926 XI (expérience 916 XI).

La souris 691, sacrifiée le 68^e jour après le premier repas, présente dans les tissus examinés 26 *Muspicea*.

La souris 692-XI, sacrifiée le 69^e jour, est négative.

Cette expérience est relativement concluante, car, tandis que les trois souris témoins du même élevage étaient négatives, deux souris sur trois, les seules ayant peut-être ingéré des *Muspicea*, étaient assez fortement parasitées.

De nouvelles expériences en cours, où les souris jeunes seront isolées avec de la chair parasitée, permettront de dire si, dans les

expériences signalées ci-dessus, les infections constatées sont bien dues à l'ingestion de larves de *Muspicea*, ce qui me semble probable.

Si mes expériences, encore trop peu nombreuses, peuvent être considérées comme démonstratives, elles donneront un commencement de confirmation à l'hypothèse de Borrel (1928), suivant laquelle les jeunes souris pourraient s'infester en tétant leur mère présentant des larves dans ses mamelles.

L'étude de souris très infestées spontanément permet de suivre une partie de l'évolution du parasite, évolution dont j'ai déjà parlé en ce qui concerne le développement des organes génitaux. Dans les tissus de l'hôte, on rencontre de très nombreuses larves identiques, ou à peu près, à celles rencontrées dans l'utérus, avec cette seule différence qu'au lieu de mesurer, comme ces dernières, de 300 à 350 μ sur 21-23 μ , on en observe quelques-uns ayant $370 \times 25 \mu$. Toutes ces larves présentent une enveloppe striée qui peut être considérée, non comme une enveloppe ovulaire, mais comme une véritable mue (fig. 7).

A côté de nombreuses larves dont la structure anatomique est très difficile à étudier, il existe de jeunes vers, ayant la même structure générale que les adultes, et montrant déjà, même chez les plus petits exemplaires, les champs latéraux. Chez la souris 360 XI, les vers les plus petits observés mesuraient $520 \times 25 \mu$ et $575 \times 27 \mu$, soit à peine 150-200 μ de plus que les larves vivant dans les tissus. S'il n'existe pas de développement hétérogonique et si les jeunes parasites observés proviennent directement des larves pondues par les vers, on doit admettre un bien faible accroissement chez l'hôte intermédiaire, s'il en existe un, ou au cours des migrations dans le corps de l'hôte définitif, si celui-ci s'infeste par ingestion de larves.

Affinités zoologiques. — Le nématode qui fait l'objet de cette étude diffère sensiblement de tous les genres connus, auxquels il est difficile de le comparer étant donné qu'il ne possède ni bouche ni lèvres.

La structure de l'enveloppe musculo-cutanée appartenant au type méromyaire, la forme des organes génitaux, l'hermaphroditisme protandrique, la viviparité, rapprochent les *Muspicea* des Rhabdiasidés dont ils s'écartent par la forme générale de leur corps, l'absence de vulve et de tube digestif complet.

Sa cuticule striée, sa structure méromyaire, son habitat chez un mammifère écartent ce ver de la famille des Mermithidés avec laquelle il présente cependant certaines affinités, en particulier en

ce qui concerne l'existence d'un tube digestif incomplet dans les deux cas.

Enfin, malgré l'absence d'anus et même de vulve, signalée parfois dans l'ordre des Filaires (*Philometra*, *Dracunculus*, *Aprocta*, etc.) et la fréquence de la viviparité ou de l'ovoviviparité chez ces animaux, dont la structure semble toujours appartenir au type polymyaire, je ne crois pas qu'il soit possible d'inclure les *Muspicea* dans cet important groupement de nématodes.

La morphologie et la biologie des *Muspicea* montrent des adaptations très curieuses au parasitisme, adaptations qui rendent leur classification aussi difficile que celle des parasites des insectes appartenant aux genres *Bradynema*, *Atractonema*, *Allantonema*, *Sphærularia*, *Aproctonema*, etc., placés tantôt parmi les Mermithidés, tantôt au voisinage des Rhabdiasidés. C'est la raison pour laquelle, en attendant la découverte d'autres types permettant d'établir les affinités réelles de ce parasite, je crois utile de créer pour lui une famille nouvelle dont je donne ci-dessous les caractères :

FAMILLE DES MUSPICÉIDÉS (*Muspiceidæ*)

Diagnose. — Eünématodes méromyaires, à cuticule relativement épaisse et striée, sans bouche ni anus ; tube digestif réduit à un cordon cellulaire plein ; hermaphrodites protandriques ; organes génitaux de type femelle constitués par deux ovaires opposés, réunis par un utérus cylindrique ; vulve absente ; vivipares ; embryons rejetés au dehors par la rupture du pôle antérieur de l'animal ; parasites du tissu conjonctif, de la cavité viscérale et de la peau.

Genre *Muspicea* Sambon, 1925 ; Brumpt *emendavit*, 1930. — Mêmes caractères que la famille.

Espèce type : *Muspicea borreli* Sambon, 1925 ; Brumpt *emendavit*, 1930.

Diagnose. — Femelle seule connue. Adulte avec embryons mesurant de 3,55 à 4,44 mm. de longueur et 220 à 240 μ de largeur. Corps relativement court et épais, légèrement aminci en arrière, où il se termine par une queue bilobée à lobes latéraux nettement striés ; cuticule épaisse, sauf au niveau du pôle antérieur présentant une cinquantaine de petites verrues de 1 μ de diamètre ; ni bouche, ni œsophage, ni rectum, ni anus ; intestin moyen (?), réduit à un cordon plein constitué par des cellules placées bout à bout ; une paire de glandes cervicales (?), volumineuses, de couleur orangée ; utérus fonctionnant d'abord comme une vésicule sémi-

nale, constituée par un tube cylindrique coiffé d'un ovaire à chacune de ses extrémités ; pas de vulve ; vivipares ; embryons mûrs pourvus d'une mue striée, mesurant 300-350 μ sur 21-23 μ , libérés par la rupture du pôle antérieur du corps. Parasites du tissu conjonctif et de la cavité viscérale de la souris blanche (*Mus musculus* var.).

Rôle pathogène. — Le plus souvent, les *Muspicea* et les embryons libres qui se déplacent dans les tissus de leur hôte ne produisent aucune action irritative locale. C'est seulement quand les vers adultes séjournent un certain temps dans le derme, avant de perforer l'épiderme pour évacuer leurs larves à la surface de ce dernier ou sous les croutelles qui le recouvrent (fig. 13, pl. XIV), qu'il se produit des réactions inflammatoires caractérisées par la présence de foyers cellulaires (fig. 15, pl. XIV), parfois de cellules géantes (fig. 14, pl. XIV), et surtout par un épaississement considérable du derme et de l'épiderme (fig. 6 et 7, pl. XII). Je n'ai rencontré aucune réaction semblable dans des coupes de muscles pris en diverses parties du corps des souris présentant des lésions cutanées, aux points où se rencontraient de nombreuses *Muspicea* adultes ou larvaires.

Cependant, dès 1906, le rôle pathogène de ce petit nématode a été affirmé par Borrel qui a soutenu son opinion dans de nombreuses publications dont la plus récente date de 1928. Dans ce dernier travail, Borrel signale la présence de ce ver dans des adéno-carcinomes ou dans leur voisinage chez sept souris cancéreuses. D'autre part, il a établi que, tandis que 80 p. 100 des souris cancéreuses hébergent ce parasite, on le rencontre seulement chez 20 p. 100 des souris saines. Ces constatations conduisent Borrel à se demander si la fréquence du cancer dans certains grands élevages de souris étudiés en Amérique, ne serait pas due plutôt au parasitisme par ces vers, porteurs de virus cancéreux, qu'à la transmission ou à la prédisposition héréditaire admise par Maud Slye en particulier.

Haaland (1911) a revu parfois la filaire de Borrel adulte et ses embryons dans le tissu conjonctif de souris cancéreuses âgées. Il a obtenu en tout une cinquantaine de vers femelles et il estime que ces parasites peuvent créer des foyers localisés ou diffus d'inflammation, mais il ne se prononce pas en ce qui concerne leur action cancérigène.

Les études entreprises sur les conseils de Regaud, au laboratoire L. Rosenthal de l'Institut du radium de Paris, par Mme Dobrovol'skaia-Zavadskaia et Koboziëff (1929) ne semblent pas favorables à l'hypothèse de Borrel, car ces auteurs ne retrouvent les *Muspicea* que chez 5 souris cancéreuses sur 38 examinées. D'autre

part, comme ces cinq animaux présentaient des tumeurs de type histologique différent : 3 adéno-carcinomes, 1 lymphadénome aleucémique et 1 sarcome fuso-cellulaire, ces auteurs estiment qu'en présence de ces faits ils se croient autorisés à dire que la filaire ne joue pas un rôle spécifique dans la production des cancers de leur élevage.

Au cours de mes recherches, j'ai eu l'occasion, comme cela a été écrit plus haut, d'étudier de très nombreuses *Muspicea* dans l'élevage que j'entretiens à mon laboratoire et il m'est permis d'affirmer que, dans certaines cuves, tous les animaux sont parasités à un certain degré. Or, dans cet élevage, j'ai observé, depuis le 13 octobre 1929, 31 adéno-carcinomes simples ou multiples, répartis de la façon suivante : élevage A, 6 cas ; élevage B, 6 cas ; élevage C, 5 cas ; élevage D, 3 cas ; élevage G, 3 cas ; élevage H, 5 cas ; élevage I, 3 cas ; élevage J, 5 cas ; élevage K, 3 cas ; élevage L, 6 cas ; élevage O, 1 cas ; élevage Q, 2 cas.

L'âge des souris cancéreuses de mon élevage n'a malheureusement pas toujours été noté d'une façon précise. Il m'est cependant permis de dire que ces 47 cas de cancer, tous rencontrés chez des femelles, ont été observés dans 6 cas (cuve A) sur des animaux ayant un an ou un peu plus d'un an et dans les 41 autres cas chez des femelles ayant de 8 à 12 mois (1). Or ces derniers cas ont été relevés dans un élevage d'environ 150 femelles âgées de 6 à 12 mois, ce qui donne le pourcentage très élevé de 27,3. Dans certaines cuves, d'ailleurs, comme dans l'élevage C constitué le 13 février 1930 de 9 femelles de huit à neuf mois, il s'est produit 5 cas de volumineux adénocarcinomes entre le 22 mars et le 31 mai, ce qui donne un pourcentage de 55,55 et dans la cuve B, renfermant 9 souris de 8 à 14 mois, 6 cas, soit un pourcentage de 66,6.

Il est vrai que le pourcentage de tumeurs murines observées est extrêmement variable suivant les souches de souris. C'est ainsi que L. Loeb (1921), qui a fait aux Etats-Unis des recherches étendues sur ce sujet, a pu classer les souris étudiées par lui en trois groupes, suivant leur aptitude à devenir cancéreuses. Cet auteur constitue trois catégories de souris suivant leur âge. La première renferme les souris ayant de 7 à 12 mois, la seconde celles de 13 à 17 mois et la troisième celles ayant plus de 18 mois.

Les tableaux donnés par L. Loeb sont d'une telle netteté que je crois utile d'en reproduire quelques extraits concernant les élevages où le nombre de souris était d'une importance suffisante pour donner le maximum de valeur aux faits publiés par cet auteur.

(1) Dans la cuve D deux souris sur 7, nées vers le 15 septembre 1929, présentaient chacune un volumineux adénocarcinome le 3 juin 1930, à l'âge de 8 mois et demi.

Voici quelques données statistiques des trois catégories de souris de L. Loeb réceptives aux cancers :

A. SOURIS PRÉSENTANT UN FORT POURCENTAGE DE TUMEURS

SOUCHE	NOMBRE DE SOURIS	INDICE CANCÉREUX	ÂGE DES SOURIS		
			7-12 mois	13-17 mois	18 mois et au delà
Total 8 1/2 + 328....	566	56.4	27.0 (34.0)	44.0 (56.0)	29.0 (38.0)
(8 1/2 + 328 B).....	226	56.0	25.4 (32.0)	41.0 (52.5)	33.6 (42.0)
(English Salle A)....	252	70.0	28.0 (46.0)	34.0 (54.5)	38.0 (62.0)
Total English.....	619	67.6	25.0 (40.6)	39.0 (62.5)	36.0 (54.5)
(European 151 + Id. of n° 10 (November 3))	254	72.0	15.0 (15.0)	33.0 (55.0)	52.0 (88.0)
Total 198 English + (8 + German).....	217	54.0	20.0 (28.0)	41.0 (58.0)	39.0 (55.0)

B. SOURIS PRÉSENTANT UN POURCENTAGE MOYEN DE TUMEURS

SOUCHE	NOMBRE DE SOURIS	INDICE CANCÉREUX	ÂGE DES SOURIS		
			7-12 mois	13-17 mois	18 mois et au delà
Complete English- Cream Hybrids....	1057	24.3	20.0 (8.6)	42.0 (18.0)	38.0 (16.1)
English-Cream Hy- brids, medium rate.	739	32.3	19.0 (11.3)	41.0 (24.4)	40.0 (24.0)
Total London.....	452	28.0	22.0 (10.9)	49.0 (22.0)	33.0 (16.0)
Total n° 8.....	243	27.5	12.0 (7.0)	27.5 (16.0)	60.0 (35.0)
(N° 8 A).....	213	30.0	11.4 (7.1)	32.2 (19.0)	56.4 (36.0)
Total Silver + Id. of n° 10.....	245	37.0	17.0	27.0	56.0
(Silver + 10 A).....	234	36.0	17.0	26.0	57.0
Total medium rate Cream + Id. of n° 10.	370	34.0	10.0 (5.4)	32.0 (17.0)	58.0 (31.0)
Total Cream + 10 in- cludes one low rate cross).....	498	27.5	8.4	29.0	62.6
Total 8 + German...	373	34.0	14.0 (8.0)	42.0 (24.0)	44.0 (25.0)
(8 + German A)....	244	41.0	13.0	40.0	47.0
Vermont Wild + En- glish F3.....	373	36.0	11.9	24.0	64.1

C. SOURIS PRÉSENTANT UN POURCENTAGE FAIBLE DE TUMEURS

SOUCHE	NOMBRE DE SOURIS	INDICE CANCÉREUX	AGE DES SOURIS		
			7-12 mois	13-17 mois	18 mois et au delà
Total English Cream					
low rate hybrids...	318	5.7	28.0 (2.5)	38.0 (3.4)	34.0 (3.0)
Total Cream	878	5.9	8.0 (1.0)	26.0 (3.3)	66.0 (8.2)
(Total Cream x).....	260	2.7	18.2 (0.8)	52.3 (12.3)	29.5 (1.3)
(Old Cream).....	226	2.0	0.0 (0.0)	20.0 (1.0)	80.0 (4.3)
(Total New Cream)..	349	10.5	7.6 (1.7)	25.0 (5.6)	07.4 (15.0)
Total European	263	9.3	21.0 (3.4)	34.0 (5.4)	45.0 (7.4)
Total European + 102 or 103).....	221	15.0	3.0 (1.0)	24.0 (7.5)	73.0 (23.0)
Total n° 8 1/2.....	241	13.0	11.3 (2.9)	50.0 (16.0)	39.0 (10.0)
Total (European + 102 F1 + 8 1/2 F4)..	602	16.0	6.5	21.0	72.5
(European + 102) F1 + 8 1/2 + F4 A.....	473	16.0	7.0	18.0	75.0
Total (European - 103) F1 + III d of n°10	219	14.6	4.4	29.0	66.6
German + Carter A.	358	9.0	6.6	26.0	67.4

Les tableaux donnés ci-dessus semblent démontrer d'une façon absolument nette l'influence des souches et des races de souris sur la fréquence du cancer. Il est vrai que, comme jamais personne ne semble avoir recherché l'existence des *Muspicea* dans ces élevages, il n'est pas permis de nier le rôle de ces dernières dans la production des cancers.

D'autre part, Miss Maud Slye (1927), qui a eu l'occasion d'étudier plus de 5.000 tumeurs spontanées de divers types sur 62.000 souris autopsiées depuis 18 ans, a constaté, dès 1916 et au cours des années suivantes, la susceptibilité toute spéciale de certaines souches de souris, dont l'hérédité est connue depuis longtemps, à produire des cancers. Aussi, cet auteur croit-il d'une façon absolue à l'hérédité de cette sensibilité spéciale de certaines lignées, non seulement vis-à-vis de l'espèce de tumeur observée, mais encore de la localisation de cette dernière et de l'existence ou de l'absence de métastases. Par sélection et par des élevages purs, M. Slye a réussi à conserver plusieurs milliers de souris n'ayant jamais présenté ni tumeurs malignes ni tumeurs bénignes.

Il est vrai que de Coulon et Boez (1924) mettent en doute cette hérédité cancéreuse admise par Maud Slye et L. Loeb. Ils se basent sur ce fait que sur 361 souris femelles adultes, provenant de deux femelles cancéreuses, ils n'ont observé que 34 tumeurs, tandis que, dans un élevage de même origine (1), ils ont observé sur 635 femelles un pourcentage de tumeurs de 4,17 en deux ans, chiffre semblant supérieur à celui des souris à ascendance cancéreuse. Cette observation, basée il est vrai sur des chiffres beaucoup plus faibles que ceux des savants américains, amène ces auteurs à nier l'influence de l'hérédité. Et cependant de Coulon et Boez devraient bien admettre cette propriété de certaines souches à faire plus facilement du cancer que d'autres, puisque, dans un autre élevage originaire de Mayence et dans lequel cependant quelques mâles parisiens avaient été utilisés, élevage vivant dans les mêmes conditions que l'autre, il a été noté un seul cas de cancer sur 500 femelles adultes. Cette observation confirme donc au lieu de les infirmer les conceptions de M. Slye et L. Loeb en ce qui concerne l'aptitude de certaines souches à pedigree établi depuis longtemps à présenter des cancers.

Un fait certain, c'est que le rôle des *Muspicea* ne peut être nié sans enquête impartiale et sans des expériences bien conduites, d'autant plus que nous savons que d'autres nématodes, tels que le *Gongylonema neoplasticum*, d'après Fibiger, et l'*Hepaticola gastrica*, d'après Beatti, Sambon et Bonne, Beatti et Bacigalupo, Vogel, sont susceptibles de provoquer, expérimentalement ou dans la nature, des cancers chez les rats. Le fait signalé par Dobrovolskaia et Kobozeff que des cancers de différents types ont été observés chez leur cinq souris présentant quelques *Muspicea*, ne permet pas d'infirmer l'hypothèse de Borrel, car nous savons par exemple que le *Cysticercus tæniæformis* peut provoquer expérimentalement plusieurs espèces de sarcomes chez le rat, d'après les recherches de Bullock et Curtis (1925, 1928).

Cependant, pour affirmer le rôle cancérigène des *Muspicea*, il faudrait pouvoir démontrer que chez des animaux de même origine et ayant la même hérédité, les cancers sont beaucoup plus fréquents chez les animaux présentant ce parasite que chez ceux ne l'hébergeant pas. Mes recherches actuelles ne me permettent pas encore de résoudre ce problème qui présente une très grande importance théorique et pratique. En effet, sur les 41 souris à adénocarcinomes chez lesquelles les *Muspicea* ont été recherchées

(1) Elevage parisien de l'Institut Pasteur de Paris.

avec soin sous la peau, dans divers muscles d'élection, dans les ganglions et les glandes salivaires, ainsi que dans les tumeurs 35 ont été négatives et les six positives ont présenté respectivement 1, 10, 1, 1, 1 et 2 vers.

Me rendant compte de tout l'intérêt de cette question, où le rôle direct ou indirect des parasites dans le cancer est en jeu, j'ai organisé depuis peu des élevages de souris semblant indemnes de *Muspicea* et d'autres de la même origine où ces vers existent. Un avenir prochain, sans doute, me permettra de donner une opinion précise sur ce sujet.

RÉSUMÉ

1. Une étude morphologique de la « filaire » de Borrel, décrite par Sambon, en 1925, sous le nom de *Muspicea borreli*, permet d'établir que, contrairement à ce qui avait été dit, ce ver ne présente ni bouche, ni vulve, ni anus. Un cordon cellulaire plein, homologue du corps adipeux des Mermithidés, représente probablement l'intestin moyen.

2. Ce ver qui n'avait été vu qu'en très petit nombre par Borrel, Haaland, Dobrovolskaia-Zavadskaia et Kobozieff, a été trouvé parfois en grand nombre, 332 dans un cas, 214 dans un autre, chez des souris infestées expérimentalement par divers schistosomes.

3. La fréquence de ce ver est très variable suivant les cuves d'élevage ; un fait certain, c'est que l'infestation semble favorisée par la baignade en commun à l'occasion d'expériences sur la transmission de diverses bilharzioses.

4. *Muspicea borreli* est un ver hermaphrodite, protandrique, vivipare, qui rejette ses embryons par la rupture du pôle antérieur de son corps.

5. D'après diverses expériences relatées dans ce travail, il semble probable que *Muspicea borreli* n'évolue pas dans le milieu extérieur, ni sur le sol ni chez un hôte intermédiaire parasite ou non. L'infestation semble se faire par léchage des larves rejetées par les adultes à la surface de la peau ou par ingestion de chair parasitée.

6. La classification de *Muspicea borreli* parmi les groupes de nématodes actuellement connus est à peu près impossible ; c'est pourquoi la création d'une famille spéciale s'imposait.

7. L'action cancérogène de ce ver chez la souris est difficile à établir par suite de la difficulté d'avoir des élevages absolument indemnes de ce parasite. Cependant, les faits relatés dans ce travail

montrent que 6 souris femelles seulement, sur 41 cancéreuses chez lesquelles les *Muspicea* ont été recherchées avec tout le soin désirable, ont présenté quelques rares *Muspicea* : 1 exemplaire dans quatre cas, 2 dans un cas et 10 dans un autre cas.

D'autre part, dans la cuve C, où douze souris sur treize autopsiées se sont montrées indemnes de *Muspicea*, cinq souris adultes de 12 mois environ, sur neuf, ont présenté des adénocarcinomes. Enfin, dans la cuve B, où aucune *Muspicea* n'a été rencontrée, chez les sept souris autopsiées, dont cinq cancéreuses, il a été observé six cas de cancer.

8. La grande proportion d'adénocarcinomes observés dans notre élevage nous permet de nous rallier aux idées de M. Slye, de L. Loeb et d'admettre la prédisposition au cancer de certaines souches de souris. Dans certaines de nos cuves, dans la cuve C par exemple, cinq souris sur neuf ont présenté des adénocarcinomes à l'âge de douze mois environ, soit dans 55,55 pour 100 des cas et dans la cuve B, sur neuf souris âgées de moins de quatorze mois, il a été observé six cancers, soit dans 66,6 pour 100 des cas.

9. Nous croyons intéressant de signaler que toutes nos souris sont élevées dans des cuves de zinc d'assez grande taille où leur multiplication s'effectue normalement, mais où la fréquence des cancers est extrêmement élevée. Il serait intéressant, en logeant des animaux de notre élevage dans des cuves de verre ou des caisses de bois, de voir si le zinc a une action directe ou indirecte sur la production de l'adénocarcinome de la souris.

EXPLICATION DES PLANCHES (1)

PLANCHE XI

Fig. 1. — *Muspicea borreli* Sambon, 1925, adulte rempli d'embryons mûrs dans un fragment de muscle de souris. $\times 35$.

Fig. 2. — *Muspicea* ayant évacué un lot d'embryons mûrs par l'extrémité antérieure de son corps, $\times 60$.

Fig. 3. — Jeune *Muspicea* : a, extrémité antérieure ; les bandes latérales et médianes simulent un œsophage ; à droite de l'ovaire, constitué sur la photographie par une masse foncée, se trouve un cordon cellulaire sans cavité qui peut être considéré comme une ébauche atrophiée de l'intestin moyen ; au-dessous de l'ovaire, les champs latéraux et médians sont bien visibles.

b, partie moyenne du ver ; de gauche à droite, ligne médiane plus étroite que les champs latéraux qui se présentent ensemble ; à droite, cordon cellulaire plein (Intestin moyen ?).

(1) J'adresse mes bien vifs remerciements au Dr M. Langeron pour les microphotographies représentées sur ces planches.

FIG. 1.

FIG. 2.

FIG. 3.

1

2

3

FIG. 4.

FIG. 5.

FIG. 6.

FIG. 7.

FIG. 8.

FIG. 9.

FIG. 10.

FIG. 11.

FIG. 12.

FIG. 13.

FIG. 14.

FIG. 15.

e, partie caudale; la partie foncée représente l'ovaire postérieur encadré par les champs latéraux; au-dessous de lui, fin du cordon cellulaire.

PLANCHE XII

FIG. 4. — Coupe transversale d'un ver montrant les lignes médianes et les champs latéraux. Entre ces champs les cellules musculaires, peu nombreuses, montrent des noyaux, bien visibles dans la coupe supérieure, plus volumineux que ceux des champs latéraux. $\times 300$ (Souris 136 bis XI).

FIG. 5. — Vestiges d'une *muspicea* ayant traversé le derme et l'épiderme et ayant évacué ses embryons à l'extérieur. Les couches épidermiques se voient nettement à gauche et à droite de la partie supérieure du ver. $\times 150$ (Souris 136 bis XI).

FIG. 6. — Coupe de la peau d'une souris (136 bis XI) très infectée par les *Muspicea*. Le ver, qui stationne vraisemblablement plusieurs jours sous la peau avant d'évacuer ses embryons à l'extérieur, produit une inflammation et un épaississement du derme et de l'épiderme. Le parasite, vu trois fois en coupe sur cette photographie, a traversé l'épiderme recouvert à cet endroit par une croûte, déterminée peut-être par des lésions de grattage. $\times 30$ (voir aussi fig. 8, pl. XIII).

FIG. 7. — Coupe de la peau d'une souris (482 XI) montrant, comme dans la fig. 6, un grand épaississement du derme au niveau du point où une *Muspicea* traverse l'épiderme. On voit ici, à gauche, un ver ne renfermant plus que quelques rares embryons, dont la partie située à la surface de la peau est desséchée comme dans le cas de la filaire de Médine. $\times 60$ (voir aussi fig. 9, pl. XIII).

PLANCHE XIII

FIG. 8. — Partie agrandie de la fig. 6 de la pl. XII. On voit nettement, en haut et à gauche, la couche épidermique épaisse traversée par un ver ayant évacué à peu près tous ses embryons et en bas un foyer inflammatoire provoqué par lui. $\times 60$ (Souris 136 bis XI).

FIG. 9. — Partie agrandie de la fig. 7 de la pl. XII, montrant la partie desséchée du ver et quelques embryons dans la partie intra-tissulaire du parasite. $\times 120$ (Souris 482 XI).

FIG. 10. — En haut épiderme épaissi; en bas deux coupes d'un ver ayant perforé la peau sur un point peu éloigné (fig. 11, pl. XIII) et renfermant encore quelques embryons. $\times 120$ (Souris 136 bis XI).

FIG. 11. — Coupe du ver représenté sur la figure précédente au point où il a perforé la peau et où il est recouvert d'une croûte formée de débris cellulaires et de noyaux en pycnose $\times 120$ (Souris 136 bis XI).

PLANCHE XIV

FIG. 12. — Coupe de peau de la souris 136 bis XI. En bas et à gauche, partie du corps du ver située dans le derme; en haut et à droite, au-dessus de l'épiderme, autre coupe du parasite montrant bien les champs latéraux et les lignes médianes ainsi que quelques embryons. Au-dessus du ver, dans la croûte noire qui le surmonte, on peut voir, dans une cavité, des embryons libres rejetés depuis un certain temps par lui. $\times 120$.

FIG. 13. — Un autre point de la peau de la souris 136 bis XI montrant de nombreux embryons libres dans une cavité placée immédiatement sous l'épiderme, un embryon traversant l'épiderme et au-dessus de lui des coupes transversales et obliques d'embryons déjà libérés et vivant dans les croûtes épidermiques. $\times 150$ (Souris 136 bis XI).

FIG. 14. — Réactions de l'hôte. Belle cellule géante placée à gauche de la coupe transversale d'un ver situé dans le derme. (Souris 136 bis XI), $\times 250$.

FIG. 15. — Foyer inflammatoire constitué par des cellules diverses autour d'un ver. Remarquer l'absence de réaction autour des trois autres coupes provenant peut-être d'une autre *Muspicea* placée à côté de la première. $\times 120$ (Souris 136 bis XI).

BIBLIOGRAPHIE

- ARLOING (F.) et JOSSEMAND (A.). — Contribution expérimentale à l'étude du rôle possible d'un parasitisme de transit dans l'étiologie des cancers de l'homme et en particulier des cancers du tube digestif. *Bull. Assoc. franç. Etude Cancer*, Paris, XVI, 1927, p. 777-790.
- BAYLIS (H.-A.) et DAUBNEY (R.). — *A synopsis of the families and genera of Nematoda*. Londres, Brit. Museum (Nat. Hist.), 1926.
- BAYON (H.-P.). — Parasites and malignant proliferations. *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXX, 1927, p. 73-80.
- BEATTI (M.). — Weitere Untersuchungen über Spontantumoren bei wilden Ratten. Noch ein fall von Epithelioma des Vormagens durch einen neuen Parasiten hervorgerufen. *Zeitschr. f. Krebsforsch.*, XIX, 1923, p. 325-336.
- BEATTI (M.) et BAGIGALUPO (J.). — Existencia del *Gongylonema neoplasticum* (Fibiger-Ditlevsen) en nuestro país. *Rev. Soc. argent. de Biol.*, III, 1927, p. 604-609.
- BONNE (C.). — Cancer of the stomach of the wild rat and infection with a nematode worm, *Hepaticola gastrica* Baylis, 1926. *Journ. of trop. med. and hyg.*, XXIX, 1926, p. 56.
- BORREL (A.). — Cancer et helminthes. *Bull. Acad. Méd.*, LV, 1906, p. 591.
- Parasitisme et tumeurs. *Conférence internat. pour l'étude du cancer*. Paris 1910 et *Ann. Inst. Pasteur*, Paris, XXIV, 1910, p. 778-788.
- Le Cancer. *Revue Scient.*, 1912.
- Recherches sur l'étiologie et la nature du cancer. *1^{er} Congrès intern. Path. comp.*, Paris, 1912.
- Etiologie vermineuse de certains cancers. *Bull. Assoc. franç. étude cancer*, XVI, 1927, p. 126-131.
- Filaire et adénocarcinome. *C. R. Soc. Biol.*, XCIX, 1928, p. 1862.
- Filaire et adénocarcinome. *Bull. Assoc. franç. étude cancer*, XVII, p. 700-706.
- BRUMPT (E.). — Etude de l'autofécondation du mollusque aquatique pulmoné, *Bullinus contortus*. *C. R. Acad. Sc.*, Paris, CLXXXVI, 1928, p. 1012.
- BULLOCK (F.-D.) et CURTIS (M. R.). — Types of *Cysticercus* tumors. *Journ. for Cancer Research*, IX, 1925, p. 425-443.
- A *Cysticercus* carcino-osteochondrosarcoma of the rat liver with multiple *Cysticercus* sarcomata. *Journ. for Cancer Research*, XII, 1928, p. 326-334.
- CAULLERY (M.). — *Les problèmes de la sexualité*. Paris, E. Flammarion, 1920.

- COULON (A. de) et BOEZ (L.). — Contribution à l'étude de l'hérédité cancéreuse chez la souris. *Bull. Assoc. franç. étude cancer*, XIII, 1924, p. 511.
- DOBROVOLSKAIA-ZAVADSKAIA (N.) et KOBOZIEFF (N.). — Sur le rôle de la filaire dans les cancers de la souris. *C. R. Soc. Biol.*, CII, 1929, p. 307.
- HAALAND (M.). — Les tumeurs de la souris. *Ann. Inst. Pasteur*, Paris, XIX, 1905, p. 165-207.
- Spontaneous tumors in Mice. *Fourth. Scient. Rep. Imp. Res. Fund.*, 1911.
- LATHROP (A. E. C.) et LOEB (L.). — Further investigations on the origin of tumors in Mice. IV. The tumor incidence in later generations of strains with observed tumors rates. *Journ. for Cancer Research*, IV, 1929, p. 137-179.
- LOEB (L.). — Further investigations on the origin of tumors in Mice. VII. Tumor age and Tumor incidence. *Journ. for Cancer Research*, VI, 1921, p. 197-222.
- MARSH (M.-C.) et WULKER (G.). — Ueber das Vorkommen von Nematoden und Milben in normalen und spontan Tumorenmäusen. *Zeitschr. f. Krebsforsch.*, XV, 1916, p. 383-403 (17 fig.).
- MAUPAS (E.). — La mue et l'enkystement chez les Nématodes. *Arch. Zool. Exp.*, 3^e s., VII, 1899, p. 563-628, pl. 16-18.
- Modes et formes de reproduction des Nématodes. *Arch. Zool. Exp.*, 3^e s., VIII, 1900, p. 463-624, pl. XVI à XXVI.
- ROUSSY (G.), LEROUX (R.) et WOLF (M.). — Le Cancer. *Nouveau traité de Médecine*. Paris, Masson, fasc. VII, 1929.
- SAMBON (L.-W.). — Observations and researches on the epidemiology of cancer made in Holland and Italy (Mai-sept. 1915). *Journ. of trop. med. and hyg.*, 1926, p. 54.
- SEURAT (L.-G.). — *Histoire naturelle des Nématodes de la Berbérie*. Université d'Alger, 1920.
- SLYE (M.). — The incidence and inheritability of spontaneous cancer in mice. *Journ. for Cancer Research*, I, 1916.
- The inheritance behaviour of infections common to mice. Studies on the incidence and inheritability of spontaneous tumors in Mice. *Journ. for Cancer Research*, II, 1917, p. 213-244.
- The influence of heredity in determining tumor metastasis. Studies on the incidence and inheritability of spontaneous tumors in Mice. Sixteenth report. *Journ. for Cancer Research*, VI, 1921, p. 139.
- The relation of heredity to spontaneous thyroids tumors in Mice. Studies on the incidence and inheritability of spontaneous tumor in Mice. 25th Report. *Journ. of Cancer Research*, XI, 1927, p. 54-71.
- VOGEL (H.). — Magencarcinome der Ratte nach experimentellen infektion mit *Hepaticola gastrica*. *Ztschr. f. Krebsforschung*, XXIX, 1929, p. 351-359.
- YORKE (W.) et MAPLESTONE (P.-A.). — *The Nematode parasites of Vertebrates*. Londres, Churchill, 1926.