RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX ⁽¹⁾

Flagellés

Spirotrichonympha pulchella V. E. Brown. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Reticulitermes hageni*. Strawberry Cañon; Golden Gate Park, San Francisco; Sparta, Georgia (Amérique du nord). *Arch. für Protist.*, LXX, 1930, p. 521.

Spirotrichonympha gracilis V. E. Brown. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Reticulitermes hageni*. Strawberry Cañon; Golden Gate Park, San Francisco; Sparta, Georgia (Amérique du nord). *Arch. für Protist.*, LXX, 1930, p. 522.

Giardia hegneri H. J. Chu. *Lamblidæ*. Intestin. *Viverra tangalunga* Gray. (Mamm.). Dasmariñas, Philippines. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 231.

M. LANGERON.

Infusoires

Buxtonella A. P. Jameson. *Isotrichidæ*. Espèce type : *B. sulcata*. *Parasitology*, XVIII, 1926, p. 182.

Buxtonella sulcata A. P. Jameson. *Isotrichidæ*. Cæcum. Bovidés. Cambridge (Angleterre). *Parasitology*, XVIII, 1926, p. 182.

Paraisotricha beckeri Hsiung. *Paraisotrichidæ*. Cæcum. Cheval. Iowa State College (U. S. A.). *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 34.

Alloiozona Hsiung. Holotriche. Espèce type : *A. trizona*. *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 35.

Alloiozona trizona Hsiung. Holotriche. Cæcum. Cheval. Iowa State College (U. S. A.). *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 35.

Blepharoconus cervicalis Hsiung. Holotriche. Colon. Cheval. Iowa State College (U. S. A.). *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 36.

Charon equi Hsiung. Holotriche. Colon. Cheval. Iowa State College (U. S. A.). *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 37.

Cycloposthium affine A. Strelkow. *Cycloposthiidæ*. Cæcum. Cheval. Abattoirs de Leningrad. *Zool. Anz.*, LXXXIII, 1929, p. 63.

(1) La Direction des *Annales de Parasitologie* prie instamment les auteurs qui décrivent des espèces parasitaires nouvelles de vouloir bien lui adresser leurs travaux, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, à Paris, afin qu'il en soit tenu compte dans le plus court délai. A défaut de tirés à part, on peut envoyer une liste des espèces nouvellement décrites, avec indications bibliographiques.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. VIII, n° 6. — 1^{er} décembre 1930, p. 660-672.

Phthorophrya Chatton, A. et M. Lwoff. *Fæltlingeriidæ*. Espèce type : *P. insidiosa*. C. R. Acad. sc., CXC, 1930, p. 1080.

Phthorophrya insidiosa Chatton, A. et M. Lwoff. *Fæltlingeriidæ*. Hyperparasite de *Gymnodinioides corophii* (*Fæltlingeriidæ*), parasite des *Corophium volutator* (Crust. amphipodes). Madeira (baie de l'Aber), Roscoff (Finistère). C. R. Acad. sc., CXC, p. 1081.

Phthorophrya mendax Chatton, A. et M. Lwoff. *Fæltlingeriidæ*. Hyperparasite de *Gymnodinioides incystans* (*Fæltlingeriidæ*), parasite de *Carcinus mænas*. Pempoull (Roscoff, Finistère). C. R. Acad. sc., CXC, 1930, p. 1082.

Phthorophrya fallax Chatton, A. et M. Lwoff. *Fæltlingeriidæ*. Hyperparasite de *Gymnodinioides incystans* (*Fæltlingeriidæ*), parasite de *Carcinus mænas*. Pempoull (Roscoff, Finistère). C. R. Acad. sc., CXC, 1930, p. 1082.

Gymnodinioides corophii Chatton, A. et M. Lwoff. *Fæltlingeriidæ*. Lamelles des endopodites. *Corophium volutator* (Crust. amphipode). Madeira (baie de l'Aber), Roscoff (Finistère). C. R. Acad. sc., CXC, 1930, p. 1080.

Phoretophrya Chatton, A. et M. Lwoff. *Fæltlingeriidæ*. Espèce type : *P. nebalie*. C. R. Acad. sc., CXC, 1930, p. 1153.

Phoretophrya nebalie Chatton, A. et M. Lwoff. *Fæltlingeriidæ*. Appendices de *Nebalia geffroyi* (Crust.). Roscoff, Finistère. C. R. Acad. sc., CXC, 1930, p. 1153.

Lechriopyla Lynch. *Plagiopylidæ*. Espèce type : *L. mystax*. Univ. Calif. public. in zool., XXXIII, 1930, p. 340.

Lechriopyla mystax Lynch. *Plagiopylidæ*. Intestin. *Strongylocentrotus purpuratus* (Stimpson), *S. franciscanus* A. Agassiz (Echinodermes). Pacific Grove, Californie. Univ. Calif. public. in zool., XXXIII, 1930, p. 307.

Entorhipidium Lynch. *Chiliferidæ*. Espèce type : *E. echini*. Univ. Calif. public. in zool., XXXIII, 1929, p. 47.

Entorhipidium echini Lynch. *Chiliferidæ*. Intestin. *Strongylocentrotus purpuratus* (Stimpson) (Echinod.). Pacific Grove, Californie. Univ. Calif. public. in zool., XXXIII, 1929, p. 31.

Entorhipidium tenue Lynch. *Chiliferidæ*. Intestin. *Strongylocentrotus purpuratus* (Stimpson) (Echinod.). Pacific Grove, Californie. Univ. Calif. public. in zool., XXXIII, 1929, p. 39.

Entorhipidium pilatum Lynch. *Chiliferidæ*. Intestin. *Strongylocentrotus purpuratus* (Stimpson) (Echinod.). Pacific Grove, Californie. Univ. Calif. public. in zool., XXXIII, 1929, p. 40.

Entorhipidium multimicronucleatum Lynch. *Chiliferidæ*. Intestin. *Strongylocentrotus purpuratus* (Stimpson) (Echinod.). Pacific Grove, Californie. Univ. Calif. public. in zool., XXXIII, 1929, p. 43.

M. L.

Trématodes

Pseudobilharziella Ejsmont. *Schistosomidæ*. Espèce type : *P. kowalewskii*. Bull. Acad. polonaise sc. et lettres, B, sc. nat. (II), XXXIV, 1929, p. 400.

Pseudobilharziella kowalewskii Ejsmont. *Schistosomidæ*. Mâle seul connu, chez les oiseaux. Bull. Acad. polonaise sc. et lettres, B, sc. nat. (II), XXXIII, 1929, p. 400.

Gomtia Thapar. *Opisthorchiidæ*. Espèce type : *G. piscicola*. Ann. de parasitologie, VIII, 1930, p. 249.

Gomtia piscicola Thapar. *Opisthorchiidæ*. Intestin. Poissons siluroïdes. Rivière Gomti, Lucknow, Inde anglaise. Ann. de parasitologie, VIII, 1930, p. 249.

Cyclocœlum (Uvitellina) dollfusi Tseng Shen. *Cyclocœlidæ*. Cavité générale. *Microsarcops cinereus* Blyth. (Passériformes), Nanking (Chine). Ann. de parasitologie, VIII, 1930 p. 254.

Diplodiscus pygmaeus Lutz. *Amphistomidæ*. Rectum. *Pseudis* sp. (Batr.). Venezuela. A. Lutz, *Estudios de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 102.

Echinostomum parvum Lutz. *Echinostomidæ*. Rédies et cercaires chez *Planorbis olivaceus* : adultes expér. chez le pigeon domestique. Venezuela (? = *E. discinctum* Dietz de *Cassiculus solitarius*, Passériformes). A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 104.

Petasisger novemdecim Lutz. *Echinostomidæ*. Intestin. *Podiceps dominicus* (Colymbiformes). Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 105.

Neodiplostomum nephrocystis Lutz. *Holostomidæ*. Adultes dans l'intestin d'un épervier rouge (Gavilan bermejo) (Falconiformes); kystes dans le rein de batraciens. Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 117.

Neodiplostomum branchiocystis Lutz. *Holostomidæ*. Adultes dans l'intestin de *Pitangus sulfureus* (Passériformes); kystes dans les branchies de petits poissons. Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 117.

Conchogaster obesus Lutz. *Holostomidæ*. Adultes chez *Carbo* (*Phalacrocorax*) *brasiliensis* (Cotua) (Ciconiiformes); kystes chez des poissons. Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 117.

Conchogaster prosocotyle Lutz. *Holostomidæ*. Adultes chez *Crotophaga ani* et *Piaya cayana* (Cuculiformes). Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 118.

Alaria elongata Lutz. *Holostomidæ*. Adultes chez *Podiceps dominicus* (Colymbiformes). Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 118.

Alaria compacta Lutz. *Holostomidæ*. Adultes chez *Carbo brasiliensis* (Ciconiiformes). Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 118.

Strigea ardearum Lutz. *Holostomidæ*. Adultes chez les hérons diurnes et nocturnes. Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 118.

Strigea gallinulae Lutz. *Holostomidæ*. Adultes chez des *Gallinula* (Gruiformes) (gallitos de agua). Brésil et Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 118.

Catatropis appendiculata Lutz. *Monostomidæ*. Intestin. *Nettion brasiliense* (Ansériformes). Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 121.

Clinostomum pusillum Lutz. *Harmostomidæ* (?). Bec. *Podiceps dominicus* (Colymbiformes). Venezuela. A. Lutz, *Estud. de zool. y paras. venezolanas*, Rio de Janeiro, 1928, p. 123.

Schistosoma mattheei Veglia et Le Roux. *Schistosomidæ*. Veine porte et ses branches. Mouton. Province du Cap (Humansdorp District), Afrique du sud. 15 th. Ann. Rep. of the Director of veter. serv., Union of South Africa, octobre 1929, p. 335.

Traumatrema C. Pereira. *Plagiorchidæ*. Espèce type : *T. traumatrema*. *Boletim biol.*, fasc. 16, 1929, p. 92.

Traumatrema traumatrema C. Pereira. *Plagiorchidæ*. Intestin. *Ophis merremii* (Wagler, 1824) (Rept.). Institut de Butatan, São Paulo, Brésil, *Boletim biol.*, fasc. 16, 1929, p. 92.

Parahemiurus Vaz et Pereira. *Hemiuridæ*. Espèce type : *P. parahemiurus*. *C. R. Soc. biol.*, CIII, 1930, p. 1316.

Parahemiurus parahemiurus Vaz et Pereira. *Hemiuridæ*. Estomac. *Sardinella aurita* Cuv. et Val. (Poisson). Littoral nord de l'Etat de São Paulo, (Brésil). *C. R. Soc. biol.*, CIII, 1930, p. 1316.

Parahemiurus anchoviae Vaz et Pereira. *Hemiuridæ*. Intestin. *Anchovia olida* (Poisson). Santos, Etat de São Paulo, (Brésil). *C. R. Soc. biol.*, CIV, 1930, p. 705.

Tremiorchis varanum Verma. *Plagiorchidæ*. Intestin grêle. *Varanus bengalensis*, *V. griseus* (Rept.). Allahabad (Inde anglaise). *Parasitology*, XXII, 1930, p. 306.

Synthesium Stunkard et Alvey. *Fasciolidæ*. Espèce type : *S. tursionis* (Marchi) (= *Distomum tursionis* Marchi). *Parasitology*, XXII, 1930, p. 332.

Plagiorchis geminus J. F. Mueller. *Plagiorchidæ*. Intestin. *Ameiurus nebulosus* (Poiss.). Lac Oneida, Etat de New-York. *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 176.

Oswaldoia alagesi Skrjabin et Udinzew. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Pica pica* N 4413 et N 4418 (Passériformes). District d'Erivan (Arménie). *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 213.

Lyperosomum papabejani Skrjabin et Udinzew. *Dicrocoeliidæ*. Canaux et vésicule biliaires. *Caccabis chukar* N 4313 et N 4314 (Galliformes). District d'Erivan (Arménie). *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 214.

Plagiorchis micromaculosus Skrjabin et Massino. *Plagiorchidæ*. Intestin. *Sylvia atricapilla*, *S. hortensis*, *Muscicapa grisola*, *M. atricapilla* (Passériformes). Gouv. de Moscou. *Centrlbl. für Bakt.*, II Abt., LXIV, 1925, p. 457.

Prosthogonimus fuelleborni Skrjabin et Massino. *Plagiorchidæ*. Bourse de Fabricius. *Corvus cornix* (Cuculiformes). Nemtschinow-Post, Gouv. de Moscou. *Centrlbl. für Bakt.*, II Abt., LXIV 1925, p. 459.

Eurytrema koschewnikowi Skrjabin et Massino. *Dicrocoeliidæ*. Vésicule biliaire. *Muscicapa grisola* (Passériformes). Environs de Moscou. *Centrlbl. für Bakt.*, II Abt., LXIV, 1925, p. 461.

Cercaria mehrai Faruqui. Cercaire échinostome (?). Hépatopancréas. *Indoplanorbis exustus* (Deshayes). Handia, près d'Allahabad (Inde anglaise). *Indian Journ. med. res.*, XVII, 1930, p. 1205.

Cercaria bursacetabula Faust. Xiphidiocercariæ. *Bithynia fuchsiana*. Lac du jardin du prince Tsai, Yenching University Campus, Peking. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 146.

Cercaria lophocauda Faust. Xiphidiocercariæ. *Planorbis möllendorfi*. Laughing Buddha Temple (Wo Fo Ssu) près de Pékin. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 147.

Cercaria yenchingensis Faust. Monostome. *Bithynia fuchsiana*. Jardin du prince Tsai, Yenching University Campus, Peking. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 147.

Cercaria triophthalmia Faust. (?). *Bithynia fuchsiana*. Middle East Gate, Peking. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 148.

Cercaria beatifica Faust. Distome (hétérophyle). *Bithynia fuchsiana*. Chi Hua Men, Peking. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 149.

Cercaria complicata Faust. Lophocercæ. *Bithynia fuchsiana*. Middle East Gate, Peking. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 150.

Cercaria chitinostruma Faust. Echinostome (?). *Bithynia longicornis*. Soochow (Chine). *Parasitology*, XXII, 1930, p. 151.

Cercaria catenadena Faust. Echinostome (?). *Parafossarulus sinensis*. Anking (Chine). *Parasitology*, XXII, 1930, p. 151.

Cercaria tauiana Faust. Furcocercæ. *Bithynia fuchsiana*. Middle East Gate, Peking. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 152.

Cercaria anhweiensis Faust. Strigeidæ. *Parafossarulus sinensis*. Anking (Chine). *Parasitology*, XXII, 1930, p. 153.

Cercariaeum sinense Faust. Allocreadiidæ. *Bithynia fuchsiana*. Jardin du prince Tsai, Yenching University, Peking. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 154.

Nagmia Nagaty. Anaporrhutinae Gorgoredidæ. Espèce type : *N. yorkei*. *Ann. of trop. med. and paras.*, XXIV, 1930, p. 107.

Nagmia yorkei Nagaty. Anaporrhutinae Gorgoredidæ. Rectum. Trygon sp. Pearl Banks, Ceylan. *Ann. of trop. med. and paras.*, XXIV, 1930, p. 97.

Bucephalus elegans Woodhead. Bucephalidæ. Intestin. *Ambloplites rupestris* (Rafinesque) (Poisson). Huron River, Ann Arbor, Michigan. *Trans. amer. micr. Soc.*, XLIX, 1930, p. 1.

Eucotyle hassalli E. W. Price. Eucotylidæ. Intestin (?) ou voies urinaires. *Colymbus auritus* (Colymbiformes). Etats-Unis (Washington D. C.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 1, p. 2.

Eucotyle wehri E. W. Price. Eucotylidæ. Intestin (?) ou voies urinaires. *Querquedula discors* (Anseriformes). Etats-Unis (Miles City, Mont.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVII, 1930, art. 1, p. 3.

Cercaria anomala Anantanarayan Furcocercæ. *Indoplanorbis exustus* (Deshayes). Waterworks Tank, Bellary district, Madras. *Scient. papers civil veter. depart. Madras*, I, 1929, p. 19.

Neodiplostomum gavialis Dharam Narain. Strigeidæ. Intestin. *Gavialis gangeticus* (Rept.). Allahabad (Inde anglaise). *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 151.

Braunotrema E. W. Price. Callodistomidæ. Nom. nov. pro *Thaumatocotyle* Odhner, 1910, nec Scott, 1904, præoccupatum. Espèce type : *B. pulvinata* (Braun, 1899). *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 161.

Plagitura F. J. Holl. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *P. salamandra*. Journ. Elisha Mitchell Scient. Soc., XLIII, 1928, p. 181.

Plagitura salamandra F. J. Holl. *Lepodermatidæ*. *Triturus viridescens* Rafinesque (*Salamandridæ*). Durham (Caroline du nord). Journ. Elisha Mitchell scient. soc., XLIII, 1928, p. 181.

Phocitrema Goto et Ozaki. *Opisthorchiidæ*. Espèce type : *P. fusiforme*. Japan journ. zool., III, 1930, p. 74.

Phocitrema fusiforme Goto et Ozaki. *Opisthorchiidæ*. Intestin. *Phoca hispida* Schreber (Pinnipède). Jardin zool. de Tokyo. Japan journ. zool., III, 1930, p. 74.

Lebouria elongata Goto et Ozaki. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Sarcocheilichthys variegatus* (Temm. et Schlegel) (*Cyprinidæ*). Lac Biwa (Japon). Japan. journ. zool., III, 1930, p. 75.

Mesocœlium pearsi Goto et Ozaki. *Dicrocœliidæ*. Intestin grêle. *Pseudosalamandra stejnegeri* (Batr.). Kagoshima (Japon). Japan. Journ. zool., III, 1930, p. 76.

Mesocœlium japonicum Goto et Ozaki. *Dicrocœliidæ*. Intestin. *Polypedates buergeri* Schlegel (Batr.), Yasuhara, province Sanuki (Japon); *Pseudosalamandra stejnegeri*, Kyushu (Japon). Japan. journ. zool., III, 1930, p. 77.

Mesocœlium ovatum Goto et Ozaki. *Dicrocœliidæ*. Intestin. *Rana rugosa* Schlegel (Batr.). Sendai et Komaba (Japon). Japan. journ. zool., III, 1930, p. 78.

Tetracotyle biwaensis Goto et Ozaki. *Holostomidæ*. Métacercaire enkystée dans le tissu adipeux, le mésentère et le foie. *Sarcocheilichthys variegatus* (Temm. et Schleg.) (*Cyprinidæ*). Lac Biwa (Japon). Japan. journ. zool., III, 1930, p. 80.

Psettarium Goto et Ozaki. Nom. nov. pro *Plehnia* Goto et Ozaki, 1929, nec Sixten Bock, 1913 (Polyclade). Japan. journ. zool., III, 1930, p. 81.

Microcotyle baumi Curt Sprehn. *Microcotylidæ*. Branchies. *Cantharus* sp. (Poiss. téléostéen, *Sparidæ*). Aquarium à Leipzig (origine : Méditerranée). Baum-Festschrift, Hannover, 1929, p. 356.

Astacotrema tuberculatum M. M. Zavadovsky. *Allocreadiidæ*. Métacercaires progénétiques enkystées et libres dans les glandes génitales. *Astacus leptodactylus* Esch. (Crust. décapode d'eau douce). Région de Tver (Russie). Trans. labo. exper. biol. Zoopark Moskow, I, 1926, p. 3 du tiré à part.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Paraschistometra Woodland. *Idiogeninæ*. Espèce type : *P. macqueeni*. Parasitology, XXII, 1930, p. 220.

Paraschistometra macqueeni Woodland. *Idiogeninæ*. Intestin. *Houbara macqueeni* (Gruiformes). Jardin zoologique de Londres. Parasitology, XXII, 1930, p. 220.

Hemiparonia merotomocheta Woodland. *Anoplocephalinæ*. Intestin. *Cacatua leadbeateri* (Cuculiformes). Australie. Parasitology, XXII, 1930, p. 221.

Hymenolepis lamellata Woodland. *Hymenolepididæ*. Intestin. Australian sheld-drake (*Tadorna radjah* ou *Casarca tadornoides*). Jardin zoologique de Londres. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 226.

Hymenolepis pearsi Joyeux et Baer. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Hybomys univittatus* Pet. (Mamm.). Nigeria. *Journ. of helminthology*, VIII, 1930, p. 60.

Hymenolepis uncinispinosa Joyeux et Baer. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Hybomys univittatus* Pet., *Mastomys erythroleucas* Temm. Nigeria. *Journ. of helminthology*, VIII, 1930, p. 61.

Raillietina (Paroniella) magninumida Myrna Jones. *Davaineidæ*. Intestin. *Numida meleagris* (Galliformes). Marché de Washington, D. C. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 158.

Moniezia rupicaprae Galli-Valerio. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Capella rupicapra* (Mamm.). La Liaz, Val de Bagnes (Suisse). *Ztbl. für Bakt., Orig.*, CXII, 1929, p. 58.

Polyonchobothrium fulgidum Meggitt. *Bothriocephalidæ*. Intestin. *Heterobranchus anguillaris*. Le Caire. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 343.

M. LANGERON.

Andrya monodi Joyeux et Baer. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Xerus (Euxerus) erythropus* E. Geoffroy (Rongeurs, *Sciuridæ*). Niafunké sur Niger. *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2) II, 1930, p. 217.

Bertia hamadryadis U. Pierantoni. *Anoplocephalidæ*. Tube digestif. *Hamadryas hamadryas* (L.) (Primate). *Inst. méd. vétér. Turin. Ann. Mus. zool. R. Univ. Napoli*, N. S., V, 1928, p. 1.

Raillietina rangoonica K. Subramanian. *Hymenolepididæ*. Intestin. *Gallus domesticus* (Galliformes). Rangoon (Burma). *Journ. Burma res. Soc.*, XVIII, 1928, p. 78.

R.-Ph. DOLLFUS.

Nematodes

Skryabinocerca N. Shikhobalova. *Acuariidæ*. Espèce type : *S. prima*. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 220.

Skryabinocerca prima N. Shikhobalova. *Acuariidæ*. Œsophage. *Trypanocorax pastinator* (Oiseau). Ile Sakhaline. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 220.

Agamospirura anabri J. R. Christie. *Spiruridæ*. Cavité générale. *Anabrus simplex* (Orthopt.). Bush Creek, Montana, U. S. A. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 250.

Agamonema migrans J. R. Christie. Sous les élytres. *Tachinus flavipennis*, *Geotrupes splendidus* (Coléopt.). Falls Church, Virginia, U. S. A. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 253.

Agamonema infestans J. R. Christie. Surface du corps. *Necrophorus* sp. (Coléopt.). Falmouth, Massachusetts, U. S. A. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 255.

Agamonema viscosum J. R. Christie. Surface du corps et sous les élytres. *Geotrupes* sp. (Coléopt.). Etat-Unis. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 252.

Haemonchus mitchelli Le Roux. *Trichostrongylidæ*. *Abomasus* (caillette). *Taurotragus oryx* Pall. (Mamm.). Drakensberg national game reserve, Natal. 15 th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 451.

Haemonchus veglii Le Roux. *Trichostrongylidæ*. *Abomasus* (caillette). *Strepsiceros strepsiceros* Pall. (Mamm.). Afrique du Sud. 15 th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union. South Africa, octobre 1929, p. 451.

Haemonchus bedfordi Le Roux. *Trichostrongylidæ*. *Abomasus* (caillette). *Gorgon taurinus* Burch., nord du Transvaal, Waterberg District ; *Synceros cafer* Sparrm., Zululand (Mamm.). 15 th. Ann. Rep. Director. veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 451.

Cesophagostomum susannae Le Roux. *Strongylidæ*. Kystes hémorragiques sous-muqueux du cæcum. *Pedetes caffra* (Hemalys, Rongeur). Ermelo, eastern Transvaal. 15 th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 465.

Dirofilaria pongoi Vogel et Vogelsang. *Filaridæ*. Cœur droit. *Pongo pygmaeus* Hoppius (Orang-Utan). Bornéo. *Ztrbl. für Bakt., Orig.*, CXVII, 1930, p. 480.

Dirofilaria bonnei Vogel et Vogelsang. *Filaridæ*. Péritoine et sang. *Mus rattus* L. Java. *Ztrbl. für Bakt., Orig.*, CXVII, 1930, p. 483.

Ostertagia orloffii Sankin. *Trichostrongylidæ*. Caillette. Mouton. Oural, Bredy, district de Troizky. *Ztrbl. für Bakt., Orig.*, CXVII, 1930, p. 486.

Trichuris tenuis A. S. Chandler. *Trichocephalidæ*. Intestin. *Camelus dromedarius*. Houston zool. garden, Houston, Texas. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 204.

Thubunaea asymmetrica Baylis. *Spiruridæ*. Estomac. *Mabuya maculilabris* (Gray) (Rept.). Rivière Aswa, à l'est de Paranga, province du nord, Uganda. *Ann. and Mag. nat. hist.*, (10), V, 1930, p. 246.

Spinicauda australiensis Baylis. *Heterakidæ*. Rectum. *Tiliqua scincoides* (Rept.). Townsville, Ching Do, Queensland (Australie). *Ann. and Mag. nat. hist.*, (10), V, 1930, p. 354.

Subulura peramelis Baylis. *Heterakidæ*. Estomac (?). *Perameles obesula* (Marsup.). Rollingsstone, North Queensland (Australie). *Ann. and Mag. nat. hist.*, (10), V, 1930, p. 356.

Parathelandros Baylis. *Oxyuridæ*. Espèce type : *P. mastigurus*. *Ann. and Mag. nat. hist.*, (10), V, 1930, p. 363.

Parathelandros mastigurus Baylis. *Oxyuridæ*. Intestin grêle et rectum, *Hyla cærulea* (Batr.) ; rectum, *Hyla gracilentia* (Batr.). Townsville, Queensland (Australie). *Ann. and Mag. nat. hist.*, (10), V, 1930, p. 359.

Pharyngodon tiliquæ Baylis. *Oxyuridæ*. Rectum. *Tiliqua scincoides* (Rept.). Townsville, North Queensland (Australie). *Ann. and Mag. nat. hist.*, (10), V, 1930, p. 364.

Fontonema Chitwood. *Oxyuridæ*. Espèce type : *F. brachygaster*. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 163.

Fontonema brachygaster Chitwood. *Oxyuridæ*. Intestin. *Fontaria coriacea* (Myriapode). Washington, D. C. *Journ. of paras.*, XVI, 1930, p. 163.

Subulura malayensis C. U. Lee. *Heterakidae*. Intestin. *Pithecus fascicularis* Raffl., Java ; *Cynopithecus maurus* F. Cuv., Archipel malais. *Zentrbl. für Bakt., Orig.*, CXVI, 1930, p. 169.

Citellina Prendel. *Oxyuridae*. Espèce type : *C. dispar*. *Rev. microbiol., épidémiol. et paras.* (Saratov), VII, 1928, p. 410.

Citellina dispar Prendel. *Oxyuridae*. Intestin (cæcum). *Citellus suslika* Güld. Odessa. *Rev. microbiol. épidémiol. et paras.* (Saratov), VII, 1928, p. 410.

Citellina marmotae H. W. Manter. *Oxyuridae*. Intestin. *Marmota monax canadensis*. Maine (U. S. A.). *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 26.

Citellina triradiata (Hall, 1916). *Oxyuridae*. Nov. comb. pro *Oxyuris triradiata* Hall, 1916. Intestin. *Ammospermophilus leucurus cinnamomeus*, *Callospermophilus lateralis* (Rongeurs). Colorado (U. S. A.). *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 26.

Citellinema monacis H. W. Manter. *Trichostrongylidae*. Intestin grêle. *Marmota monax canadensis* (Rongeur). Maine (U. S. A.). *Trans. amer. micr. soc.*, XLIX, 1930, p. 30.

Citellinema sleggsi H. W. Manter. *Trichostrongylidae*. Nom. nov. pro *Warrenius bifurcatus* Sleggs, 1925. *Trans. amer. micr. soc.*, XLIV, 1930, p. 30.

Strongyloides ransomi B. Schwartz et J. E. Alicata. *Rhabditidae*. Intestin grêle. *Sus scrofa domestica*. Bethesda, Maryland (U. S. A.). *Journ. agric. res.*, XL, 1930, p. 15.

Agriostomum equidentatum Mönnig. *Ancylostomidae*. Intestin grêle. *Antidorcas marsupialis* (Mamm.). Aliwal North (Province du Cap). 15th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 311.

Filarinema Mönnig. *Trichostrongylidae*. Espèce type : *F. flagrifer*. 15th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 307.

Filarinema flagrifer Mönnig. *Trichostrongylidae*. Estomac. *Macropus rufus* (kangaroo rouge). Animal provenant d'Australie, mort peu après au jardin zoologique de Pretoria. 15th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 307.

Hypodontus Mönnig. *Ancylostomidae*. Espèce type : *H. macropi*. 15th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 303.

Hypodontus macropi Mönnig. *Ancylostomidae*. Intestin. *Macropus rufus* (kangaroo rouge). Australie (mort au jardin zoologique de Pretoria). 15th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 303.

Physaloptera canis Mönnig. *Spiruridae*. Estomac. *Canis familiaris*. Pretoria. 15th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octob. 1929, p. 329.

Agriostomum gorginis Le Roux. *Ancylostomidae*. Ileon. *Gorgon taurinus* (Mamm.). Waterberg District, nord du Transvaal. 15th. Ann. Rep. Director veter. serv. Union South Africa, octobre 1929, p. 481.

Torquatella crotophaga O. L. Williams. *Ancyracanthidae*. Sous la couche cornée du gésier. *Crotophaga ani* (Cuculiformes). Panama : Ft. Davis, Canal Zone. Univ. of California public. in zool., XXXIII, 1929, p. 171.

Cephalobium nitidum P. Artigas. *Rhabditidae*. Intestin. *Gryllotalpa* sp. (Courtillière, Orthopt.). Brésil : Angra dos Reis (Etat de Rio) et Remedios (Etat de São Paulo). *Boletim biol.*, fasc. 16, 1929, p. 81.

M. LANGERON.

Odontogeton C. Allgen. *Oxyuridæ*. Espèce type : *O. phacochoeri*. Göteborgs Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhälles Handlingar. Fjärde Földjen, XXIX, 1925, p. 35.

Odontogeton phacochoeri C. Allgen. *Oxyuridæ*. Cryptes entre les racines et la couronne des défenses. *Phacochærus æthiopicus* L. (*Suidæ*). Göteborgs Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhälles Handlingar. Fjärde Földjen, XXIX, 1925, p. 36.

Numidica monodi Baylis. *Heterakidæ-Subulurinae*. Cæca. *Numida meleagris galeata* Pallas (Galliformes). Bamako-sur-Niger. *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2), II, 1930, p. 119.

Gendria Baylis. *Quimperiidæ*. (nov. fam.). Espèce type : *G. tilapiae*. *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2), II, 1930, p. 125.

Gendria tilapiae Baylis. *Quimperiidæ* (nov. fam.). Tube digestif. *Tilapia galilæa* L. (Poiss., *Cichlidæ*). Entre le lac Debo et Bamako-sur-Niger. *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2), II, 1930, p. 122.

Thelandros sahariensis Baylis. *Oxyuridæ*. Intestin. *Uromastix acanthinurus* Bell. (Rept. *Agamidæ*). Hoggar (Sahara). *Bull. Mus. hist. nat. Paris*, (2), II, 1930, p. 126.

Philometra bergensis G. Wülker. *Philometridæ*. Cavité générale. *Molva byrkelange* Walbaum (Poiss., *Gadidæ*). Norvège. *Zool. Anz.*, LXXXVII, 1930, p. 293.

Cosmocephalus imperialis K. Morishita. *Acuaridæ*. Estomac antérieur. *Uria troile californica* (Bryant) (Charadriiformes, *Alcidæ*). Sud de Sakhaline. Jardin zool. de Tokyo. *Japan. journ. zool.*, III, 1930, p. 67.

Spinitectus carolini F. J. Holl. *Thelaziidæ*. Intestin. *Eupomotis gibbosus* (L.) (*Centrarchidæ*, Poiss.) et *Chænobryllus gulosus* (Cuv. et Val.); *Triturus viridescens* Rafinesque (Batr. *Salamandridæ*). Durham, Caroline du Nord. *Journ. Elisha Mitchell scient. soc.*, XLIII, 1928, p. 184.

Cosmocerca dukae F.-J. Holl. *Oxyuridæ*. Colon et intestin. *Triturus viridescens* Rafinesque. (Batr. *Salamandridæ*). Durham, Caroline du Nord. *Journ. Elisha Mitchell scient. soc.*, XLIII, 1928, p. 185.

Ophidascaaris arndti Curt Sprehn. *Ascarididæ*. Tube digestif. *Lachesis lanceolatus* Lacépède (Rept.). Aquarium à Berlin (origine Amérique du Sud). *Zool. Anz.*, LXXXIII, 1929, p. 280.

Pharyngonema U. Pierantoni. *Cephalonemidæ*. Espèce type : *P. mekongianus*. *Boll. Mus. zool. ed anat. comp. R. Univ. Torino*, n. s., XXVIII, 1923, p. 2.

Pharyngonema mekongianus U. Pierantoni. *Cephalonemidæ*. Cavité célo-mique. *Megascolex mekongianus* Cognetti (Oligochète). Ban Leum sur le Mékong (Annam). *Boll. Mus. zool. ed anat. comp. R. Univ. Torino*, n. s., XXVIII, 1923, p. 3.

Protospirura suslica R. Ed. Schulz. *Spiruridæ*. Estomac. *Citellus musicus planicola* Satun (Rongeur). Chakhty (région du Don). *Œuvres Inst. d'Etal méd. vétér. expér.*, IV, 1927, p. 35.

Œsophagostoma brevicaudum B. Schwartz et J. E. Alicata (1). *Strongylidæ*

(1) « *brevicaudum* » est vraisemblablement un lapsus, pour *brevicauda* ou *brevicaudatum*. R.-Ph. D.

Gros intestin. *Sus scrofa domestica*. Moultrie (Géorgie, Etats-Unis). *Journ. agric. res.*, XL, 1930, p. 517.

Cesphagostoma georgianum B. Schwartz et J. E. Alicata. *Strongylidæ*. Gros intestin. *Sus scrofa domestica*. Moultrie (Géorgie, Etats-Unis). *Journ. agric. res.*, XL, 1930, p. 520.

Physcephalus ellobii R. Ed. Schulz. *Spiruridæ*, Estomac. *Ellobius talpinus* Pall (Rongeur). Nord du Caucase. *Œuvres Inst. d'Etat méd. vétér. expér.*, IV, 1927, p. 42.

Gongylonema longispiculum longispiculum R. Ed. Schulz. *Spiruridæ*. Œsophage. *Citellus musicus planicola* Satun. (Rongeur). Région du Don, rive droite; Chakhti. *Œuvres Inst. d'Etat méd. vétér. expér.*, IV, 1927, p. 49.

Gongylonema longispiculum spalacis R. Ed. Schulz. *Spiruridæ*. Sous la muqueuse de l'estomac. *Spalax microphthalmus* Gild. (Rongeur). Région du Don, côté nord de la mer d'Azov. *Œuvres Inst. d'Etat méd. vétér. expér.*, IV, 1927, p. 51.

Contracecum bodenheimeri G. Witenberg. *Ascarididæ*. Intestin. *Puffinus kuhli* Bail. (Procellariiformes). Suez. *Ergebn. Sinai-Expedition 1927 der hebr. Univ. Jerusalem. Bodenheimer et Theodor, Leipzig*. Teil IV, 1929, p. 122.

Neoplectana G. Steiner. *Oxyuridæ*. Espèce type : *N. glaseri*. *Journ. Washington Acad. sc.*, XIX, 1929, p. 436.

Neoplectana glaseri G. Steiner. *Oxyuridæ*. Cavité générale. Larve de *Popillia japonica* Newm. (Insecte). Moorestown N. J. (U. S. A.). *Journ. Washington Acad. sc.*, XIX, 1929, p. 437.

Soboliphyme A. M. Petrov. *Soboliphymidæ* (nov. fam. *Diocetophymata*). Espèce type : *S. baturini*. *Zool. Anz.*, LXXXVI, 1930, p. 270.

Soboliphyme baturini A. M. Petrov. *Soboliphymidæ* (nov. fam.). Estomac et muqueuse de l'intestin, *Martes zibellina* L. (*Mustelidæ*), région d'Assatscha (Kamtschatka); estomac de *Vulpes vulpes* L. *beringiana* Midd. (Canidés), région de Lopatka (Kamtschatka); paroi stomacale de *Felis calus domestica* L. (Félidés), région de Sudschenka (Sibérie). *Zool. Anz.*, LXXXVI, 1930, p. 266.

Setaria tundra Isaitshikov et Rajewsky. *Filariidæ*. Cavité abdominale. *Rangifer tarandus* (Renne). Ile Mudjug (Gouv. d'Arkhangelsk). *Ztschr. für Infektionskrankh. der Haustiere*, XXXV, 1929, p. 42.

Setaria altaica Rajewsky. *Filariidæ*. Cavité abdominale. *Cervus canadensis asiaticus*. Altaï (Sibérie occidentale). *Ztschr. für Infektionskrankh. der Haustiere*, XXXV, 1929, p. 47.

Rictularia amurensis R. Ed. Schulz. *Rictulariidæ*. Cavité du corps (?). Souris (indéterm.). Village Troïtskoïe sur Toumel, Région Primorskaïa (Russie). *Œuvres Inst. d'Etat méd. vétér. expér.*, IV, 1927, p. 56.

Rictularia caucasica R. Ed. Schulz. *Rictulariidæ*. Localisation inconnue. *Gerbillus meridianus* Pallas (Rongeur). District de Kizlar (nord du Caucase). *Œuvres Inst. d'Etat méd. vétér. expér.*, IV, 1927, p. 58.

Arduenna kutassi R. Ed. Schulz. *Spiruridæ*. Epaisseur de la muqueuse de l'estomac, lumière de l'estomac et plus rarement de l'intestin grêle et (?)

foie. *Citellus musicus planicola* Satun., *Citellus* sp., *Marmota bobac* Schreb., *Spermophilopsis leptodactylus leptodactylus* Licht., *Spermophilopsis leptodactylus schumakovi* Satun. (Rongeurs). Région du Don; Gouv. de Cherson; Asie centrale. *Œuvres Inst. d'Etat méd. vétér. expér.*, IV, 1927, p. 39.

Tylenchinema T. Goodey. *Tylenchidæ*. Espèce type : *T. oscinellæ*. Phil. Trans. Roy. Soc. London, B, CCXVIII, 1930, p. 338.

Tylenchinema oscinellæ T. Goodey. *Tylenchidæ*. Femelles vivipares et jeunes larves dans la cavité du corps des mâles et femelles adultes d'*Oscinella frit* L. (Dipt.); jeunes femelles dans la cavité générale des pupes du même hôte; larves dans leur gaine, jeunes mâles et jeunes femelles dans les débris au voisinage de l'hôte (non parasites, à l'intérieur de la tige ou du panicule de l'avoine parasitée par le diptère). Angleterre et Pays de Galles. Phil. Trans. Roy. Soc. London, B, CCXVIII, 1930, p. 315.

R.-Ph. DOLLFUS.

Acanthocéphales

Echinorhynchus myoxi Galli-Valerio. *Echinorhynchidæ*. Intestin. *Myoxus quercinus* (Lérot, Rongeur). Corbeyrier, Vaud, Suisse. *Ztrbl. für Bakt., Orig.*, CXII, 1929, p. 58.

M. LANGERON.

Hirudinées

Hemiclepsis cancricola Oka. *Glossosiphonidæ*. Cavité branchiale *Potamon* sp. (Crustacé décapode brachyure d'eau douce) Chine : Pan-Chi, Feng-Hua, province de Che-Chiang. *Proc. Imp. Acad. sc. Tokyo*, IV, 1926, p. 607.

Herpobdella formosana Oka. *Herpobdellidæ*. Tainan (Formose méridionale). *Proc. Imp. Acad. sc. Tokyo*, V, 1929, p. 277.

Hirudo taivana Oka. *Hirudinidæ*. Tainan (Formose méridionale). *Proc. Imp. Acad. sc. Tokyo*, IV, 1928, p. 122.

Whitmania quinquelineata Oka. *Hirudinidæ*, Tainan (Formose méridionale). *Proc. Imp. Acad. sc. Tokyo*, IV, 1928, p. 169.

Whitmania interrupta Oka. *Hirudinidæ*. Tainan (Formose méridionale). *Proc. Imp. Acad. sc. Tokyo*, IV, 1928, p. 170.

Placobdella ornata Oka. *Glossosiphonidæ*. Sur une crevette d'eau douce. Tainan (Formose méridionale). *Proc. Imp. Acad. sc. Tokyo*, V, 1929, p. 249.

R.-Ph. DOLLFUS.

Glossiphonia cruciata Bhatia. *Glossiphonidæ*. Vivier à truites. Achha Bal, Kashmir. *Ann. de parasitologie*, VIII, 1930, p. 344.

M. LANGERON.

Crustacés

Lernaeopoda bivia Leigh-Sharpe. Copépode. *Scyllium bivium*. Angleterre. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 140-142.

H. GALLIARD.

Lernaea (Lernaeocera) barbicola H. Leigh-Sharpe. Copépode. *Barbus* sp. Transvaal. *Parasitology*, XXII, 1930, p. 334.

M. LANGERON.

Eudactylina corrugata Ruby Bere. *Dichelestiidæ* (Copépode). Branchies. *Raia erinaceus* Mitchell, *R. scabrata* S. Garman (Poiss.). Région de Passamaquoddy (Canada). *Contrib. canadian biol. and fisheries*, n. s., V, 1930, p. 426.

Aplostoma sycozoæ Mario Salfi. *Ascidicolidæ*. (Copépode). Cavité de la tunique. *Sycozoa patagonica* Salfi (ascidie composée). Patagonie. *Ann. Mus. zool. R. Univ. Napoli*, n. s., V, 1926, p. 1.

Sarcotaces pacificus Taku Komai. Copépode *incertæ sedis*. Femelle dans des kystes sous-dermiques. *Antennarius* sp. (Poiss. téléostéens *pediculati*). Misaki (Japon). *Mem. College sc. Kyoto Imp. Univ.*, B, I, 1924, p. 265.

Caligus pageti F. S. Russel (1). *Caligidæ*. (Copépode). Surface du corps, *Mugil capito* Cuv. (*Mugilidæ*, Poiss.). Lac Maryût près Alexandrie (Egypte). *Ann. Mag. nat. hist.* (9), XV, 1925, p. 611.

Briarosaccus H. Boschma. *Rhizocéphales*, *Pellogastridæ*. Espèce type : *B. callosus*. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVI, 1930, art. 7, p. 1.

Briarosaccus callosus H. Boschma. *Pellogastridæ* (*Rhizocéphales*). En partie à la surface du corps. *Lithodes agassizi* Smith (Crust. anomoure). Au large des côtes de Floride et de la Caroline du nord *Proc. U. S. national Mus.*, LXXVI, art. 7, 1930, p. 2.

R.-Ph. DOLLFUS.

ERRATUM

P. 140, ligne 3 de la note 4, au lieu de formes métacydiques, lire : formes métacycliques.

P. 189, ligne 18, au lieu de : *Hormodendron fontoyonti*, lire : *Hormodendron fontoyonnti*.

P. 518, ligne 6 à partir du bas de la page, au lieu de *Trichrophyton album*, lire : *Trichophyton album*.

(1) *Caligus pageti* F. S. Russel représente seulement pour nous une des nombreuses sous-espèces ou formes géographiques du *Caligus curtus* O. F. M. = *C. americanus* Pickering et Dana = *C. diaphanus* Baird = *C. elegans* Van Beneden, etc... Le polymorphisme de *C. curtus* O. F. M. est très accentué, sa taille est très variable. R.-Ph. D.