ANNALES DE PARASITOLOGIE

HUMAINE ET COMPARÉE

TOME X

1^{er} JUILLET 1932

N° 4

MÉMOIRES ORIGINAUX

ANNALES
DE
PARASITOLOGIE

LOCALISATIONS DU *TRYPANOSOMA THEILERI* DANS LES ORGANES INTERNES DES BOVINS. SON CYCLE ÉVOLUTIF

Par M. CARPANO (1)

HISTORIQUE ET GÉNÉRALITÉS. — Le *Trypanosoma theileri* a été vu pour la première fois par Theiler en 1902 et a été décrit la même année par Laveran et par Bruce. A ce moment, Theiler le considérait comme l'agent d'une maladie spéciale du bétail, très fréquente en Afrique du Sud et nommée galzietke, gall-sickness, fièvre biliaire ; mais d'autres recherches, effectuées la même année par Theiler, lui permirent de l'attribuer à un autre hématozoaire l'*Anaplasma marginale*.

Depuis cette époque, le *T. theileri* a été retrouvé un peu partout. Sa distribution géographique est donc très vaste et quasi-mondiale. Theiler le retrouve dans la province d'Orange et chez un bœuf originaire de Madagascar ; Schilling, en 1903, chez un bœuf du Togo ; Durante et Holmes, en 1904, et un peu plus tard, en 1909, Valladores et Pease chez des bœufs de l'Inde. Lingard, en 1904, puis en 1906 et 1907, l'observe encore chez des bœufs de l'Inde, et le décrit sous les noms de *T. himalayanum*, *T. indicum*, *T. muktesari*. Lühs, en 1906, le retrouve chez des bœufs de Transcaucasie ; Schein, en 1907, chez un bœuf d'Indo-Chine ; Montgomery et Kinghor, en

(1) Traduit de l'italien par le Docteur Maurice Langeron.

1908-1909, chez un bœuf de Rhodésie et une vache de l'Ile-du-Prince ; Heanley, en 1908, chez un bœuf de Hong-Kong, atteint de diverses maladies ; Crawley, en 1909, chez des bœufs américains, d'où le nom de *T. americanum* donné par cet auteur ; Browhill, en 1909, chez un bovin du Canada, atteint de piroplasmose et plus tard, en 1912, chez une vache d'Hadwen, ce qui l'amène à la décrire sous le nom de *T. ruthenfordi* ; Frank, en 1909, chez un bovin de Wiesbaden, forme décrite par Frosch sous le nom de *T. franki* ; Stockman, en 1910, chez des bovins reproducteurs envoyés en Afrique du Sud et qui auraient subi des inoculations préventives contre la piroplasmose ; Schmitt, en 1910, chez une vache inoculée avec le sang de deux bovins de Poméranie, atteints de piroplasmose ; Peter, en 1910, chez divers bovins de l'Uruguay, et sur un bovin argentin ; Carpano, en 1913, chez des bovins de l'Erythrée et d'Abysinie et particulièrement chez les sujets atteints de peste bovine ; Yakimoff et Schokhor, en 1916, dans le foie d'un bœuf du Turkestan russe ; Croveri, en 1920, chez des bovins de la Somalie italienne, forme pour laquelle il crée la variété *somaliensis* ; Diaz et Zuccarini, en 1924, chez des bovins de la République Argentine ; Carpano, en 1924, chez deux bovins de la campagne romaine, qui présentaient des signes cliniques attribuables à la piroplasmose, et chez des bœufs d'Egypte, en 1930, etc.

Des trypanosomes du même type ont été rencontrés chez d'autres ruminants ; par exemple, par Todd et Toley, chez une antilope du Kasogo ; par Kleine, chez deux antilopes du Tanganyka ; par Rodhain, Pons, Van den Branden et Bequaert, chez de petites antilopes du Katanga ; par Sowerby, chez des buffles de l'Inde ; par Krublewsky, chez des bisons lithuaniens, en Amérique (*T. krublewskii*) ; par Hanghvocet et Youngberg, chez un buffle des Philippines, etc.

En plus de ces trouvailles, faites à l'examen microscopique du sang circulant, on a encore rencontré des formes trypanosomes du type *theileri* dans les hémocultures de sang de bovins, faites sur divers milieux, généralement en partant d'animaux en apparence sains, chez lesquels l'examen bactériologique n'avait pas révélé l'existence de parasites de cette nature.

Ce genre de recherches a été entrepris surtout par : Miyajima au Japon (1907) ; Martini aux Philippines (1909) ; Crawley en Amérique (1909) ; Kunth, Rauchbaar et Morgenstein en Allemagne (1910) ; Kunth en Allemagne, Danemark et Suède (1910) ; Sergent en Algérie (1911) ; Delanoë à l'Ecole d'Alfort (1911) ; Yakimoff en Tunisie, Carini à São-Paulo (Brésil), Cardamatis en Grèce, Swellengrebel en

Hollande, etc. Nous aussi, en Erythrée, avons réussi à cultiver ce trypanosome à partir du sang de bovins infectés. Les résultats obtenus, surtout en ce qui concerne les caractères morphologiques nouveaux acquis par ce parasite, ont été publiés en détail (1913).

D'après les recherches de Theiler, la transmission naturelle de ce parasite paraît se faire par l'intermédiaire d'*Hippobosca rufipes* et *H. maculata*. Toutefois Nöller (1916) croit qu'en Allemagne, où les hippobosques sont rares, les hôtes intermédiaires sont des tabanides, parce que chez ces derniers on trouve assez fréquemment des flagellés à formes *Crithidia* qui prennent en culture un aspect identique à celui que donne la culture de *T. theileri*. Trautmann (1922) partage la même opinion ; il affirme que *Tabanus glaucopis* peut être l'agent transmetteur.

Récemment (1925), Nöller ne croit plus au rôle transmetteur des hippobosques. Il a essayé, et il semble avec succès, de transmettre à des bovins des formes *Crithidia*, considérées comme appartenant au *T. theileri*, isolées en culture de l'*Hæmatopota pluvialis* qui serait le transmetteur.

La transmission expérimentale au moyen du sang parasité ne réussit pas toujours. Dans nos nombreuses recherches à ce sujet, nous n'avons obtenu que quelques cas positifs, dans lesquels *T. theileri* aurait été inoculé avec d'autres hématozoaires (trypanosomes, spirochètes, piroplasmes). Toujours, dans les cas positifs, les trypanosomes ne se sont montrés dans le sang périphérique que très longtemps après l'inoculation.

En ce qui concerne l'action pathogène, les opinions sont très discordantes ; la majorité s'accorde pour le considérer comme non pathogène.

Toutefois, Theiler, sur 40 cas d'infection pure, a noté une mortalité de 12 p. 100. Peter, bien que n'ayant pu constater de symptômes morbides sur des bovins infestés expérimentalement, a trouvé à leur autopsie de la tuméfaction de la rate, une altération parenchymateuse du foie, de l'adénite hémorragique, des pétéchies sur l'endocarde, etc. Toutes ces lésions étaient assez légères pour ne donner lieu à aucun symptôme pendant la vie des animaux.

Nous avons constaté, chez des bovins infectés de l'Abyssinie et de l'Erythrée, des manifestations morbides importantes, mais nous n'avons pu établir avec précision si elles étaient produites par le *T. theileri*, que ces animaux avaient dans leur sang, ou par d'autres microorganismes avec lesquels il est presque toujours associé. Les deux bœufs de la campagne romaine infestés par ce flagellé à l'état pur ont présenté des signes manifestes de maladie.

RECHERCHES PERSONNELLES. — Les choses en étaient là lorsqu'en décembre dernier, en examinant au microscope des frottis de ganglions lymphatiques de bovins égyptiens et soudanais, frottis que nous faisons systématiquement en vue de rechercher la présence possible de corps plasmatiques de Koch chez ces ruminants, qui montrent souvent dans leur sang des éléments piroplasmiques du type *Gonderia*, nous avons trouvé dans une préparation de petits protozoaires, les uns ayant l'aspect de formes *Leishmania*, les autres ressemblant à des *Grithidia*.

Cette préparation provenait d'un ganglion préscapulaire fortement hypertrophié, ayant présenté à la coupe un piqueté hémorragique. Ce ganglion avait été prélevé sur un veau égyptien d'environ un an, pendant l'examen *post-mortem* à l'abattoir public du Caire. Comme l'étude a été faite longtemps après, nous n'avons pu avoir d'autres renseignements ni entreprendre d'autres recherches microscopiques.

Toutefois, ces quelques éléments parasitaires provenaient certainement d'une localisation interne d'un flagellé ; ils nous rappelaient des formes analogues rencontrées par nous environ 28 ans auparavant dans l'encéphale d'un bovin de race abyssine et gravement malade, dont à cette époque ont parlé brièvement Menuno, Martaglio et Adami.

Ce cas a été soumis par nous à un examen minutieux, à la fois clinique, anatomo-pathologique et microscopique, dont nous avons conservé personnellement la relation ainsi que les préparations microscopiques. Il nous semble qu'un résumé sommaire aura beaucoup d'intérêt pour illustrer le présent travail.

Un bœuf d'environ 5 ans qui avait été déjà vacciné contre la peste bovine et qui était destiné à fournir du sérum pour la préparation du sérum antipesteux a présenté, dans les derniers jours de décembre 1903, des symptômes qui ont fait porter le diagnostic d'encéphalite comateuse ou de méningo-encéphalite subaiguë.

Ce bœuf a présenté inopinément et sans symptômes précurseurs particuliers, une somnolence marquée suivie rapidement de stupeur intense avec suppression des mouvements volontaires et de la sensibilité, comme on le constate au deuxième stade de l'encéphalite des animaux domestiques ou comme chez les chevaux atteints d'hydrocéphalie chronique.

L'animal avait le poil piqué, la tête basse, le dos courbé, les membres sous lui et divariqués, les oreilles basses, les paupières fermées et presque contractées comme dans la photophobie. Une excitation provoquait des mouvements incertains et difficiles, sans toutefois

qu'il réussisse à reculer. Les muscles, comme dans la catalepsie, présentaient un certain degré de contracture. On pouvait donner au cou, aux membres et à la queue, une position quelconque et même les plus étranges; ces positions étaient longtemps conservées comme le représente la figure 1. La sensibilité générale était très diminuée, au point de ne pas sentir des piqûres d'aiguille même faites profondément. Il y avait en outre des troubles secondaires intéressant la

FIG. 1. — Bœuf abyssin sur lequel a été fait le diagnostic d'encéphalite comateuse et qui a présenté à l'autopsie un foyer de méningo-encéphalite intéressant particulièrement le lobe frontal droit et déterminé par la localisation du *Trypanosoma theileri*. A remarquer la contraction quasi-permanente des muscles orbiculaires des paupières et la position anormale des membres et de la queue.

nutrition, la respiration et la circulation : anorexie complète, diminution de la rumination, retard de la défécation, poulx faible, respiration ralentie et profonde.

La température, à part quelques élévations fugaces, est restée d'abord normale, puis a fait place à de l'hypothermie. La ponction lombaire, pratiquée pendant la vie, a fourni un liquide rougeâtre, demi-transparent, dans lequel on n'a pas trouvé de formes parasitaires. L'examen microscopique du sang circulant a été également négatif.

L'animal s'est amaigri sensiblement et est mort au 10^e jour dans le coma.

A l'autopsie, pratiquée immédiatement après la mort, presque tous les tissus présentaient une teinte ictérique ; les ganglions, surtout les ganglions sous-cutanés étaient tuméfiés ; il y avait de la congestion hépatique, de la congestion pulmonaire hypostatique, de l'épanchement intra-péricardique séro-hémorragique et par-dessus tout un important foyer de méningo-encéphalite, intéressant particulièrement le lobe frontal droit. A ce niveau, on notait aussi une hépérémie intense et un épaississement de la dure-mère ; la pie-mère et l'arachnoïde étaient fortement injectées et adhérentes à la substance cérébrale. Dans les enveloppes, il y avait une grande quantité de liquide séreux, jaunâtre, relativement limpide (hydrocéphalie externe).

Le tissu cérébral de cette région était très infiltré, de couleur jaunâtre et présentait au centre un foyer de ramollissement du volume d'une noix, extrêmement friable, de couleur rouge intense, entouré d'hémorragies interstitielles punctiformes (ramollissement cérébral rouge). Le matériel prélevé au centre de la lésion a montré, à l'examen microscopique, des cellules et des fibres nerveuses en grande partie dégénérées, des capillaires et des éléments vasculaires, des hématies et des leucocytes, des granulations graisseuses et de nombreux éléments appartenant à des protozoaires. Quelques-uns de ces derniers examinés à l'état frais, paraissaient immobiles, tandis que d'autres présentaient de légers mouvements d'apparence amiboïde ; d'autres étaient animés de mouvements pendulaires ou rotatoires ; d'autres, enfin, se déplaçaient avec un rapide mouvement ondulatoire.

Dans les préparations colorées, ces protozoaires présentaient une morphologie très variée, correspondant parfaitement à celle des protozoaires observés dans les ganglions lymphatiques du bovin égyptien. Nous allons en donner une description détaillée.

1. Morphologie des principales formes protozoaires observées dans les organes internes des bovins (cerveau et ganglions lymphatiques). — Les divers éléments parasitaires, trouvés en particulier dans le foyer encéphalique, peuvent être distingués suivant divers types principaux que nous allons décrire et qui sont toutefois reliés par des formes intermédiaires.

1. *A. Formes Leishmania* (Pl. VIII, fig. 1 et 2). Ce sont les plus petites des formes que nous ayons observées ; leurs dimensions ne dépassent pas celles des hématies des bovins, soit 5-6 μ . Leur forme est ovale ou elliptique, à contour plutôt régulier et rappelle exactement les grands éléments du genre *Leishmania*,

Ils sont constitués par une masse arrondie de protoplasma, entourée d'un périplaste net et renfermant un volumineux noyau d'environ $2\ \mu$ de diamètre, arrondi, ovalaire, allongé ou falciforme, central ou périphérique et se colorant en rouge rubis clair par le Romanowsky et les procédés dérivés. Il y a, en outre, un blépharoplaste très net, arrondi, mesurant environ $1\ \mu$ de diamètre, placé près du noyau, tout contre le bord des éléments parasitaires et se colorant en violet foncé. Le protoplasma est souvent un peu raréfié autour du noyau et du blépharoplaste, au point de donner l'impression que ces éléments sont entourés d'une vacuole. En outre, il peut renfermer de fines granulations chromatoïdes.

Dans quelques rares éléments et dans des préparations bien colorées, on peut voir également un rhizoplaste délicat qui part du blépharoplaste et se perd dans le protoplasme sous la forme d'une longue virgule.

Dans les frottis, on voit souvent les formes *Leishmania* par groupes de 2 à 8 éléments ou même plus nombreux, ce qui porte à croire à une origine intracellulaire. Toutefois, nous ne pouvons l'affirmer, car nous n'avons pas eu l'occasion d'observer ces parasites dans des coupes. Nous avons eu, mais très rarement, l'occasion de rencontrer des formes analogues dans nos essais de culture du sang d'animaux porteurs de *T. theileri*.

B. Formes Plasmodium (Pl. VIII, fig. 3 et 4). — Ces éléments sont arrondis ou irrégulièrement polygonaux ; ils peuvent atteindre d'assez grandes dimensions et même dépasser $15\ \mu$ de diamètre. Ils sont formés d'une masse protoplasmique à bords souvent mal définis, d'épaisseur irrégulière et contenant fréquemment des vacuoles et des granulations protoplasmiques.

Le système nucléaire est formé d'un gros noyau et d'un blépharoplaste, présentant les caractères décrits plus haut. Ce noyau peut être unique ou plus souvent multiple. Dans ce dernier cas, on peut trouver jusqu'à 8 noyaux et un nombre à peu près égal de blépharoplastes diversement disposés et quelquefois en voie de division.

C. Formes flagellées et Leptomonas (Pl. IX, fig. 10). Ces formes, généralement arrondies, dépassent peu les dimensions des hématies c'est-à-dire 5 à $7\ \mu$. Leur structure rappelle celle des formes précédentes. Le noyau est habituellement central et le blépharoplaste presque toujours marginal. Le protoplasme renferme de fines vacuoles et de petites granulations chromatoïdes. Ce qui distingue ces formes, c'est la présence d'un flagelle plus ou moins développé, qui, partant du blépharoplaste, se contourne à l'intérieur du protozoaire ou s'étend à l'extérieur, complètement libre et plus ou moins ondulé.

Il n'y a presque jamais de membrane ondulante. Nous avons rencontré des éléments de cette catégorie dans nos cultures de sang d'animaux porteurs de *T. theileri*.

D. *Formes Crithidia* (Pl. IX, fig. 7 et 8). — Ces éléments sont en forme de fuseau plus ou moins allongé et leurs dimensions sont très variables, de 10 à 40 μ , y compris le flagelle. Ils sont formés d'une masse protoplasmique bien définie, de structure non uniforme, présentant des vacuoles plus ou moins volumineuses, généralement arrondies, et des granules de protoplasme condensé.

Le noyau, bien défini, généralement arrondi, mesure de 2 à 3 μ de diamètre ; il se colore en rouge clair et est formé d'un réseau qui renferme dans ses mailles des granulations de chromatine dense. Il occupe une position centrale à environ 2/5 de l'extrémité postérieure du parasite.

Le blépharoplaste arrondi, nettement circonscrit, mesure environ 1 μ de diamètre ; sa position est marginale et au voisinage du noyau. De ce blépharoplaste part un filament chromatique qui borde une membrane ondulante, généralement peu développée, et se termine par une extrémité libre formant flagelle. Ce dernier est de longueur très variable et peut, dans certains cas, atteindre et même dépasser celle du corps parasitaire entier.

L'extrémité postérieure, opposée au flagelle, est habituellement effilée et se termine presque toujours en pointe aiguë.

Les formes *Crithidia*, observées par nous dans les organes internes, correspondent exactement à celles que nous avons trouvées dans le sang circulant des bovins infestés par *T. theileri* et à celles que nous avons obtenues par la culture de ce sang.

E. *Formes Trypanosoma* (Pl. IX, fig. 12 et 13). — Ces formes ressemblent aux *Crithidia* que nous venons de décrire, mais elles en diffèrent parce qu'elles sont plus grêles, plus allongées et peuvent atteindre 50-60 μ de longueur ; mais surtout parce que le blépharoplaste est éloigné du noyau et se trouve reporté vers le quart postérieur du parasite. La membrane ondulante, bordée par le filament chromatique est, par conséquent, plus développée, au moins dans le sens de la longueur relative. Le protoplasma est épais, vacuolaire et contient aussi des granulations chromatiques.

Entre les formes trypanosomes et les formes *Crithidia*, il y a souvent des formes de passage, ce qui démontre clairement la transformation de la première en la seconde. La forme trypanosome, très rare dans les organes internes, correspond morphologiquement aux éléments semblables qu'on trouve dans le sang circulant des bovins infectés par *T. theileri*.

De l'ensemble de nos recherches morphologiques, il résulte que les diverses formes rencontrées dans les organes internes de deux bovins et que nous avons décrites séparément pour la commodité de l'étude, ne sont autre chose que les stades successifs d'un même protozoaire, le *Trypanosoma theileri*, parce qu'elles sont morphologiquement identiques aux éléments parasitaires qu'on trouve dans le sang circulant des bovins porteurs de ce trypanosome et aux formes obtenues par la culture du sang de ces animaux (fig. 10-13).

2. Formes flagellées observées chez des Ixodes et rapportées au *Trypanosoma theileri* des bovins. — Nous venons d'établir que *T. theileri* accomplit une partie importante de son cycle évolutif dans les organes internes des bovins infectés et que, dans le sang de ces derniers, on rencontre habituellement des éléments adultes, destinés vraisemblablement à la conservation de l'espèce. Il reste à déterminer quel est l'agent intermédiaire ou vecteur capable d'assurer la transmission à d'autres bovins. Cet agent doit être recherché parmi les invertébrés hématophages.

Theiler a formulé une hypothèse suivant laquelle cette transmission est effectuée normalement par *Hippobosca rufipes* et *H. maculata*. Mais cette hypothèse n'a pas été confirmée et Nöller ne l'accepte pas. Ce dernier, comme nous l'avons dit plus haut, accuse les tabanides. Il a trouvé chez une espèce, *Haematopota pluvialis*, des flagellés du type *Crithidia* qu'il a cultivés. En inoculant ces cultures à des veaux, il semble qu'il a reproduit, chez ces animaux, des formes flagellées présentant les caractères du *T. theileri*.

Sans nier l'importance des recherches de Nöller, qui, si elles étaient confirmées, surtout en ce qui concerne la véritable nature du flagellé inoculé et reproduit chez des bovins, constitueraient une importante contribution au problème de la transmission de ce parasite, nous devons attirer l'attention sur les intéressantes observations d'O'Farrell, dont l'importance nous paraît considérable. Elles sont intimement liées à nos recherches sur la localisation de *T. theileri* dans les organes internes des bovins et nous avons eu l'occasion de les confirmer jusqu'à un certain point.

Cet auteur a constaté, en 1913, dans le liquide cœlomique de certains *Hyalomma aegyptium*, récoltés sur des bestiaux du Soudan anglo-égyptien, espèce d'ailleurs répandue sur tous les continents, de même que *T. theileri*, la présence d'un flagellé particulier, auquel il a donné le nom de *Crithidia hyalommae*.

A cette époque, il ne pensait pas que ce parasite puisse correspondre à un stade du cycle évolutif des trypanosomes des bestiaux parce que seulement un petit nombre des ixodes capturés sur le

même bovin étaient infectés et parce que ces bovins ne paraissaient pas malades. Pour ce motif, il pensait que ce flagellé était un parasite particulier à la tique. Par conséquent, il pensait que la transmission de tique à tique se faisait par l'œuf : cette hypothèse paraissait confirmée par l'examen des frottis faits avec les organes reproducteurs de l'ixode.

En 1914, en recherchant en Lybie les ectoparasites transmetteurs de *Theileria annulata* chez les bovins et en étudiant particulièrement ce même ixode, *Hyalomma ægyptium*, j'ai rencontré aussi, dans un exemplaire, parmi une vingtaine d'individus examinés, des formes trypanosomes voisines de celles qui ont été trouvées par O'Farrell chez le même invertébré (Pl. VIII, fig. 6).

Nos recherches morphologiques actuelles sur la localisation de *T. theileri* dans les organes internes des bovins, nous ont remémoré l'identité morphologique du *Crithidia hyalommxæ* d'O'Farrell et des formes que nous avons observées chez *Hyalomma ægyptium* et nous ont amené à considérer cet ectoparasite comme l'agent transmetteur du *T. theileri*, dont la forme flagellée, observée par O'Farrell, n'est qu'un stade du cycle évolutif.

En outre, en écrivant, en 1915, au sujet de la transmission de *Theileria annulata* par *Hyalomma ægyptium*, nous admettions le passage du piroplasma par les œufs de cette tique, étant donné qu'elle ne se fixe qu'une seule fois sur le bœuf à l'état adulte. Autrement, il faudrait admettre que la même infection par ce *Theileria* existe aussi chez les petits mammifères sauvages, sur lesquels cet ixode se fixe à l'état de larve et de nymphe ; mais c'est une hypothèse qui n'a pas été démontrée et qui, d'ailleurs, semble peu probable.

Il doit en être de même pour la transmission de *T. theileri*. Les recherches d'O'Farrell s'accordent parfaitement avec ma manière de voir. Il a très bien observé que *Crithidia hyalommxæ* traverse l'oviducte, pénètre dans l'œuf de l'ixode, faisant passer ainsi l'infection aux descendants et leur donnant le pouvoir de la transmettre.

3. Cycle évolutif du *Trypanosoma theileri* (fig. 2). — Les localisations que nous avons relevées dans les organes internes des bovins parasités par *T. theileri* ; l'étude de ce flagellé dans le sang des animaux naturellement ou expérimentalement infectés et dans les cultures faites avec ce sang ; les recherches d'O'Farrell et les nôtres sur les formes flagellées (*Crithidia hyalommxæ*) trouvées chez *Hyalomma ægyptium* ; enfin les connaissances générales que l'on possède sur la biologie des trypanosomidés, nous permettent de reconstruire, dans ses grandes lignes, le cycle évolutif du *Trypanosoma theileri* qui se déroule dans l'ordre suivant.

Hyalomma aegyptium, sans exclure d'autres ectoparasites, doit transmettre directement par sa piqure, ou indirectement par ses

FIG. 2. — Cycle évolutif du *Trypanosoma theileri* comprenant les formes du sang périphérique et des organes internes des bovins, celles du liquide célomique d'*Hyalomma aegyptium* et celles des cultures obtenues avec le sang des bovins infectés.

A. Formes très mobiles, pouvant exister dans le sang périphérique des bovins infectés :

1. Forme classique du *Trypanosoma theileri*.
2. Forme *Crithidia* (forme jeune) occasionnelle.
3. Forme *Crithidia* en voie de division (rare).
4. Forme en voie de désintégration (rare).

B. Formes mobiles, semi-mobiles ou fixes, existant dans les organes internes des bovins infectés, dans le liquide célomique d'*Hyalomma aegyptium* et dans les cultures faites avec le sang des bovins infectés :

5. Formes *Crithidia* en voie de division.
- 6, 7, 8. Formes *Plasmodium* en voie de division binaire répétée.
- 9, 10. Formes *Leishmania*.
11. Forme *Leishmania* avec rhizoplaste.
12. Forme *Leptomonas*.
- 13, 14. Formes de passage au type *Crithidia*.
- 15, 17. Formes *Crithidia* classiques.
16. Forme *Crithidia* en voie de division binaire.
18. Forme *Trypanosoma*.

déjections, comme il arrive pour d'autres trypanosomes, le flagellé dont il a hérité de la génération précédente, et qui, passé dans la

circulation, ne s'y arrête pas et ne se reproduit pas, mais va se fixer dans certains organes internes. Parmi ceux-ci, nous connaissons actuellement avec certitude le système nerveux central (encéphale) et les ganglions lymphatiques, sans exclure la possibilité de l'invasion des muscles lisses et striés et d'autres organes, comme le corps thyroïde, le testicule, les capsules surrénales, les reins, le foie, etc.

Tout cela correspond parfaitement avec les résultats que nous avons obtenus dans les inoculations expérimentales faites avec du sang très parasité ; en effet, nous n'avons pas observé une multiplication rapide dans le sang, comme il arrive généralement pour les trypanosomes sanguinoles.

Au contraire, les flagellés arrivés dans les organes internes changent graduellement de forme, de manière à s'adapter au nouveau milieu. De mobiles, ils deviennent semi-mobiles (formes *Crithidia* et *Leptomonas*) ou fixes (formes *Plasmodium* et *Leishmania*) en perdant peu à peu leurs organes locomoteurs (membrane ondulante et flagelle).

Le processus de reproduction des formes semi-mobiles et fixes ne tardent pas à commencer. Les *Crithidia* et les *Leptomonas* se reproduisent par division binaire et donnent de nouveaux éléments rappelant plus ou moins les formes originales. Les éléments plasmodioïdes se multiplient aussi par division binaire ; mais, si la séparation des nouveaux éléments ne se fait pas de suite, ce mode peut simuler la division multiple des plasmodiés. De ces éléments dérivent de petites formes plasmodioïdes plus ou moins régulières, qui peuvent prendre l'aspect de *Leishmania*.

Les éléments que nous avons désignés sous le nom de fixes restent presque toujours dépourvus de flagelle et de membrane ondulante. Cependant, il est possible, lorsque le milieu permet des mouvements (espaces lymphatiques, lacunes intercellulaires, etc.), que ces éléments puissent graduellement récupérer leurs organes locomoteurs.

Les modifications qui se produisent dans les organes internes peuvent causer un polymorphisme très marqué, par suite de la nature très diverse du milieu. Les protozoaires qui s'y reproduisent augmentent de nombre et donnent lieu à des altérations locales particulières ; celles-ci, suivant leur extension et suivant l'importance des tissus atteints, peuvent déterminer des manifestations cliniques plus ou moins graves ou simplement des troubles inappréciables, comme on en constate communément dans la pratique, pour ces infections.

Sans doute, les conditions qui affaiblissent l'organisme peuvent augmenter, pour ce protozoaire, la puissance de reproduction et

d'invasion d'autres territoires, comme nous avons pu le constater, par exemple au cours de la peste bovine. L'infection peut rester longtemps latente ; à certains moments, les formes trypanosomes peuvent passer des organes internes dans le sang circulant et y rester plus ou moins longtemps. On y trouve alors des formes de *T. theileri* dont les particularités morphologiques sont bien connues et que nous considérons comme des individus adultes ou mûrs.

Mais on peut encore trouver, dans le sang périphérique, notamment dans les infections graves, d'autres formes, soit *Crithidia*, soit plus rarement *Leptomonas*, que divers auteurs considèrent comme appartenant à d'autres espèces ou à diverses variétés, à cause de leur morphologie et en particulier à cause des dimensions et de la situation du blépharoplaste. Nous considérons ces formes comme des éléments jeunes, parvenus prématurément et fortuitement dans le sang périphérique. On y trouve aussi, mais rarement, des formes trypanosomes en voie de reproduction, dont la localisation habituelle se trouve, comme nous l'avons dit, dans les organes internes.

Nous pensons que les formes trypanosomes parvenues dans le sang circulant peuvent exercer diverses fonctions :

1. La mort de quelques éléments, surtout adultes, et la lyse consécutive des flagellés, comme on peut le voir, quoique rarement, dans les préparations microscopiques de sang parasité.

2. Le retour d'autres éléments, généralement jeunes, dans les organes internes, avec, pour conséquence, la formation de nouveaux foyers de localisation.

3. Le passage chez l'invertébré hématophage avec le sang ingéré par lui.

Le trypanosome, surtout à l'état adulte, passe chez l'hôte qui constitue l'agent transmetteur. Nous pensons, pour les raisons indiquées plus haut, que cet hôte est *Hyalomma aegyptium*. Le trypanosome s'y reproduit dans le liquide cœlomique avec une morphologie presque identique à celle que nous avons observée chez les bovins. Il passe dans l'œuf et détermine ainsi l'infection des descendants, qui, à l'état adulte, transmettront à leur tour ce protozoaire à d'autres bovins.

Par là, *T. theileri* se différencie de la majeure partie des trypanosomes pathogènes de l'homme et des mammifères. Ceux-ci accomplissent leur cycle surtout ou exclusivement dans le sang circulant et sont à cause de cela dénommés sanguicoles. Au contraire, *T. theileri* accomplit la plus grande partie de son évolution dans les organes internes du vertébré. Cette évolution semble se répéter sous une forme très semblable chez l'invertébré, hôte intermédiaire ; elle

se rapproche beaucoup de celle qui a été observée chez un autre flagellé, pour lequel, immédiatement après sa découverte, Chagas a créé un genre spécial : *Schizotrypanum* ; c'est le *Trypanosoma cruzi*, agent de la trypanosomose humaine d'Amérique.

A côté du *Trypanosoma theileri*, qui infecte surtout les bovins, il faut placer le *T. melophagium* des moutons que nous considérons comme appartenant au même type par ses caractères morphologiques et ses propriétés biologiques générales.

Ce protozoaire, observé en 1910 par Woodcock dans le sang d'une brebis anglaise, retrouvé l'année suivante par Behn chez des moutons, en Allemagne, se rapproche beaucoup du flagellé découvert par Pfeiffer, en 1905, chez le mélophage du mouton (*Melophagus ovinus*) et décrit ensuite par Flu, en 1908, sous le nom de *Crithidia melophagia*.

Nöller, en 1917, a réussi à reproduire en culture les mêmes formes trypanosomes, à partir du sang du mouton et du contenu intestinal du mélophage ; aussi Nöller, puis Kleine, en 1919, sont-ils amenés à considérer cet ectoparasite comme l'agent transmetteur. Hoare (1922-1923) trouve les divers stades de développement du *T. melophagium* dans le tube digestif du mélophage ; il démontre que l'infection du mouton a lieu moins par piqure que par ingestion de l'insecte et de ses déjections.

Il est rare de rencontrer *T. melophagium* à l'examen microscopique du sang des moutons infectés mais on le trouve avec une certaine fréquence (jusqu'à 80 p. 100 d'après Hoare) au moyen de la culture. On ne voit pas de formes de division dans le sang périphérique ; il faut donc admettre, comme nous le verrons pour *T. theileri*, que la reproduction a lieu dans les organes internes.

Morphologiquement, le trypanosome des moutons ressemble beaucoup à celui des bovins ; il s'en rapproche aussi par les dimensions car tous deux peuvent atteindre 40 à 70 μ .

Les ovins qui se montrent infectés, soit à l'examen microscopique, soit par la culture du sang, ne présentent en général aucun signe de maladie, aussi ce trypanosome est-il habituellement considéré comme non pathogène.

RÉSUMÉ

1° Le *Trypanosoma theileri*, chez les bovins, outre le sang périphérique dans lequel on le rencontre de temps en temps, est localisé dans les organes internes (cerveau, ganglions lymphatiques, etc...), dans lesquels il détermine des processus inflammatoires de nature

hémorragique. Ceci explique pourquoi il exerce une action pathogène certaine qui est liée à l'importance et au siège de ces processus.

2° Dans ces organes, le flagellé modifie ses fonctions et sa morphologie ; il acquiert un polymorphisme très marqué par suite duquel, à côté des formes hématiques classiques et bien connues, très mobiles, on trouve des formes *Crithidia*, *Leptomonas*, *Leishmania* et *Plasmodium*, peu mobiles ou fixes.

3° La reproduction de ce trypanosome a lieu surtout dans les organes internes. Elle s'effectue par *division binaire simple* dans les éléments mobiles et particulièrement dans les formes *Crithidia*, et par *division binaire répétée*, qui peut simuler une division multiple ou en rosette, chez les éléments fixes comme les formes *Plasmodium*.

4° Les trypanosomes qu'on rencontre dans le sang circulant des bovins infectés, y compris ceux qui sont en voie de reproduction et qu'on voit très rarement, proviennent des organes internes où se passe la partie la plus intéressante du cycle évolutif.

Les formes classiques, bien connues doivent être considérées comme des éléments adultes ou mûrs, destinés à passer chez les invertébrés hématophages transmetteurs, pour la conservation et la diffusion de l'espèce.

Les autres formes, qui ont surtout l'aspect de *Crithidia*, doivent être considérées comme des éléments jeunes qui, surtout dans les infections graves, peuvent passer prématurément dans le sang. Ces éléments ne doivent donc pas être considérés comme appartenant à une autre espèce ou à une variété du même trypanosome.

5° Les diverses formes parasitaires constatées dans les organes internes des bovins infectés, outre qu'elles sont en relation morphologique avec celles que nous avons observées dans les cultures faites avec le sang de ces animaux, concordent parfaitement avec la morphologie du *Crithidia hyalomæ* étudié par O'Farrell et retrouvé par nous dans le liquide coelomique d'*Hyalomma ægyptium*. Cette concordance précise nous permet de considérer cet ixode comme l'hôte et le transmetteur de ce trypanosome.

6. La découverte de la localisation de *T. theileri* dans les organes internes fait mieux connaître la biologie générale de ce protozoaire, auparavant si obscure. Puisque le sang des bovins infectés représente pour ce flagellé plutôt un milieu de passage qu'un milieu définitif, comme c'est le cas pour la majorité des trypanosomes pathogènes, nommés à cause de cela trypanosomes sanguicoles, et puisque les organes internes constituent son siège normal et le plus important, car c'est là qu'a lieu le phénomène de la reproduction, *T. theileri* doit être placé à côté d'un autre flagellé qui est parasite de

l'homme, et se comporte de même, le *Trypanosoma* (*Schizotrypanum*) *cruzi* Chagas 1909.

BIBLIOGRAPHIE

- BEHN. — Infektion eines Kalbes mit Trypanosomen vom Typus des *T. theileri* mittels Blut von Kühen, in denen nur Kulturellflagellaten nachweisbar waren. *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, XXVI, 1910, p. 998.
- Trypanosomen beim Schafe. *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, XXVII, 1911, p. 768.
- BETTENCOURT et BORGES. — Présence de trypanosomes dans le sang des bovidés portugais. *Bull. Soc. path. exot.*, V, 1912, p. 725.
- BRUGE. — Note on discovery of a new trypanosome. *Lancet*, 1902.
- BRUMPT. — *Précis de Parasitologie*, 4^e édition, Paris, 1927.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE VIII

- FIG. 1. — Localisation encéphalique du *Trypanosoma theileri*. Forme *Leishmania*. Coloration au Giemsa. $\times 2.000$.
- FIG. 2. — Localisation ganglionnaire du *Trypanosoma theileri*. Groupe de formes *Leishmania*. Coloration au Giemsa. $\times 1.500$.
- FIG. 3. — Localisation cérébrale du *Trypanosoma theileri*. Formes *Plasmodium*. Coloration au Giemsa. $\times 2.000$.
- FIG. 4. — Localisation encéphalique du *Trypanosoma theileri*. Formes *Plasmodium* en voie de division répétée. Coloration au Romanovsky. $\times 2.000$.
- FIG. 5. — Formes de passage, intermédiaires entre *Leishmania* et *Crithidia*, dans le foyer encéphalique du bœuf. Coloration au Romanovsky. $\times 2.000$.
- FIG. 6. — Forme *Crithidia* en pleine activité reproductrice (deux divisions successives du noyau et du blépharoplaste) observée dans un frottis de liquide célo-mique de *Hyalomma aegyptium* récolté en Lybie. Coloration au Giemsa. $\times 2.500$.

PLANCHE IX

- FIG. 7. — Formes *Crithidia* et passant à *Trypanosoma* dans le foyer encéphalique du bœuf. Coloration au Romanovsky. $\times 2.000$.
- FIG. 8. — Formes *Crithidia* et passant à *Trypanosoma* dans le foyer encéphalique du bœuf. Coloration au Romanovsky. $\times 1.300$.
- FIG. 9. — Forme *Trypanosoma* dans le foyer encéphalique du bœuf. Coloration au Romanovsky. $\times 2.200$.
- FIG. 10. — Forme *Crithidia* (au voisinage d'une forme *Leptomonas*) dans le sang d'un bovin infecté par *T. theileri*. Coloration au Giemsa. $\times 1.400$.
- FIG. 11. — Forme *Crithidia* dans le sang périphérique d'un bovin infecté par *T. theileri*; cette forme pourrait appartenir à une autre espèce ou à une variété de *T. theileri*. Coloration au Giemsa. $\times 2.000$.
- FIG. 12. — *Trypanosoma theileri* en voie de reproduction dans le sang périphérique; ce stade, très rare dans le sang, est fréquent dans les organes internes. Coloration au Giemsa. $\times 1.400$.
- FIG. 13. — *Trypanosoma theileri*, forme classique dans le sang périphérique. Coloration au Giemsa. $\times 2.200$.

- CARDAMATIS et PHOTINOS. — Etude biologique et histologique sur les trypanosomes chez les bovidés en Grèce. *Centralbl. f. Bakt. Orig.*, LXI, 1912, p. 533-542, 1 pl.
- CARINI. — Présence de trypanosomes chez les bovidés à São Paulo *Bull. Soc. path. exot.*, IV, 1911, p. 191-192.
- CARPANO. — Trypanosomen von Typus des *Trypanosoma theileri* in den Rindern der Kolonie Erythräa. *Centralbl. f. Bakt. Orig.*, LXX, 1913, p. 209-217, 1 pl.
- CRAWLEY. — *Trypanosoma americanum* n. sp. A trypanosome which appears in cultures made from the blood of american cattle. *Bureau of anim. Industry, Depart. of Agric.*, 1909.
- CROVERI. — *T. theileri*, var. *somaliensis*, chez les bovidés somaliens, considéré par rapport à la peste bovine et aux séro-vaccinations antipestuses. *Revue path. comp.*, 1920.
- DELANOE. — Présence de trypanosomes chez les bovidés en France. *Bull. Soc. path. exot.*, IV, 1911, p. 112-116.
- DIOS et ZUCCARINI. — Première constatation de la trypanosomiase bovine en République Argentine. *C. R. Soc. biol.*, LXXVI, 1924, p. 23-24.
- FRANK et FROSCH. — Über die Bedeutung des Befundes rinderpathogener Trypanosomen in Deutschland. *Zeitschr. f. Infekt. Krankh. der Haustiere*, 1909.
- GALLIARD. — Sur un cas d'infection à *Trypanosoma theileri* et *Piroplasma bigemium*. *Annales de Parasitologie*, III, 1925, p. 21-27.
- HEANLEY. — A note on the occurrence of a large trypanosome in the blood of native cattle in South-China. *Journ. of comp. Pathol. and Therap.*, XXI, 1908, p. 178-179.
- HOARE. — An experimental study of the sheep trypanosome (*Trypanosoma melophagium* Flu, 1908) and its transmission by the sheep-keed (*Melophagus* L.). *Parasitology*, 1923, p. 365-424, pl. XII-XVI.
- KLEINE. — Trypanosomenbefunde am Tanganyka und andere Beobachtungen. *Deutsche Med. Wochenschr.*, XXXVI, 1910, p. 1400.
- Beitrag zur Kenntnis des *Trypanosoma melophagum* Flu. *Deutsche tierärztl. Wochenschr.*, 1919.
- KNUTH et BEHN. — Bedeutung der in deutschen Rindern vorkommenden Trypanosomen für die Impfungen gegen die Hämoglobinurie. *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, 1911.
- LAVERAN. — Sur un nouveau trypanosome des bovidés (*Trypanosoma theileri*). *C. R. Acad. Sc.*, CXXXVI, 1902, p. 512.
- LAVERAN et MESNIL. — *Trypanosomes et trypanosomiasés*, Paris, 1912.
- LÜHE. — *Trypanosoma theileri* In Mense, *Handbuch der Tropenkrankheiten*, III, 1906.
- LUHS. — *Trypanosoma theileri* in Transkaukasien. *Arch. de parasitologie*, X, 1905, p. 171-186, 2 pl.
- MANCEAUX, YAKIMOFF et KOHL-YAKIMOFF. — Culture et morphologie du trypanosome type *theileri* des bœufs tunisiens. *Bull. soc. pathol. caot.*, IV, 1909, p. 378-380.
- MEMMO, MARTOGGIO et ADAM. — Infezioni protozoarie negli animali domestici in Eritrea. *Annali d'Igiene sperimentale* 1904.
- MIYAJIMA. — On the cultivation of a bovine *Piroplasma*. *Philippine Journal of sc., B. Med. sc.*, II, 1909, p. 83.
- NÖLLER. — Die Übertragung des *Trypanosoma theileri* Laveran 1902. *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, XXXII, 1916, p. 457.
- Blut- und Insektenflagellatenzüchtung auf Platten. *Arch. Schiffs- und Tropenhyg.*, XXI, 1917, p. 53-94, pl. 1.

- O'FARRELL. — Hereditary infection, with special reference to its occurrence in *Hyalomma aegyptium* infected with *Critidia hyalommae*. *Ann. trop. med. and parasitology*, VII, 1913, p. 545-562, pl. XXXVIII-XL.
- PANSE. — *Trypanosoma theileri*. *Zeitschr. für Hyg.*, 1904.
- PEASE. — *Trypanosoma theileri* and Galziente. *Journal of trop. veter. sc.*, IV, 1909, p. 532.
- PETER. — Morphologische und experimentelle Studien über ein neues, bei Rindern in Uruguay gefundenes *Trypanosoma*. *Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.*, XIV, 1910, Beiheft VI, 40 p., 1 pl.
- SCHEIN. — Hématozoaires des bovidés en Indo-Chine. *Annales Institut Pasteur*, XXI, 1907, p. 660.
- SCHMITT. — Zum Vorkommen von Trypanosomen vom Typus des *T. theileri* in deutschen Rindern. *Berliner tierärztl. Wochenschr.*, 1910, p. 841.
- SERGENT. — Présence de trypanosomes chez les bovidés en Algérie. *Bull. Soc. path. exot.*, IV, 1911, p. 40-42.
- STOCKMAN. — Preliminary note on a *Trypanosoma* of british cattle. *Jl. of comp. path. and therap.*, XXIII, 1910, p. 189-192.
- STOLOWSKI. — *T. theileri* im südlichen Deutsch-Ostafrika. *Arch. f. Schiffs- u. Tropenhyg.*, XII, 1908, p. 30.
- SWELLENGREBEL. — Présence de trypanosomes chez les bovidés en Hollande. *Bull. Soc. path. exot.*, IV, 1911, p. 536-539.
- THEILER. — A new trypanosome and the disease caused by it. *Jl. of comp. path. and therap.*, XVI, 1903, p. 193-216, pl. II.
- TRAUTMANN. — Über das kulturelle und serologische Verhalten des *T. theileri*. Inaug. Diss. der Tierärztl. Hochschule, Berlin. 1921.
- VALLADARES. — A case of *Trypanosoma theileri* in Madras. *Journ. of trop. veter. sc.*, IV, 1909, p. 544.
- VRIJBURG. — Das *Trypanosoma transvaaliense (theileri)* bei holländischen Rindern, *Tijdschr. v. Veeartsenijkunde*, 1912.
- WENYON. — *Protozoology*, London, 1926.
- YAKIMOFF et KOHL-YAKIMOFF. — Présence de trypanosomes dans le sang des bovidés à Tunis. *Bull. Soc. path. exot.*, IV, 1911, p. 309.
- YAKIMOFF et SCHOKHOR. — A propos du *T. theileri* au Turkestan russe. *Bull. Soc. path. exot.*, IX, 1916, p. 229.

Ministère de l'Agriculture. Service vétérinaire. Le Caire.