RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Rhizopodes

Branchipocola nucleomira Václav Breindl. *Entamoebidæ*. Tube digestif. *Branchipus grubyi*. (Crust.) Bohême. *Publications de la Fac. des Sc. Univ. Charles*, Prague, XLIII, 1925, p. 13.

R.-Ph. DOLLFUS.

Trématodes

Lepotrema Y. Ozaki *Lepocreadiinae*. Espèce type : *Lepotrema clavatum*. Y. Ozaki. *Proc. Imper. Acad. Tokyo*, VIII, 1932, p. 44.

Lepotrema clavatum Y. Ozaki. *Lepocreadiinae*. Intestin antérieur. *Monacanthus cinhifer* Temm. et Schlagel (Poiss.). Entre Otaru et Nagasaki (Japon). *Proc. Imper. Acad. Tokyo*, VIII, 1932, p. 44.

Lepoderma momplei R.-Ph. Dollfus. *Lepodermatiæ*. Intestin. *Rana masareniensis*, *Bufo regularis* (Batr.). Ile Maurice. *Ann. paras.*, X, 1932, p. 509.

Tagumaea Tamao Fukui. *Cladorchiidæ*. Espèce type : *T. heterocaeca* T. Fukui. *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVIII, 1926, p. 83.

Tagumaea heterocaeca Tamao Fukui. *Cladorchiidæ*. Intestin (co'on ?). *Elephas maximus* (L.) (Mamm.). Asakusa (Japon). *Dobutsugaku Zasshi*, XXXVIII, 1926, p. 84.

Metorchis revilliodi Jean G. Baer. *Opisthorchiidæ*. Vésicule biliaire. *Neohelmys fodiens* (Schreb.) (Mamm.). Troinex, près Genève (Suisse). *Actes soc. vet. sc. nat.*, 112^e session, p. 340.

Nephrotrema Jean G. Baer. *Troglorematidæ*. Espèce type : *N. truncatum* (Leuckart 1842) (= *Distoma truncatum* Rud. Leuckart). *Actes Soc. helvétique sc. nat.*, 112^e session, p. 338.

R.-Ph. D.

Cestodes

Hymenolepis alpestris Jean G. Baer. *Hymenolepididæ*. Intestin grêle. *Neohelmys fodiens* (Schreb) (Mamm.). Val d'Hérens (Suisse). *Actes soc. helvétique sc. nat.* 112^e session, p. 339.

Hymenolepis globosa Jean G. Baer. *Hymenolepididæ*. Intestin grêle. *Neohelmys fodiens* (Schreb) (Mamm.) Val d'Hérens (Suisse). *Actes soc. helvétique sc. nat.*, 112^e session, p. 339.

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XI, n° 1. — 1^{er} janvier 1933, 1 p. 70-80.

Hymenolepis magnirostellata Jean G. Baer. *Hymenolepididae*. Intestin grêle, *Neomys fodiens* (Schreb.) (Mamm.). Val d'Hérens (Suisse). *Actes soc. helvétique sc. nat.*, 112^e session, p. 339.

Hymenolepis polyacantha Jean G. Baer. *Hymenolepididae*. Intestin grêle. *Neomys fodiens* (Schreb.) (Mamm.). Troinex, près Genève (Suisse). *Actes soc. helvétique sc. nat.*, 112^e session, p. 340.

Hymenolepis neomydis Jean G. Baer. *Hymenolepididae*. Intestin grêle. *Neomys fodiens* (Schreb.) (Mamm.). Troinex, près Genève (Suisse). *Actes soc. helvétique sc. nat.*, 112^e session, p. 340.

Monopylidium hepaticum Jean G. Baer. *Dilepididae*. Cholédoque. *Sorex araneus* (L.) (Mamm.). La Sage (Suisse). *Rev. suisse de Zool.*, XXXIX, 1932 p. 37.

Hymenolepis toxometra Jean G. Baer. *Hymenolepididae*. Intestin grêle. *Sorex araneus* (L.) (Mamm.). La Sage (Val d'Hérens, Suisse). *Rev. suisse de Zool.*, XXXIX, 1932, p. 39.

Trigonocotyle Jean G. Baer. *Tetrabothriidae*. Espèce type : *T. monticellii* Linton 1923, nec Fuhrmann 1899 (= *Prosthecolyle monticellii* Linton 1923). *Rev. suisse de Zool.*, XXXIX, 1932, p. 199.

Strobilocephalus Jean G. Baer. *Tetrabothriidae*. Espèce type : *S. triangulare* Diesing 1850 (= *Tetrabothrium triangulare* Diesing 1850). *Rev. suisse de Zool.*, XXXIX, 1932, p. 202

Eubothrium oncorhynchi R. A. Wardle. *Amphicotylidae*. Cæcums pyloriques. *Oncorhynchus tshawytscha* (Walbaum) et *O. kisutch* (Walbaum) (Poiss.). Straits of Gorgia (British Columbia). *Contributions to Canadian biology and Fisheries*, new series, VII, 1932, p. 231.

R.-Ph. D.

Nématodes

Trionchonema H. A. Kreis. *Rhabditidae*. Espèce type : *T. rusticum* H. A. Kreis. *Trans. of the Amer Microsc. Soc.*, LI, 1932, p. 48.

Trionchonema rusticum H. A. Kreis. *Rhabditidae*. *Polygyra espicola* Bland (Gast.). New-Orléans. *Trans. of the Amer. Microsc. Soc.*, LI, 1932, p. 48.

Cooperia mac masteri H. Mc L. Gordon. *Trich strongylidae*. Intestin grêle. Veau (Mamm.). Australie. *The Australian veter. journ.*, VIII, 1932, p. 8.

Eustrongylides tricolor Masaotsu Sugimoto. *Diectophymidae*. *Anas boschas domesticus* (Ois.). Formose. *Journ. of the Japan. Soc. of veter. sc.*, 1931.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Amphimermis T. Kaburaki et S. Imamura. *Mermithidae*. Espèce type : *Amphimermis zuimushi* T. Kaburaki et S. Imamura. *Proc. Imper. Acad. Tokyo*. VIII, 1932, p. 109.

Amphimermis zuimushi T. Kaburaki et S. Imamura. *Mermithidae*. Cavité du corps, larve de *Chilo simplex* Butler (Ins.) [rice-borer]. Numazu (Pref. Shizuoka, Japon). *Proc. Imper. Acad. Tokyo*, VIII, 1932, p. 109.

Contracaecum hippoglossi Ts. Fujita. *Ascaridae*. Cavité du corps. *Hippoglossus hippoglossus* (L.) (Poiss.). Nemuro (Japon); *Osmenus lanceolatus* (Poiss.) :

Mukawa (Hokkaido, Japon) et *Oncorhynchus keta* (Walbaum) (Poiss.). Ishikari River (Japon). *Bulletin School of Fishery*, Japan. II, 1932, p. 36.

Contracaecum taii Ts. Fujita. Ascaridæ. Cavité du corps. *Taius tumifrons* (Temm. et Schl.) (Poiss.), marché de Shinchiku (Formose). *Bull. School of Fishery*, Japan. II, 1932, p. 37.

Contracaecum naitoi Ts. Fujita. Ascaridæ. Cavité du corps. *Taius tumifrons* (Temm. et Schl.) (Poiss.) (Formose). *Bull. School of Fishery*, Japan. II, 1932, p. 37.

Contracaecum hypomesi Ts. Fujita. Ascaridæ. Cavité du corps. *Hypomesus japonicus* (Brevoort et *Hypomesus ol'dus* (Pallas) (Poiss.), Ishikari River (Japon); *Clupea pallasi* Cuv. Val. (Poiss.), Hinuma (Préfecture d'Ibareki, Japon); cavité du corps et intestin, *Oncorhynchus nerka* (Walbaum) (Poiss.), Oshoromaru (mer d'Okhotsk.) *Bull. School of Fishery*, Japan. II, 1932, p. 38.

Contracaecum ochotense Ts. Fujita. Ascaridæ. *Oncorhynchus nerka* (Walbaum) (Poiss.): Mer d'Okhotsk. *Bull. School of Fishery*, Japan. II, 1932, p. 38.

Contracaecum benimasu Ts. Fujita. Ascaridæ. Cavité du corps. *Oncorhynchus masou* (Brevoort) et *Oncorhynchus nerka* (Walbaum) (Poiss.). Mer d'Okhotsk. *Bull. School of Fishery*, Japan. II, 1932, p. 39.

Ostertagia turkestanica A. M. Petrov et Chachovtseva. *Trichostrongylidæ*. Caillette. *Ovis arics* (Mamm.). Tachkent (Turkestan russe). *Travaux de l'Institut vétérinaire expérimental de l'Etat*, Moscou, IV, 1926, p. 5 (tirage-à-part).

Cucullanus micropapillatus. N. Törnquist. *Cucullanidæ*. Intestin. *Crenilabrus pavo* Brunn, *C. quinque-maculatus*, *C. griseus* Bonnaterra (Poiss.). Trieste et Alexandrie. *Meddelanden från Göteborg Mus. Zool. Avdel.*, LV, 1931, p. 97.

Cucullanus parvus N. Törnquist. *Cucullanidæ*. Intestin. *Senanus* sp. (Poiss.). Tor (Egypte, Sinaï). *Meddelanden från Göteborg Mus. Zool. Avdel.*, LV, 1931, p. 106.

Cucullanellus N. Törnquist. *Cucullanidæ*. Espèce type : *C. minutus* (Rud. 1819) (= *Cucullanus minutus* Rud.). *Meddelanden från Göteborg Mus. Zool. Avdel.*, LV, 1931, p. 132.

Cucullanellus adriaticus N. Törnquist. *Cucullanidæ*. Intestin. *Chrysophrys aurata* Cuv. Val. (Poiss.). Trieste. *Meddelanden från Göteborg Mus. Zool. Avdel.*, LV, 1931, p. 151.

Cucullanellus elongatus N. Törnquist. *Cucullanidæ*. Intestin. Poisson vulg. « corvinilla ». Ile Juan Fernandez. *Meddelanden från Göteborg Mus. Zool. Avdel.*, LV, 1931, p. 158.

Cucullanellus nanus N. Törnquist. *Cucullanidæ*. Intestin. *Morone labrax* L. (Poiss.). Trieste. *Meddelanden från Göteborg Mus. Zool. Avdel.*, LV, 1931, p. 167.

Procamallanus sphaeroconchus N. Törnquist. *Camallanidæ*. Intestin. *Senanus* sp. et *Teuthis* sp. (Poiss.). Golfe de Suez. *Meddelanden från Göteborg Mus. Zool. Avdel.*, LV, 1931, p. 306.

Hedruris tiara H. J. Van Cleave et J. F. Mueller. *Hedruridæ*. Estomac. *Edox niger* Le Sueur et *Erimyzon sucella oblongus* (Mitchill) (Poiss.). Lac Oneida (New-York, U. S. A.), *Roosevelt Wild Life Annals*, III, 1932, p. 60.

Dacnitoides robusta H. J. Van Cleave et J. F. Mueller. *Cucullanidæ*. Intestin. *Ameiurus nebulosus* (Le Sueux) (Poiss.). Lac Oneida (New-York, U. S. A.). *Roosevelt Wild Life Annals*, III, 1932, p. 61.

Capillaria (Thominox) catenata H. J. Van Cleave et J. F. Mueller. *Trichuridæ*. Intestin. *Eupomotis gibbosus* (L.), *Ambloplites rupestris* (Rafinesque) et *Stizostedion vitreum* (Mitchill) (Poiss.). Lac Oneida (New-York, U. S. A.). *Roosevelt Wild Life Annals* III, 1932, p. 65.

Agriostoma cursoni H. O. Monnig. *Ancylostomatidæ*. Intestin grêle. *Damaliscus lunatus* Burch. (Mamm.). Northern Bechuanaland (South Africa). *Journal South African Veterin. Medic. Assoc.*, III, (1), 1932, p. 1 (du tirage à part).

Ancylostoma martinagliai H. O. Monnig. *Ancylostomatidæ*. Intestin grêle. *Thos mesomelles* Schreb. (Mamm.). Jardin zoologique de Johannesburg (South Africa). *Journal South African Vétérin. Medic. Assoc.*, II, (2), p. 1 (du tirage à part).

R.-Ph. DOLLFUS.

Aoanthocéphales

Fessisentis H. J. Van Cleave. *Fessisentidæ*. Espèce type : *F. fessus* H. J. Van Cleave. *Trans. of the Amer. Microsc. Soc.*, L, 1931, p. 350.

Fessisentis fessus H. J. Van Cleave. *Fessisentidæ*. *Aplodinotus grunniens* (Poiss.). Money (Mississippi). *Trans. of the Amer. Microsc. Soc.*, L, 1931, p. 350.

Echinorhynchus dirus H. J. Van Cleave. *Echinorhynchidæ*. *Aplodinotus grunniens* (Poiss.). Money (Mississippi). *Trans. of the Amer. Microsc. Soc.*, L, 1931, p. 352.

Neoechinorhynchus australis H. J. Van Cleave. *Neoechinorhynchidæ*. *Ictiobus* sp. (Poiss.). Money, (Mississippi). *Trans. of the Amer. Microsc. Soc.*, L, 1931 p. 353.

Cavisoma H. J. Van Cleave. *Cavisomidæ*. Espèce type : *C. magnum* (Southwell 1927) (= *Oligoterorhynchus magnus* Southwell 1927). *Trans. of the Amer. Microsc. Soc.*, L, 1931, p. 356.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Hirudinée

Placobdella japonica Asajiro Oka. *Glossosiphonidæ*. Environs de Tokyo et Sapporo (Japon). *Proc. Imper. Acad. Tokyo*, VIII, 1932, p. 51.

R.-Ph. DOLLFUS.

Copépodes

Lernaea oryzophila Th. Monod. *Lernæidæ*. Aisselle des pectorales. *Philypnus marmoratus* Bleeker (Poiss.). Cochinchine. *Ann. de paras.*, X, 1932, p. 346.

M. NEVEU-LEMAIRE.

Choniosphaera C. J. Connolly. *Choniosomatidæ*. Espèce type : *C. cancro-rum*. C. J. Connolly. *Proc. zool. Soc. London*, XXVIII, 1929, p. 417.

Choniosphaera cancro-rum C. J. Connolly. *Choniosomatidæ*. Larves sur œufs et dans coques vides d'œufs, adultes ♀ sur œufs. *Cancer amœnus* Herbst [*irroratus* Say] (Crust.), St-Andrew (New Brunswick) et Woods Hole (Mass.); *Cancer borealis* Stimpson (Crust.), St-Andrew (New Brunswick). *Proc. Zool. Soc. London*, XXVIII, 1929, p. 417.

Nectobranchia wilsoni S. C. Yü et H. W. Wu. *Lernaeopodidæ*. ♀ sur branchies. *Microstoma stelleri* Schmidt (Poiss.). Chefoo (Chine). *Bull. Fan Memorial Instit. of Biol.*, III, 1932, p. 71.

Lepeophtheirus longiventralis S. C. Yü et H. W. Wu. *Caligidæ*. ♀ sur branchies. *Verasper variegatus* (Schlegel) (Poiss.). Chefoo (Chine). *Bull. Fan Memorial Inst. of Biol.*, III, 1932, p. 55.

Chondracanthus longicephala S. C. Yü et H. W. Wu. *Chondracanthidæ*. ♂ et ♀ sur branchies. *Pseudorhombus arsius* (Ham. Buchanan) (Poiss.). Amoy (Chine). *Bull. Fan Memorial Inst. of Biology*, III, 1932, p. 57.

Chondracanthus grandigenitalis S. C. Yü et H. W. Wu. *Chondracanthidæ*. ♂ et ♀ sur branchies. *Paralichthys olivaceus* (Schlegel) (Poiss.). Chefoo (Chine). *Bull. Fan Memorial Inst. of Biol.*, III, 1932, p. 62.

Chondracanthus briani S. C. Yü et H. W. Wu. *Chondracanthidæ*. ♀ sur branchies. *Verasper variegatus* (Schlegel) (Poiss.). Chefoo (Chine). *Bull. Fan Memorial Inst. of Biol.*, III, 1932, p. 64.

Chondracanthus pingi S. C. Yü et H. W. Wu. *Chondracanthidæ*. ♂ et ♀ sur branchies. *Cynoglossa purpureomaculata* Regan et *C. semilævis* Gunther (Poiss.). Chefoo (Chine). *Bull. Fan Memorial Inst. of Biology*, III, 1932, p. 66.

Chondracanthus similis S. C. Yü et H. W. Wu. *Chondracanthidæ*. ♂ et ♀ sur branchies. *Crossorhombus azureus* (Alcock) (Poiss.). Haïnan (Chine). *Bull. Fan Memorial Inst. of Biol.*, III, 1932, p. 69.

R.-Ph. DOLLFUS.

Isopodes

Parlonina chinensis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Hôte inconnu. 25° 15' N. 117° Est. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 148.

Bopyrella barnardi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Alpheus* sp. (Crust.). Région de Lem Ngob (Siam). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 150.

Apopenaeon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *A. richardsonæ* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 153.

Apopenaeon richardsonæ H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur un pénæide indéterm. (Crust.). Sørabaja. *Videnskab. Meddel. fra Dansk. na'urhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 154.

Orbione thielemanni H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur un pénæide indéterm. (Crust.). Koh. Kahdat (Golfe de Siam). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 155.

Epipenaeon grande H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Penæus monodon* F = *semisulcalus* de Haen. (Crust.). Hongkong. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 157.

Epipenaeon oviforme H. F. Nierstrasz et G. H. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Penæus* sp. (Crust.). Région de Lem Ngob (Siam). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 158.

Pseudione minimo-crenulata H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Munida* sp. (Crust.) 5° 46' S, 132° 51' E. *Videnskab. Meddel. fra Dansk. naturhist. Foren.*, 1931, p. 160.

Pseudione latilamellaris H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Munida* sp. (Crust.). 5° 31' S, 132° 38' E. *Videnskab. Meddel. fra Dansk. naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 164.

Pseudione hayi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Munida subrugosa* White (Crust.). Auckland Island, Carnley Harbour. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 165.

Anathelges mülleri H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Galathea* (?) sp. (Crust.). Poeloe Penang. *Videnskabel Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 195.

Stegophrixus thompsoni H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Paguru* ssp., (Crust.). Valparaíso (Chili). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 196.

Stegias angusta H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀, hôte inconnu. Punta Arenas (Chili) *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931. p. 198.

Parathelges whiteleggi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Pagurus* sp. (Crust.). Mer de Java. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 200.

Apophrixus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *A. philippinensis* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 202.

Apophrixus philippinensis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀, hôte inconnu. San Bernardino Strait (Philippines). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 203.

Paraphrixus adriaticus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur Hippolytidé indéterm. Trieste. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931. p. 204.

Metaphrixus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*.

Espèce type : *M. carolii* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 296.

Metaphrixus carolii H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀, hôte inconnu. Christiansted (Sainte Croix, Antilles danoises). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 206.

Anacepon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *A. sibogæ* H. G. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 184.

Anacepon sibogæ H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Lambrus* sp. (Crust.). Expedition du « Siboga », station 164. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 184.

Hypocepon ovale H. G. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Gebia* sp. (Crust.). Koh Chang (Golfe de Siam). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 185.

Epicepon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *E. japonicum* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskabel. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 188.

Epicepon japonicum H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Tymolus* sp., (Crust.). Misaki (Japon). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 188.

Epicepon indicum H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Tymolus* sp. (Crust.). 5° 30' S. 132° 51' E. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 189.

Atypocepon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *A. intermedium* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 191.

Atypocepon intermedium H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀, hôte inconnu. 5 milles à l'ouest de Tucuran, Mindanao. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhist. Foren.*, XCI, 1931, p. 191.

Paracepon H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. stebbingi* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 193.

Paracepon stebbingi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Archæopsis* sp. (Crust.). 5° 30' S, 132° 51' E. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 194.

Pseudione japonensis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Galathea* sp. (Crust.). Hirado Strait (Misaki, Japon). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 167.

Parapseudione H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *P. dubia* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 169.

Parapseudione dubia H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♀ sur *Galathea* sp. (Crust.). A 2 milles à l'Ouest d'El Araish (Maroc). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 170.

Pleurocrypta hessel H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Galathea* sp. (Crust.). Bergen (Norvège). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 171.

Pleurocrypta keiensis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Munida* sp. (Crust.). 5° 46' S 132° 51' E. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 172.

Pleurocrypta porezi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Petrolisthes* sp. (Crust.). El Araish (Maroc). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 174.

Bopyrissa H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *B. magellanica* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.* XCI, 1931, p. 176.

Bopyrissa magellanica H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ et cryptoniscia sur *Clibanarius* sp. (Crust.). Punta Arenas (Chili). *Videnskab. Meddel. fra Dansk Naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 177.

Metacepon H. F. Nierstrasz et G. B. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *M. leidyi* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 182.

Metacepon leidyi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur *Malula* sp. (Crust.). Koh Mesan (Golfe de Siam). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 183.

Hyperphrixus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. Espèce type : *H. tattersalli* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 207.

Hyperphrixus tattersalli H. F. Nierstrasz et F. A. Brender à Brandis. *Bopyridæ*. ♂ et ♀ sur Pontoniidé indéterm. Jolo. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 208.

Hypodajus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Dajidæ*. Espèce type : *H. georgiensis* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 212.

Hypodajus georgiensis H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Dajidæ*. ♂ et ♀ sur face ventrale du perlion d'un Pariphæidé indéterm. Détroit de Georgie. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 212.

Branchiophrixus kœhleri H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Dajidæ*. ♂ et ♀ sur Ephausiacé indéterm. 39° 43' N., 17° 30' E. ; 40° 40' N., 13° 59' E. ; 40° 53' N., 13° E. ; 40° 47' N., 12° 55' E. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 214.

Clypeoniscus sarsi H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Cryptoniscinæ*. ♂, hôte inconnu. Mer de Chine. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 217.

Apocumæchus H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Cryptoniscinæ*. Espèce type : *A. paranebalie* H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 218.

Apocumæchus paranebalie H. F. Nierstrasz et G. A. Brender à Brandis. *Cryptoniscinæ*. ♀ sur *Paranebalia longipes* (Crust.). Entre Saint-Thomas et Saint-Jean (Antilles danoises). *Videnskab. Meddel. fra Dansk naturhistor. Foren.*, XCI, 1931, p. 219.

Acariens

Hannemania samboni H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Nom. nov. pro *Hannemania argentina* Sambon 1928 (nec *H. argentina* Lahille 1927). Peau. *Pleurodema bibroni* (Batr.). Rio Negro (Rép. Argentine). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 4.

Walchia H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Espèce type : *Trombicula glabrum* Walch. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 10.

Endotrombicula H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Espèce type : *E. penetrans* H. E. Ewing. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 11.

Endotrombicula penetrans H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Arthroleptis minutus* Boulenger (Batr.). Mount Sagalla (Kenya). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 16.

Trombicula blarinae H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Blarina brevicauda*, *Peromyscus leucopus* (Mamm.). Washington D. C. *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1932, art. 8, n° 2908, p. 11.

Trombicula dunni H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Dasyprocta punctata nuchalis*, *Nasua narica panamensis* (Mamm.). Chiriqui (Paraguay). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 11.

Trombicula cervulicola H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Cervulus aureus* (Mamm.). Muktesar (Kumaun, Inde). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 13.

Trombicula piercei H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Hipposideros diadema griseus* (Mamm.). Barrio Buyog (Philippines). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 13.

Trombicula cavicola H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. (Larve non fixée). Hôte inconnu. Reynolds cave (Kentucky, U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 14.

Neoschöngastia signator H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. « Wood rat » (Mamm.). Wilburton (Oklahoma, U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 14.

Neoschöngastia scelopori H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Sceloporus spinosus* Wieg. (Rept.). Uvalde (Texas, U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 15.

Neoschöngastia brevipes H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Peromyscus leucopus noveboracensis* (Fischer) (Mamm.). College Park (Maryland, U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 16.

Hannemania hirsuta H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Perognathus californicus californicus* Merriam (Mamm.). Berkeley (California U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 17.

Hannemania penetrans H. E. Ewing. *Trombidiidæ*. Peau. *Rana pipiens* Schreber, *Rana clamitans* Merr. (Batr.). Great Falls of Potomac (Va., U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXX, 1931, art. 8, n° 2908, p. 18.

Hyménoptères

Acroclisoides indicus Ferrière. *Pteromalidæ*. Hémiptère. Inde. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 279.

Agiommatus acherontiae Ferrière. *Pteromalidæ*. *Acherontia styx* (Lépidopt.). Inde. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 280.

Ooencyrtus malayensis Ferrière. *Encyrtidæ*. *Cephanodes hylas*. *Papilio agamemnon*, *P. polytes*, *Leptocorisa acuta* (Lépidopt.). Péninsule indo-malaise. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 282.

Ooencyrtus corbetti Ferrière. *Encyrtidæ*. *Podontia 14-punctata* (Lépidopt.). Péninsule indo-malaise. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 284.

Ooencyrtus erionotae Ferrière. *Encyrtidæ*. *Erionota thrax* (Lépidopt.). Péninsule indo-malaise. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 284.

Ooencyrtus major Ferrière. *Encyrtidæ*. *Attacus allas* (Lépidopt.). Java. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 285.

Centrodora idioceri Ferrière. *Encyrtidæ*. *Idiocerus niveosparsus* (Hémipt.). Java. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 286.

Pareuderus Ferrière. *Eulophidæ*. Espèce type : *P. torymoides* Ferrière. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 287.

Pareuderus torymoides Ferrière. *Eulophidæ*. *Alcides leeuweni* (Coléopt.). Java. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 288.

Achrysocharis promecothecae Ferrière. *Eulophidæ*. *Promecotheca* sp. (Coléopt.). Java. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 289.

Tetrastichus schoenobii Ferrière. *Eulophidæ*. *Schoenobius bipunctifer*, *Spodoptera mauritia* (Coléopt.). Péninsule malaise, Ceylan. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 290.

Tetrastichus gardneri Ferrière. *Eulophidæ*. Œufs de *Pentatomidæ* (Hémipt.). Inde. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 291.

Abbella mariefæ Ferrière. *Trichogrammatidæ*. Hôte inconnu. Péninsule malaise. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 293.

Hæcheliaria brontispæ Ferrière. *Trichogrammatidæ*. *Brontispa longissima*, *B. froggatti*. Java, Celebes. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 294.

Polynema elisabethæ Ferrière. *Mymaridæ*. *Euproctis flexuosa*, Java. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 295.

Glypta leucotretæ Wilkinson. *Ichneumonoidæ*. *Argyroproctæ leucotreta*. Rhodésie. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 393.

Mesobracon psolopterus Wilkinson. *Ichneumonoidæ*. Hôte inconnu. Sierra Leone. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 394.

Camptothlipsis furtifica Wilkinson. *Ichneumonoidæ*. *Dichomeris eviantis*. Punjab. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 36.

Camptothlipsis antigastræ Wilkinson. *Ichneumonoidæ*. *Antigastra calaunalis* (Lépidopt.). Soudan anglo-égyptien. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 396.

Spathius cavillator Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Inde. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 259.

Spathius elaboratus Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Inde. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 260.

Spathius festinans Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Inde. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 261.

Spathius generosus Wilkinson. *Braconidæ*. Hôte inconnu. Inde. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 263.

Spathius piperi Wilkinson. *Braconidæ*. *Lophobaris piperis*. Indes néerlandaises. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 264.

Spilocryptus diatraeae Myers. *Ichneumonidæ*. Hôte inconnu. Guyane britannique. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 267.

Iopobracon puberuloides Myers. *Braconidæ*. Diverses espèces de *Diatraea*. Guyane anglaise. *Bull. entom. res.*, XXII, 1931, p. 270.

H. GALLIARD.

Diptères

Winthemia sinuata H. J. Reinhard. *Tachinidæ*. *Cingilia latenaria* Dru. (Lépid.), Orono, Me (U. S. A.); *Luperina stipata* (Lépid.), Ames, Iowa (U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXIX, 1931, art. 20, n° 2886, p. 26.

Winthemia cecropiae H. J. Reinhard. (1) *Tachinidæ*. *Platysamia cecropia* (Lépid.). Rockford, Illinois (U. S. A.). *Proc. U. S. national Mus.*, LXXIX, 1931, art. 20, n° 2886, p. 35.

R.-Ph. DOLLFUS.

(1) Pour les espèces nouvelles de *Winthemia* d'Amérique, décrites par H. J. Reinhard dans sa révision du genre, mais sans indication d'hôte, nous renvoyons aux *Proc. U. S. national Mus.*, LXXIX, 1931, art. 20, n° 2886.

Le Gérant : F. AMIRAULT.