

NOTES ET INFORMATIONS

Nouvelle localité française pour *Phlebotomus perniciosus*. — J'ai eu l'occasion, le 7 juillet 1934, de capturer en plein jour deux phlébotomes à Jargeau (chef-lieu de canton du Loiret situé sur la rive gauche de la Loire, à une vingtaine de kilomètres en amont d'Orléans).

Ce sont deux mâles appartenant à l'espèce *Phlebotomus (Larrousius) perniciosus* Newst. Ils étaient les seuls existant dans le local de la prise et selon toute vraisemblance provenaient de la même ponte ; aussi est-il intéressant de noter que néanmoins le mode de bifurcation de l'organe intromittent n'est pas identique chez les deux individus ; il y a donc dans la variation de ce caractère un facteur individuel important.

La présence de cette espèce dans l'Orléanais n'a rien d'étonnant et cette localité nouvelle établit un lien entre celles déjà connues de la région parisienne d'une part et du Maine-et-Loire et de la Mayenne d'autre part.

Les deux individus, montés au chloral-lactophénol, ont été déposés au Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de médecine de Paris.

G. LAVIER.

Troisième Congrès international de Pathologie comparée. — Le Président et le Secrétaire général du troisième Congrès international de Pathologie comparée informent MM. les membres du corps médical et vétérinaire, que ce Congrès tiendra ses assises à la Faculté de médecine d'Athènes, du 15 au 18 avril 1936.

LA RÉDACTION.

Rectifications d'orthographe. — Parmi les espèces nouvelles de distomes, publiées dans *Japanese Journal of Zoology*, V, n° 3, 1934, et insérées dans le n° 2, t. XIII, 1935, des *Annales de Parasitologie*, se trouvent *Lebouria chærodontis* S. Yamaguti et *Parantorchis chætodontis* S. Yamaguti. Le D^r S. Yamaguti nous prie de faire connaître que les noms spécifiques de ces espèces doivent être respectivement remplacés par *chærodontis* et *chætodontis*. (Article 19 des Règles internationales de la nomenclature zoologique).

R.-Ph. DOLLFUS.