ACTION NULLE DU FROID SUR LE POUVOIR INFECTIEUX DES ARGASINÉS VECTEURS DE FIÈVRES RECURRENTES

Par E. BRUMPT

Depuis les observations devenues classiques de Borrel et Marchoux (1905), il était admis que les *Argas persicus*, infectés par le *Spirochæta gallinarum*, perdent leur aptitude à transmettre ce germe quand ils sont conservés quelques jours à 15-18° C. et la récupèrent s'ils sont placés, pendant deux ou trois jours, à la température de 30 à 35° C.

C'est ainsi, par exemple, que des *Argas*, conservés par ces auteurs, pendant trois mois à froid, et qui n'avaient jamais infecté les poules soumises à leur piqure, ont transmis la maladie dès qu'ils ont été réchauffés à 35° C.. Borrel et Marchoux rapprochent ce phénomène des observations de la Mission Française pour l'étude de la fièvre jaune, à Rio-de-Janeiro, qui a montré que les *Stegomyia* ne transmettent la maladie et ne sont infectieux qu'à des températures supérieures à 28° C.

Des résultats comparables ont été publiés par Blanc et Caminopetros (1929), en ce qui concerne la dengue que des *Stegomyia*, infectieux à la température moyenne de 22° C. (27° à 18°), cessent de transmettre à la température moyenne de 16°4 (24° à 15°), et inoculent de nouveau quand la température moyenne s'élève à 22°5.

Les travaux de Marchoux et Couvy (1913), concernant l'action de la température sur les spirochètes (*S. gallinarum*), hébergés par des exemplaires d'*Argas persicus*, originaires du Brésil, ont complété ceux de Borrel et Marchoux signalés plus haut. Ces auteurs ont établi que le séjour d'*Argas* infectieux à la glacière semble faire disparaître les spirochètes qu'ils renferment, mais qu'il suffit d'un séjour de 48 heures à température de 28° C. pour obtenir la pullulation de ces germes dans le liquide coelomique de cet acarien.

Or, s'il est bien établi par ces diverses recherches que la chaleur favorise la multiplication des spirochètes, il n'en est pas moins vrai que ce facteur n'est pas toujours nécessaire pour déterminer

le pouvoir infectieux des argasins vecteurs de spirochètes. Mes premiers doutes au sujet de la nécessité de mettre à l'étuve à 25-28°, pendant plusieurs jours, les argasins infectieux devant piquer des animaux réceptifs, me vinrent lors d'une étude épidémiologique concernant la fièvre récurrente du Texas, dont le vecteur est l'*Ornithodoros turicata*, ainsi que l'ont établi Weller et Graham (1931). En effet, le Dr Graham, qui m'accompagnait avec divers confrères américains pour visiter une grotte où la fièvre récurrente se contractait à coup sûr, fut piqué et eut quelques jours plus tard une infection typique. Or, la visite eut lieu le 28 octobre 1932, et la température de cette grotte, exposée au nord, était certainement assez basse la nuit depuis quelques semaines, et ne s'élevait guère à plus de 15° C. dans la journée. Aussi, dès mon retour à Paris (1932), j'entrepris de nombreuses expériences sur des souris avec les *Ornithodores* que j'avais récoltés dans cette grotte des environs d'Austin (Texas), et je pus constater que ces acariens, conservés à la température de 12-15° C., donnaient la maladie aussi régulièrement que ceux qui étaient placés à l'étuve à 25°.

A l'occasion d'un rapport que j'ai présenté au Congrès international de microbiologie de Londres (juillet 1936), j'ai entrepris un certain nombre de recherches en utilisant des *Argas persicus* de Perse, infectés par une souche de *Spirochæta gallinarum*, isolée et étudiée à mon laboratoire par le Dr Mohamed Ali Moayed Hekmal (1).

J'ai utilisé également des *Ornithodoros maroccanus* donnant la récurrente hispano-nord africaine et des *Ornithodoros tholozani* (= *O. papillipes*), infectés par le *Spirochæta persica* de la fièvre récurrente de l'Asie centrale.

1° *Argas persicus infectieux*. — Un lot de plus de 100 exemplaires est conservé pendant plusieurs jours à la glacière (5-7° C.) (expérience 1.405 XX).

Le coq témoin 586 XX est piqué le 8 juillet 1936 par 66 *Argas* du même lot que celui mis à la glacière, il prend une infection typique avec fièvre élevée, mais rares spirochètes dans le sang.

Le poulet 124 XXI est piqué le 22 juillet 1936 par 31 *Argas* sortant de la glacière ; le septième jour, les spirochètes sont très nombreux dans le sang de l'oiseau.

Un canard (123 XXI) est piqué le 22 juillet par 41 *Argas* ayant

(1) C'est la première fois, à ma connaissance, que la spirochètose aviaire est signalée en Iran.

séjourné 14 jours à la glacière, il s'infecte et présente le septième jour de très nombreux spirochètes (1).

2° *Ornithodoros erraticus* et *récurrente hispano-nord africaine*. — Un cobaye mâle (557 XX), de 395 grammes, est piqué le 20 avril 1936 par 20 *O. marocanus* adultes, 463 XX, sortant de la glacière et soumis à l'action du froid (5°-7° C.) pendant 21 jours. Il présente, dès le sixième jour, un accès thermique accompagné d'un premier accès parasitaire. Cet animal, suivi pendant 29 jours, présente quatre accès thermiques atteignant parfois 40°8, et parfois plus de 80 spirochètes par champ à l'immersion, en goutte épaisse.

3° *Ornithodoros tholozani* et *récurrente de l'Asie centrale*. — Un cobaye mâle (559 XX), de 300 grammes, est piqué le 20 avril 1936 par 11 *Ornithodores* sortant de la glacière et soumis à l'action du froid (5°-7° C.) pendant 21 jours. Le neuvième jour, il présente quelques spirochètes, ainsi que son premier accès fébrile. Après avoir eu trois grands accès thermiques atteignant jusqu'à 41°2, et parfois 40 spirochètes par champ, en goutte épaisse, il meurt en hypothermie, le vingt-troisième jour, ayant environ 30 spirochètes par champ, dans le sang du cœur. A l'autopsie, l'animal, qui a maigri et ne pèse que 250 grammes, ne présente pas d'hémopéritoïne, comme je l'ai souvent observé en utilisant ce virus (2) ; la rate pèse 1 gr. 950.

RÉSUMÉ

Des *Argas persicus*, des *Ornithodoros tholozani* (= *O. papillipes*), et des *Ornithodoros erraticus* infectieux, conservés à la gla-

(1) Les résultats différents que nous avons obtenus avec la souche persane du Dr Moayed Hekmal tiennent peut-être à une résistance plus grande des spirochètes de Perse, qui sont soumis parfois à des hivers très rigoureux et qui se sont probablement adaptés à ces conditions. Les germes étudiés par Borrel et Marchoux provenaient de Rio-de-Janeiro, où les hivers sont inconnus. Il serait intéressant d'étudier à ce point de vue un certain nombre de souches des régions tropicales.

(2) J'ai isolé ce virus de fièvre récurrente, le 15 janvier 1934, en partant d'*ornithodores* spontanément infectés, provenant d'une grotte de l'état de Slalinabad (= Tadshikistan) du Turkestan russe, que le Professeur Pawlowsky avait eu l'obligeance de m'envoyer. Cette souche est particulièrement pathogène pour le cobaye ainsi que je l'ai signalé en 1934. La mortalité s'élève à 71 % et la rate qui à l'autopsie pèse parfois jusqu'à dix fois son poids normal peut, par sa rupture, provoquer dans 17 % des cas un hémopéritoïne. Cette dernière complication est très rare dans le cas de la récurrente hispano-nord-africaine du cobaye, où je l'ai observée une seule fois sur de nombreux animaux étudiés.

cière (5°-7° C.) pendant plusieurs semaines, et placés ensuite sans réchauffement préalable sur des animaux réceptifs, leur ont communiqué des infections aussi graves que celles observées chez les témoins.

BIBLIOGRAPHIE

- BLANC (G.) et CAMINOPETROS. — Recherches expérimentales sur la dengue. *Ann. Inst. Pasteur*, XLIV, 1930, p. 367 ; *Arch. Inst. Pasteur hellénique*, II, 1930, p. 199.
- BORREL et MARCHOUX. — Argas et Spirilles. *C.R. Soc. Biol.*, LVIII, 1905, p. 362.
- BRUMPT (E.). — Etude du *Spirochaeta turicata* n. sp., agent de la fièvre récurrente sporadique des Etats-Unis, transmise par *Ornithodoros turicata*. *C.R. Soc. Biol.*, CXIII, 1933, p. 1369.
- Hémopéritoine chez des cobayes infectés par le spirochète de la fièvre récurrente du Turkestan. *Bull. Soc. Path. Exot.*, XXVII, 1934, p. 510.
- Etude historique concernant l'étiologie de la fièvre récurrente sporadique de l'Asie. *Jubilé du Prof. Pavlovsky*, 1935.
- MARCHOUX (E.) et COUVY (L.). — Argas et Spirochètes. (Premier mémoire). Les Granules de Leishman. Historique. *Ann. Inst. Pasteur*, 1913, p. 550.
- WELLER (B.) et GRAHAM (G. M.). — Relapsing fever in Central Texas. *Journ. Amer. Med. Assoc.*, LXXXV, n° 24, 1930, p. 1834.

(Travail de l'Institut de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris
Directeur : Professeur E. Brumpt)