RÉPERTOIRE

DES ESPÈCES ET DES GENRES NOUVEAUX

Hyphomycètes

Actinomyces sanguinis Basu. *Actinomycelaceæ*. Sang. Homme atteint de broncho-pneumonie. Calcutta, Inde anglaise. *Indian Jl. med. res.*, XXV, 1937, p. 325.

Sporotrichum anglicum Castellani. *Conidiosporaceæ*. Poumon. Homme. Angleterre. *Jl. of trop. med. and hyg.*, XL, 1937, p. 315.

M. LANGERON.

Ascomycètes

Trichophyton dankaliense Castellani. *Gymnoascaceæ*. Poils. Chameau (Mamm.). Afrique. *Jl. of trop. med. and hyg.*, XL, 1937, p. 313.

M. L.

Incertæ sedis

Ehrlichia Mochkowsky. Espèce type : *E. kurlovi* Mochkowsky. *C. R. Soc. biol.*, CXXVI, 1937, p. 379.

Ehrlichia (Rickettsia) kurlovi Mochkowsky. Sang, leucocytes mononucéaires. Cobaye. Moscou. *C. R. Soc. biol.*, CXXVI, 1937, p. 379.

Erythrocytonucleophaga Momcilo Ivanic. Espèce type : *E. ranæ* Momcilo Ivanic. *Ztrbl. f. Bakt., I Abt., Orig.*, CXXXIII, 1934, p. 1.

Erythrocytonucleophaga ranæ Momcilo Ivanic. Noyau des hématies. *Rana esculenta* L. (Batr.). *Ztrbl. f. Bakt., I Abt., Orig.*, CXXXIII, 1934, p. 1.

M. L.

Sporozoaires

Ovivora Mackinnon et Ray. *Eimeridæ*. Espèce type : *O. thalassemæ* (Lankester 1885) (= *Monocystis thalassemæ* Lankester 1885). *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 466.

Caryospora falconis Wetzel et Enigk. *Eimeridæ*. Intestin. *Falco peregrinus* (Ois.). Allemagne. *Sitzungsber. Gesell. naturforsch. Freunde*, 19 Janvier 1937.

M. L.

Flagellés

Polywastix lineata Duboscq, Grassé et Rose. *Tetramitidæ*. Intestin. *Acanthohermes ochraceus* (Orthopt.). Sud algérien. *C. R. Acad. sc.*, CCV, 1937, p. 574.

Deltotrichonympha numidica Duboscq, Grassé et Rose. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Acanthohermes ochraceus* (Orthopt.). Sud algérien. *C. R. Acad. sc.*, CCV, 1937, p. 575.

Rostronympha Duboscq, Grassé et Rose. *Trichonymphidæ*. Espèce type : *R. magna* Duboscq, Grassé et Rose. *C. R. Acad. sc.*, CCV, 1937, p. 575.

Rostronympha magna Duboscq, Grassé et Rose. *Trichonymphidæ*. Intestin. *Acanthohermes magna* (Orthopt.). Sud algérien. *C. R. Acad. sc.*, CCV, 1937, p. 575.

Cochlosoma picae Travis. *Tetramitidæ*. Intestin. *Pica pica hudsonia* (Sabine) (Ois.). Etats-Unis. 13th. ann. meeting amer. Soc. of paras., 1937. *Jl. of paras.*, XXIII, 1937, p. 558.

Cochlosoma turdi Travis. *Tetramitidæ*. Intestin. *Turdus migratorius migratorius* L. (Ois.). Etats-Unis. 13th. ann. meeting amer. Soc. of paras., 1937. *Jl. of paras.*, XXIII, 1937, p. 558.

M. L.

Infusoires

Nyctotherus ochoterenai Schouten. *Bursaridæ*. Intestin postérieur. *Engystoma ovale bicolor* (Batr.). Localité non indiquée. *Anales Inst. biologia, Mexico*, VIII, 1937, p. 387.

Nyctotherus gamarral Schouten. *Bursaridæ*. Intestin postérieur. *Hyla venulosa* (Batr.). Localité non indiquée. *Anales Inst. biologia, Mexico*, VIII, 1937, p. 390.

Triplumaria Hoare. *Cycloposthiidæ*. Espèce type : *T. hamertoni* Hoare. *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 559.

Triplumaria hamertoni Hoare. *Cycloposthiidæ*. Intestin. *Rhinoceros unicornis* (Mamm.). Jardin zoologique de Londres (importé de l'Inde). *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 559.

M. L.

Trématodes

Pseudobilharziella quercedulae Mac Leod. *Schistosomidæ*. Veines portes. *Querquedula discors* (Ois.). Marquette, Manitoba, Canada. *Jl. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 458.

Ornithobilharzia lari Mac Leod. *Schistosomidæ*. Veines portes. *Larus argentatus* (Ois.). Yarmouth, Nouvelle Ecosse ; Canada. *Jl. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 461.

Lechriorchis secundus Canavan. *Reniferidæ*. Oviducte. *Natrix sipedon* (Rept.). Philadelphie, Penn., U. S. A. *Jl. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 478.

Dicrocoelium proxillicens Canavan. *Dicrocoeliidæ*. Canal biliaire. *Kakatoe*

sulphurea (Ois.). Jardin zoologique Philadelphie, U. S. A. *Jl. of Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 479.

Gorgoderina tanneri Olsen. *Gorgoderidæ*. Vessie. *Rana pretiosa* (Batr.). Springuille, Utah, U. S. A. *Jl. of Parasitol.*, XXIII, 1937, 499.

Cyathocotyla fusca Ishū et Matsuoka. *Holostomidæ*. Métacercaire : muscles, *Pseudorasbora parva* (Poiss.). Expérimentalement : intestin, *Anas boschas* (Ois.). Japon. *Japanese Jnl. Exp. Med.*, XIII, 1935, p. 752.

Azygia amuriensis Zmejev. *Azygiidæ*. Tube digestif de Poisson. Riv. Amour, Sibérie. *Magasin de Parasitologie*, VI, 1936, p. 405.

Vitellarinus Zmejev. *Gorgoderidæ*. Espèce type : *V. pawlovskii* Zmejev. *Magasin de Parasitologie*, VI, 1936, p. 405.

Vitellarinus pawlovskii Zmejev. *Gorgoderidæ*. Tube digestif d'un poisson. Riv. Amour, Sibérie. *Magasin de Parasitologie*, VI, 1936, p. 405.

Bucephalopsis karvei Bhalerao. *Bucephalidæ*. Intestin. *Belone cancila* (Poiss.). Bombay, Indes. *Jnl. Helminthol.*, XV, 1937, p. 98.

Phyllodistomum shandrai Bhalerao. *Gorgoderidæ*. Rectum. *Rana tigrina* (Batr.). Bombay, Indes. *Jnl. Helminthol.*, XV, 1937, p. 104.

Paramphistomum maplestoni Bhalerao. *Paramphistomidæ*. Intestin grêle et gros intestin. *Hyelaphus porcinus* (Mamm.). Calcutta, Indes. *Jnl. Helminthol.*, XV, 1937, p. 109.

Paramphistomum cuonum Bhalerao. *Paramphistomidæ*. Estomac et intestin grêle, *Cuon dukhunensis* (Mamm.). Jardin Zoologique de Calcutta, Indes. *Jnl. Helminthol.*, XV, 1937, p. 111.

Helomastis sakrei Bhalerao. *Paramphistomidæ*. Intestin. *Labeo calbasu* (Poiss.). Poona, Pr. de Bombay, Indes. *Jnl. Helminthol.*, XV, 1937, p. 116.

Neocladorchis Bhalerao. *Paramphistomidæ*. Espèce type : *N. poonaensis* Bhalerao. *Jnl. Helminthol.*, XV, 1937, p. 119.

Neocladorchis poonaensis Bhalerao. *Paramphistomidæ*. Intestin et Rectum. *Barbus dobsoni* (Poiss.). Poona, Pr. de Bombay, Indes. *Jnl. Helminthol.*, XV, 1937, p. 119.

Strigea baylisi Dubois. *Strigeidæ*. Intestin. *Carphibis spinicollis* (Ois.). Cromarty, Australie. *Ann. de Parasitol.*, XV, 1937, p. 235.

Strigea suttoni Dubois. *Strigeidæ*. Duodénum. *Gallina picata* (Ois.). Cromarty, Australie. *Ann. de Parasitol.*, XV, 1937, p. 237.

Strigea nicolli Dubois. *Strigeidæ*. Duodénum. *Burhinus grallarius* (Ois.). Cromarty, Australie. *Ann. de Parasitol.*, XV, 1937, p. 241.

Strigea glandulosa Dubois. *Strigeidæ*. Intestin. *Haliastur sphenurus* (Ois.). Cromarty, Australie. *Ann. de Paras.*, XV, 1937, p. 244.

Cercaria yogena Cort et Brackett. *Strigeidæ*. Foie. *Stagnicola emarginata angulata*, *S. emarginata canadensis* et *S. palustris elodes* (Gastér.). Lac Douglas, Michigan, U. S. A. *Jnl. Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 268.

Cercaria dohema Cort et Brackett. *Strigeidæ*. Foie. *Stagnicola emarginata angulata*, *S. emarginata canadensis* et *Limnea stagnalis perampla* (Gastér.). Lac Douglas, Michigan, U. S. A. *Jnl. Parasitol.*, XXIII, 1937, p. 274.

Cercorchis auristomi E. E. Byrd. *Lepodermatidæ*. Intestin antérieur. *Farancia abacura* (Rept.). Louisiane, U. S. A. *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 359.

Stomatrema guberleti E. E. Byrd. *Lepodermatidæ*. Œsophage. *Farancia abacura* (Rept.). Louisiane, U. S. A. *Parasitology*, XXIX, 1937, p. 362.

Echinocercaria choanophila U. Szidat. *Echinostomatidæ*. Rédies chez *Planorbis planorbis* (Gastér.). Prusse Orientale. *Zool. Anz.*, CXVI, 1936, p. 304.

Pseudoreniker brachyœsophagidius Allison et Holl. *Plagiorchidæ*. Intestin. *Thamnophis sirtalis* (Rept.). Perryburg, N. Y., U. S. A. *Trans. Amer. Microsc. Soc.*, LVI, 1937, p. 203.

J. CALLOT.

Neodiplostomum australiense G. Dubois. *Strigeidæ*. Duodenum. *Baza subcristata* Gould (Ois.). Australie, Queensland. *Rev. Suisse zool.*, XLIV, 1937, p. 391.

Posthodiplostomum australe G. Dubois. *Strigeidæ*. Intestin. *Bolaurus poiciloptilus* Wagl. (Ois.). Cromarty, Australie. *Rev. Suisse zool.*, XLIV, 1937, p. 391.

Chiorchis purvisi Southwell et Kirshner. *Cladorchidæ*. Intestin. *Heosemys grandis* (Rept.). Kedah, Malaisie. *Ann. of trop. med. paras.*, XXXI, 1937, p. 215.

Cercaria gigantocerca Szidat. *Psilostomidæ*. *Bithynia tentaculata* (Gastér.). Rossiter Haffbucht, Prusse orientale. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 539.

Cercaria incognita Szidat. *Psilostomidæ*. *Bithynia tentaculata* (Gastér.). Inse, rive orientale du Kurisches Haff (Prusse orientale). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 539.

Pneumatophilus leidy Byrd et Denton. *Plagiorchidæ*. Poumons et trachée. *Natrix sipedon fasciata* (L.) (Rept.). Athens, Georgie, U. S. A. *Proc. Helminthol. Soc. Washington*, IV, 1937, p. 79.

Podocotyle endophrysi Park. *Allocreadiidæ*. Intestin et estomac. *Endophrys bison* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 406.

Podocotyle apodichthysi Park, *Allocreadiidæ*. Intestin postérieur. *Apodichthys flavidus* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 407.

Podocotyle blennicottusi Park. *Allocreadiidæ*. Intestin postérieur. *Blennicottus globiceps* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 409.

Podocotyle californica Park. *Allocreadiidæ*. Intestin postérieur. *Blennicottus globiceps* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 411.

Podocotyle kofoidi Park. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Blennicottus globiceps* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 412.

Podocotyle elongata Park. *Allocreadiidæ*. Intestin postérieur. *Blennicottus globiceps* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of paras.*, XXIII, 1937, p. 413.

Podocotyle pedunculata Park. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Oligocottus maculosus* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 414.

Podocotyle pacifica Park. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Blennicottus globiceps* Girard (Poiss.). Dillon's beach, Californie. *Jl. of Paras.*, XXIII, 1937, p. 415.

Helicometrina elongata Noble et Park. *Allocreadiidæ*. Intestin grêle. *Caularchus meandricus* (Poiss.). Bodega Bay, Californie. *Trans. Amer. microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 344.

Hirudinelia beebel Chandler. *Hemiuridæ*. Estomac. *Acanthocybium petus* (Poiss.). Bermudes. *Trans. Amer. microscop. Soc.*, LVI, 1937, p. 348.

Spinometra gangeticus Mehra. *Lepodermatidæ*. Intestin grêle. *Kachuga dhongoka* Bouleng. (Rept.). Allahabad, U. P., Inde. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 444.

Glossimetra Mehra. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *G. orientalis* Mehra. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 449.

Glossimetra orientalis Mehra. *Eepodermatidæ*. Duodénum et intestin grêle. *Kachuga dhongoka* Bouleng (Rept.). Allahabad, U. P., Inde. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 446.

Bilorchis Mehra. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *B. indicum*. Mehra. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 452.

Bilorchis indicum Mehra. *Lepodermatidæ*. Vésicule biliaire. *Lissemys punctata* Malcolm Smith (Rept.). Allahabad, U. P., Inde. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 450.

Cephalogonimus minutum Mehra. *Lepodermatidæ*. Intestin grêle, *Lissemys punctata* Malcolm Smith (Rept.). Allahabad, U. P., Inde. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 452.

Neolepoderma Mehra. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *N. noblei* (Park 1936) (= *Plagiorchis noblei* Park 1936). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 454 et 466.

Natriodera Mehra. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *N. verlatum* (Talbot 1934) (= *Macrodera verlatum* Talbot 1934). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 455 et 466.

Ptyasiorchis Mehra. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *P. mehræi* (Gogate 1935) (= *Ostiolum mehræi* Gogate 1935). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 456 et 466.

Ophiorchis Mehra. *Lepodermatidæ*. Espèce type : *O. amudariensis* (Strom 1928) (= *Xenopharynx* (*Allopharynx*) *amudariensis* Strom 1928). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 455 et 466.

Apatemon indicus R. D. Vidyarthi. *Strigeidæ*. Intestin grêle. *Casarca ferruginea* (Ois.). Allahabad, Inde. *Proc. Indian Acad. sc.*, B, V, 1937, p. 315.

Apatemon casarcus R. D. Vidyarthi. *Strigeidæ*. Intestin grêle. *Casarca ferruginea* (Ois.). Allahabad, Inde. *Proc. Indian Acad. sc.*, B, V, 1937, p. 317.

Pseufostrigea sarcogyponis R. D. Vidyarthi. *Strigeidæ*. Parasite d'un intes-

tin d'oiseau (1) sans indication d'hôte ni de localité. *Proc. Indian Acad. sc.*, B, V, 1937, p. 318.

Cotylurus orientalis R. D. Vidyarthi. *Strigeidæ*. Intestin grêle. *Nettion crecca crecca* (Ois.). Allahabad, Inde. *Proc. Indian Acad. sc.*, B, V, 1937, p. 321.

Lepoderma bulbulii Mehra. *Lepodermatidæ*. Intestin grêle. *Malpastes hæmorrhous intermedius* Stuart Baker (Ois.). Srinagar, Kashmir, Inde. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 434.

Lepoderma casarcii Mehra. *Lepodermatidæ*. Intestin grêle. *Casarca ferruginea* Stuart Baker (Ois.). Allahabad, U. P., Inde. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 436.

Lepoderma ferrugineum Mehra. *Lepodermatidæ*. Intestin grêle. *Casarca ferruginea* Stuart Baker (Ois.). Allahabad, U. P., Inde. *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 438.

Neodiplostomum larai Refuerzo et Garcia. *Alariidæ*. Intestin grêle. *Bubulcus ibis coromandus* (Boddaert) (Ois.). Biñan, Laguna Province, Luzon, Iles Philippines. *Philippine Jl. of sc.*, LXII, 1937, p. 137.

Diplodiscus sinicus Li Lay Yung. *Paramphistomatidæ*. Rectum et gros intestin, rarement vessie. *Rana rugulosa* et *R. limnocharis* (Batr.). Canton et Amoy (Chine). *Lingnan sc. Jl.*, XVI, 1937, p. 61.

Diplodiscus mehrai Pande. *Paramphistomatidæ*. Rectum. *Rana cyanophlyctis* (Batr.). Montagnes de Kumaon, Almora, Inde. *Proc. Indian Acad. sc.*, B, VI, 1937, p. 109.

Pneumonoecus almorai Pande. *Lepodermatidæ*. Poumons. *Rana cyanophlyctis* (Batr.). Montagne de Kumaon, Almora, Inde. *Proc. Indian Acad. sc.*, B, VI, 1937, p. 116.

Gones kumaonensis Pande. *Lecithodendriidæ*. Intestin grêle. *Rana cyanophlyctis* (Batr.). Montagne de Kumaon, Bhimtal, Inde. *Proc. Indian Acad. sc.*, B, VI, 1937, p. 116.

Telorchis hagmanni Lent et Freitas. *Telorchidæ*. Estomac. *Podocnemis expansa* (Schw.) (Rept.). Fleuve Amazone, Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 452.

Psilostomum cygnei Southwell et Kirshner. *Psilostomatidæ*. Intestin grêle. *Cygnus olor* (Ois.). Sefton Park, Liverpool. *Ann. trop. med. paras.*, XXXI, 1937, p. 428.

Halipegus eccentricus Lyell J. Thomas. *Halipegidæ*. Sporocystes, rédies et cercaires cystophores chez *Physella parkeri* Currier, *P. sayii crassa* Walker, *P. gyrina*, *Helisoma trivolvis* (Gastér.); métacercaires chez *Cyclops leuckarti*, *C. vulgaris* (Crust.); adultes dans l'oreille des grenouilles. *Etats-Unis. 13 th. ann. meeting amer. Soc. of paras.*, 1937. *Jl. of paras.*, XXIII, 1937, p. 564.

Cercaria angusticauda Dickerman. Cercaires cystocerques. *Goniobasis*

(1) R. D. Vidyarthi, n'indique pas l'hôte de ce parasite; d'après le nom qu'il a donné à l'espèce, il s'agit apparemment d'un Rapace du genre *Sarcogyps*. Ce genre a été proposé par R. P. Lesson (déc. 1842) comme sous-genre de *Vultur*, pour *V. ponticerianus* Lath., du Bengale. — R.-Ph. DOLLFUS,

(Gastér.). Lac Erié, Bass Island region, Etats-Unis. 13 th. ann. meeting amer. Soc. of paras. JI. of paras., XXIII, 1937, p. 566.

Cercaria sagittaria Dickerman. Cercaires cystocercques. *Goniobasis*, *Pleurocera* (Gastér.). Lac Erié, Bass Island region, Etats-Unis. 13 th. ann. meeting amer. Soc. of paras., 1937. JI. of paras., XXIII, 1937, p. 566.

Proterometra sagittaria Dickerman. *Azygiidæ*. Adulte expérimentalement chez des poissons et des tortues, nourris de *Goniobasis* et *Pleurocera* infectés de *Cercaria sagittaria*. Lac Erié, Bass Island region, Etats-Unis. 13 th. ann. meeting amer. soc. of paras., 1937, JI. of paras., XXIII, 1937, p. 566.

Macraves tibulum eversum Yin-ming Hsü. *Pronocephalidæ*. Cercaires chez *Goniobasis livescens* (Menke) (Gastér.); adultes dans le tiers supérieur de l'intestin grêle de *Graptomys geographica* (Le Sueur) (Rept.). Honey Creek et Delhi Woods Park, Ann. Arbor, Michigan (U.S.A.). *Trans. amer. microsc. Soc.*, LVI, 1937, p. 478.

M. LANGERON.

Pyelosomum posterorchis Y. Oguro. *Pronocephalidæ*. Intestin. *Eretmochelys squamosa* (Girard) (Chélonien). Palao-Insel (Japon). *Journ. Science Hirosima Univers.*, ser. B, div. I, V, 1936, p. 6.

Pleurogonius ozakii Y. Oguro. *Pronocephalidæ*. Intestin. *Eretmochelys squamosa* (Girard) (Chélonien). Palao-Insel (Japon). *Journ. Science Hirosima Univ.*, ser. B, div. I, V, 1936, p. 10.

Medioporus Y. Oguro. *Pronocephalidæ*. Espèce type : *M. macrophallus* Y. Oguro. *Journ. Science Hirosima Univ.*, ser. B, div. I, V, 1936, p. 16.

Medioporus macrophallus Y. Oguro. *Pronocephalidæ*. *Eretmochelys squamosa* (Girard) (Chélonien). Palao-Insel (Japon). *Journ. Science Hirosima Univ.*, ser. B, div. I, V, 1936, p. 16.

Medioporus cheloniae Y. Oguro. *Pronocephalidæ*. *Chelonia japonica* (Thunberg) (Chélonien). Itoman (Liukiu, Japon). *Journ. Science Hirosima Univ.*, ser. B, div. I, V, 1936, p. 20.

Diaschistorchis lateralis Y. Oguro. *Pronocephalidæ*. *Chelonia japonica* (Thunberg) (Chélonien). Itoman (Liukiu, Japon). *Journ. Science Hirosima Univ.*, ser. B, div. I, V, 1936, p. 23.

Steganoderma kamatukae E. Takenti *Zoogonidæ*. Intestin. *Pseudogobio esocinus* (Temm. et Schleg.) (Poiss.). Lac Biwce (Japon). *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 581.

Leptocreadium Y. Ozaki. *Allocreadiidæ*. Espèce type : *L. Skrjabini* Y. Ozaki. *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 513.

Leptocreadium Skrjabini Y. Ozaki. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Cantherines modestus* (Günther) (Poiss.). Japon. *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 513.

Pulchrosomoides Freitas et Lent. *Omphalometrinæ*. Espèce type : *P. elegans* Freitas et Lent. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 55.

Pulchrosomoides elegans Freitas et Lent. *Omphalometrinæ*. Estomac. *Iguana tuberculata* (Laur.) (Rept.). Porto Esperança, Matto Grosso, Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXII, 1937, p. 56.

Leptocreadium vitellosum Y. Ozaki. *Allocreadiidae*. Intestin. *Goniistius zonatus* Cuv. Val. (Poiss.). Japon. *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 514.

Hypocreadium Y. Ozaki. *Allocreadiidae*. Espèce type : *H. symmetrorchis* Y. Ozaki. *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 514.

Hypocreadium symmetrorchis Y. Ozaki. *Allocreadiidae*. Intestin. *Monacanthus cirrhifer* Temm. et Schleg. (Poiss.). Japon. *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 514.

Metagonimus katuradai Matsunosuke Izumi. *Heterophyidae*. Metacercarie enkystée sur écailles, nageoires et dans tissu sous-cutané. *Acheilognathus lanceolatus intermedius* (Temm. et Schleg.), *Pseudorasbora parva* (Temm. et Schleg.) et *Zacco platypus* (Temm. et Schleg.) (Poiss.). Rivière Shoka (Japon). Adulte expériment. dans intest. souris, rat blanc, lapin, chien, chat et homme. *Kitasato Arch. of experim. medicine*, XII, 1935, p. 379.

Encyclometra asymmetrica F. G. Wallace. *Lepodermatidae*. Estomac et œsophage. *Natrix piscator* (Schneider), *N. stolata* (L.), *Enhydria chinensis* (Gray), *E. plumbea* (Boie), *Ptyas konos* (Schlegel), *P. mucosus* (L.) (Rept.). Metacercarie enkystée dans les muscles : *Rana limnocharis* Gravenh. et *Ooeidozyga lima* (Gravenh.) (Batr.). Canton (Chine). *Lingnan Science Journal*, XV, 1936, p. 357.

Saphedera cantonensis F. G. Wallace. *Lepodermatidae*. Poumon. *Natrix piscator* (Schneid.) (Rept.). Canton (Chine). *Lingnan Science Journal*, XV, 1936, p. 355.

Cyathocotyle calvusi S. C. Verma. *Cyathocotylidae*. Intestin. *Torgos calvus* (Ois.). United Provinces (Inde). *Nature*, London, CXXXVIII, n° 3492, 1936, p. 589.

Polystoma rhacophori S. Yamaguti. *Polystomatidae*. Vessie urinaire. *Rhacophorus schlegeli arborea* (Batr.). Kurama près Kyoto (Japon). *Japan. Journ. of Zoology*, VI, 1936, p. 553.

Halipegus japonicus S. Yamaguti. *Halipegidae*. Sous la langue. *Rana nigromaculata* Hallowell (Batr.). Nagano Prefecture et Kyoto (Japon). *Japan Journ. of Zoology*, VI, 1936, p. 561.

Gorgoderia japonica S. Yamaguti. *Gorgoderidae*. Vessie urinaire. *Rana nigromaculata* Hallowell (Batr.). Kamisuwa (Nagano Prefecture, Japon). *Japan. Journ. of Zoology*, VI, 1936, p. 563.

Pleurogenes japonicus S. Yamaguti. *Lecithodendriidae*. Intestin grêle. *Rana nigromaculata* Hallowell (Batr.). Fukuoka Prefecture (Japon). *Japan. Journ. of Zoology*, VI, 1936, p. 571.

Metorchis intermedius E. Heinemann. *Opisthorchiidae*. Rédie et cercarie lophocercue chez *Bithynia tentaculata* (Moll.). Kurisches Haff (Prusse orientale). Metacercarie enkystée expériment. dans musculature, *Cobitis taenia* (Poiss.). Adulte expériment. vésicule biliaire *Anas boschas domest.* (Ois.). *Ztschr. f. Parasitenkunde*, IX, 1937, p. 259.

Brachycoelium mesorchium E. E. Byrd. *Brachycoeliidae*. Intestin grêle. *Desmognathus fuscus fuscus* (Batr.). Atheus (Georgia, U. S. A.). *Proceed. Un. St. Nat. Mus.*, LXXXIV, n° 3010, 1937, p. 187.

Brachycoelium georgianum E. E. Byrd. *Brachycoeliidae*. Intestin grêle. *Rana*

sphenocephala Cope (Batr.). *Atheus* (Georgia, U. S. A.). *Proceed. Un. St. Nat. Mus.*, LXXXIV, n° 3010, 1937, p. 188.

Brachycoelium ovale E. E. Byrd. *Brachycoeliidæ*. Intestin. *Leiolopisma laterale* (Say) (Rept.). New Orleans et Pearl River (Louisiana, U. S. A.) et Calhoun Falls (South Carolina, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Mus.*, LXXXIV, n° 3010, 1937, p. 190.

Brachycoelium dorsale E. E. Byrd. *Brachycoeliidæ*. Intestin grêle. *Amblystoma opacum* (Gravenhorst) (Batr.). Pearl River (Louisiana, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Mus.*, LXXXIV, n° 3010, 1937, p. 191.

Brachycoelium louisianæ E. E. Byrd. *Brachycoeliidæ*. Intestin grêle. *Amblystoma opacum* (Gravenhorst) (Batr.). Pearl River (Louisiana, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Mus.*, LXXXIV, n° 3010, 1937, p. 193.

Rhipidocotyle transversale A. C. Chandler. *Bucephalidæ*. Métacercaire enkystée paroi intestin. *Menidia menidia* (Poiss.). Galveston Bay (Texas, U. S. A.). *Proceed. Un. St. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 126.

Lecithochirium microstomum A. C. Chandler. *Hemiuridæ*. Estomac. *Trichiurus lepturus* (Poiss.). Galveston Bay (Texas, U. S. A.). *Proceed. Un. St. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 127.

Diplostome (gen. ?) *medusæ* G. Dubois. *Proterodiplostomidæ*. Intestin. *Jacarelinga crocodilus* (L.) (Rept.). Brésil. *Bull. Soc. neuchâteloise Sc. nat.*, LXI, 1936, p. 75.

Kaurma orientalis S. Yamaguti. *Allocreadiidæ*. Intestin. *Amyda japonica* (Temm. et Schleg.) (Rept.). Corée. *Japan. Journ. Zoology*, VII, 1937, p. 505.

Flagellotrema Y. Ozaki. *Gyliauchenidæ*. Espèce type : *F. convolutum* Y. Ozaki. *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 953.

Flagellotrema convolutum Y. Ozaki. *Gyliauchenidæ*. Rectum. *Xesurus scalprum* (Cuv. et Val.) (Poiss.). Japon. *Zoolog. Magazine* (Tokyo), XLVIII, 1936, p. 951.

Bucephalopsis ozakii Nagaty. *Bucephalidæ*. Nomen novum (syn. *B. ovalis* Ozaki 1928, nec Linton 1900). *The Egyptian University. Faculty of Medicine, Publ.* n° 12, 1913, p. 47.

Bucephalopsis southwelli Nagaty. *Bucephalidæ*. Tube digestif. *Belone strongylurus* et *Mugil* sp. (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine, Publ.* n° 12, 1937, p. 49.

Bucephalopsis lenti Nagaty. *Bucephalidæ*. Tube digestif. *Belone strongylurus* (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine, Publ.* n° 12, 1937, p. 53.

Bucephalopsis longicirrus Nagaty. *Bucephalidæ*. Tube digestif. *Sphyræna agam* (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine, Publ.* n° 12, 1937, p. 57.

Bucephalopsis megacetabulus Nagaty. *Bucephalidæ*. Tube digestif. *Belone choram* (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine, Publ.* n° 12, 1937, p. 61.

Rhipidocotyle khalili Nagaty. *Bucephalidæ*. Tube digestif. *Chanos chanos* (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine, Publ.* n° 12, 1937, p. 81.

Rhipidocotyle eckmanni Nagaty. Bucephalidæ. Tube digestif. *Trachynotus bailloni* (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine*, Publ. n° 12, 1937, p. 86.

Prosorhynchus freitasi Nagaty. Bucephalidæ. Tube digestif. *Serranus guttatus* (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine*, Publ. n° 12, 1937, p. 114.

Neidhartia Nagaty. Bucephalidæ. Espèce type : *N. neidharti* Nagaty. *The Egyptian University. Faculty of Medicine*, Publ. n° 12, 1937, p. 118.

Neidhartia neidharti Nagaty. Bucephalidæ. Tube digestif. *Serranus* sp. (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine*, Publ. n° 12, 1937, p. 118.

Neidhartia ghardagae Nagaty. Bucephalidæ. Tube digestif. *Serranus* sp. p. (Poiss.). Ghardaga (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine*, Publ. n° 12, 1937, p. 125.

Alcicornis baylisi Nagaty. Bucephalidæ. Tube digestif. *Caranx* sp. (Poiss.). Koseir (Egypte). *The Egyptian University. Faculty of Medicine*, Publ. n° 12, 1937, p. 133.

Psilorchis G. S. Thapar et M. B. Lal. *Psilostomatidæ*. Espèce type : *P. indicus* G. S. Thapar et M. B. Lal. *Proc. Indian Acad. of Sciences*, II, 1935, p. 91.

Psilorchis indicus G. S. Thapar et M. B. Lal. *Psilostomatidæ*. Intestin. « Kingfisher » (Ois.). Lucknow (Inde). *Proc. Indian Acad. of Sciences*, II, 1935, p. 88.

Chinhuta M. B. Lal. *Schistosomatidæ*. Espèce type : *C. indica* M. B. Lal. *Proc. Indian Acad. of Sciences*, VI, 1937, p. 279.

Chinhuta indica M. B. Lal. *Schistosomatidæ*. Vaisseaux sanguins et organes internes. *Nettion crecca* (Ois.). Chinhut Lake (région de Lucknow, Inde). *Proc. Indian Acad. of Sciences*, VI, 1937, p. 275.

Gigantobilharzia egreta M. B. Lal. *Schistosomatidæ*. Veine rénale. *Bubulcus ibis coromandus* (Ois.). Inde. *Proc. Indian Acad. of Sciences*, VI, 1937, p. 280.

Ostiolum mehrai B. S. Gogate (1). *Lepodermatidæ*. Vésicule biliaire et canaux biliaires. *Ptyas korros* (Schlegel) et *P. mucosus* L. (Rept.). Rangoon (Birmanie). *Records Indian Museum*, XXXVII, 1935, p. 455.

Metagonimus katsuradai M. Izumi. *Heterophyidæ*. Kystes métacercariens fixés aux écailles, nageoires, branchies et dans tissu sous-cutané. *Acheilognathus lanceolata intermedia* (Temm. et Schleg.), *Pseudorasbora parva* (Temm. et Schleg.), *Zaccoplatus* (Temm. et Schleg.) (Poiss.). Hyogo Prefecture (Japon). Adulte expériment. dans intestin grêle de souris, souris blanche, lapin, rat, jeune chien, chat, homme. *Kitasato Arch. of exper. med.*, XII, oct. 1935, p. 379 et *Tokyo Iji Shinshi*, n° 2929, mai 1935, p. 1233 (en japonais).

Cleidodiscus incisor J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Helioperca incisor* (Poiss.). Illinois River, Lacs Chantangua, Horseshoe, Decatur et Senachwine (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 790.

(1) Cf. *Annales de Parasitologie*, XIV, 1936, p. 302.

Cleidodiscus capax J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Pomoxis annularis* (Poiss.), Lac Dekatur et Illinois River. *Pomoxis sparoides* (Poiss.). Lac Senachwine et Illinois River (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 791.

Cleidodiscus longus J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Pomoxis annularis* (Poiss.). Lac Dekatur (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 793.

Cleidodiscus uniformis J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Pomoxis annularis* (Poiss.). Lac Dekatur (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 794.

Cleidodiscus vancleavei J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Pomoxis annularis* (Poiss.). Lac Dekatur (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 795.

Cleidodiscus articularis J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Xenotis megalotis* (Poiss.). Embarrass River (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 796.

Cleidodiscus bedardi J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Xenotis megalotis* (Poiss.). Embarrass River (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 797.

Onchocleidus principalis J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Micropterus pseudaplites* (Poiss.). Big Vermilion River (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 798.

Onchocleidus interruptus J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Morone interrupta* (Poiss.). Lacs Decatur et Senachwine (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 799.

Onchocleidus mucronatus J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Helioperca incisor*, *Allotis humilis*, *Eupomotis gibbosus* et hybrides *Allotis h.* $\times$ *Eupomotis g.* et *Helioperca i.* $\times$ *Eupomotis g.* (Poiss.). Lac Senachwine (Illinois). *Helioperca i.* Lac Decatur et State Natural History Survey Pond, Urbana (Illinois). *Allotis h.* Vermilion River (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 800.

Onchocleidus acuminatus J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Xenotis megalotis* (Poiss.). Embarrass River (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 802.

Onchocleidus distinctus J.-D. Mizelle. *Gyrodactylidæ*. Branchies. *Xenotis megalotis* (Poiss.). Embarrass River (Illinois). *American Midland Naturalist*, XVII, 1936, p. 803.

R.-Ph. DOLLFUS.

Cestodes

Paricterotaenia cirrospinosa S. S. Patwardhan. *Dilepididæ*. Intestin. « Snipe » (Oiseau). Manipur (U. P. Inde). *Zoolog. Jahrbücher System.*, LXVI, 1935, p. 541.

Choanotaenia manipurensis S. S. Patwardhan. *Dilepididæ*. Intestin. « Snipe » (Oiseau). Manipur (U. P. Inde). *Zoolog. Jahrbücher System.*, LXVI, 1935, p. 545.

Pseudhymenolepis Joyeux et Baer. *Hymenolepididae*. Espèce type : *Predonica* Joyeux et Baer. C. R. Soc. biol., CXXX, 1935, p. 336.

Pseudhymenolepis redonica Joyeux et Baer. *Hymenolepididae*. Intestin. *Crocodyrus russula* (Mamm.). Haute-Savoie et environs de Paris. C. R. Soc. biol., CXX, 1935, p. 336.

Crepidobothrium olor L. G. Ingles. *Proteocephalidae*. Intestin. *Rana aurora* (Batr.). Berkeley (Californie). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 84.

Phyllobothrium magnum J. F. Hart. *Phyllobothriidae*. Tube digestif. *Somniosus microcephalus* (Bloch Schneider) (Poiss.). Puget Sound (Washington, U. S. A.). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 489.

Echeneibothrium myzorhynchum J. F. Hart. *Phyllobothriidae*. Valvule spirale. *Raja binoculata* Girard (Poiss.). Puget Sound (Washington, U. S. A.). *Transact. American Microscop. Soc.*, LV, 1936, p. 492.

Raillietina ozakensis S. Iwata et O. Tamura. *Davaineidae*. Intestin. Canard domestique. Japon. *Annalationes zoolog. japon.*, XIV, 1933, p. 4.

Tentacularia lepida A. C. Chandler (1). *Tetrarhynchidae*. Plerocercus enkisté sur mésentère. *Galeichthys felis* (Poiss.). Galveston Bay (Texas, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 179.

Proteocephalus australis A. C. Chandler. *Proteocephalidae*. Intestin. *Lepisosteus osseus* (Poiss.). Galveston Bay (Texas, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 135.

Proteocephalus elongatus A. C. Chandler. *Proteocephalidae*. Intestin. *Lepisosteus osseus* (Poiss.). Galveston Bay (Texas, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 137.

Glossocercus A. C. Chandler. *Dilepididae* (?). « New collective group of tapeworm larvae ». Espèce type : *G. cyprinodontis* Chandler. *Proceed. U. S. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 139.

Glossocercus cyprinodontis A. C. Chandler. *Dilepididae* (?). Larve dans cavité du corps. *Cyprinodon variegatus* (Poiss.). Galveston Bay (Texas, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 140.

Cysticercoides menidia A. C. Chandler. Famille ? Paroi intestinale et mésentères. *Menidia menidia* (Poiss.). Galveston Bay (Texas, U. S. A.). *Proceed. U. S. Nat. Museum*, LXXXIII, n° 2977, 1935, p. 141.

Bothriocephalus musculosus J. G. Baer. *Bothriocephalidae*. Tube digestif. *Cichlosoma biocellata* Regan (Pois.). Aquarium Université Genève. *Bull. soc. nat. d'Acclimatation de France*, LXXXIV, 1937, p. 171.

Proteocephalus (Ophiotaenia) phillipsi D. R. R. Burt. *Proteocephalidae*. Intestin. *Trimeresurus trigonocephalus* (Drudin) (Rept.). Mousakande, Gam-

(1) Cette larve n'appartient certainement pas au genre *Tentacularia* Bosc.

Dans la même publication, A. C. Chandler (1935, p. 130-132, pl. VIII fig. 1-4) rapporte à *Gymnorhynchus gigas* (Cuvier 1817) un autre plerocercus, appartenant à la famille des *Pterobothriidae*, qui est totalement étrangère au genre *Gymnorhynchus* et à l'espèce *gigas* ; de même le plerocercus rapporté à *Gymnorhynchus molleus* (Linton) par Chandler (ibid. p. 132-133, pl. VIII fig. 5-6) appartient aux *Pterobothriidae* et non aux *Gymnorhynchidae*.

madwa (Ceylan). *Ceylon Journ. of Science*, Sect. B. *Spolia Zeylanica*, XX, 1937, p. 157.

Proteocephalus (Ophiotaenia) rhabdophidis D. R. R. Burt. *Proteocephalidæ*. Intestin. *Rhabdophis stolata* (L.) (Rept.). Avissawella (W. P. Ceylan). *Ceylon Journ. of Science*, Sect. B. *Spolia Zeylanica*, XX, 1937, p. 167.

Oochoristica ratti S. Yamaguti et I. Miyata. *Anoplocephalidæ*. Intestin grêle. *Rattus r. rattus* et *R. r. alexandrinus* (Mamm.). A bords de bateaux japonais des lignes de Formose et Shangai. *Japanese Journal of Zoology*, VII, 1937, p. 501.

Tetrabothrius lari S. Yamaguti. *Tetrabothriidæ*. Intestin grêle. *Larus canus major* Midd. (Ois.). Kuki (Préf. de Mié, Japon). *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 184.

Cotugnia meggiti S. Yamaguti. *Davaineidæ*. Nom. nov. (1) pro *C. cuneata* var. *nervosa* Meggit 1924. *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 186.

Cotugnia taiwanensis S. Yamaguti. *Davaineidæ*. Intestin grêle. *Columba livia domest.* (Ois.). Formose. *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 188.

Raillietina (Raillietina) pici S. Yamaguti. *Davaineidæ*. Intestin grêle. *Picus awokera awokera* Temm. (Ois.). Nagano Prefect. (Japon). *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 189.

Raillietina (Raillietina) galli S. Yamaguti. *Davaineidæ*. Intestin grêle. *Gallus domesticus* (Ois.). Kuki (Préf. de Mié, Japon). *Japanese Journal Zool.*, VI, 1935, p. 191.

Raillietina (Raillietina) taiwanensis S. Yamaguti. *Davaineidæ*. Intestin grêle. *Columba livia domest* (Ois.). Formose. *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 194.

Killigrewia ænopopeliæ S. Yamaguti. *Anoplocephalidæ*. Intestin grêle. *Ænopopelia tranquebarica humilis* (Ois.). Formose. *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 196.

Killigrewia streptopeliæ S. Yamaguti. *Anoplocephalidæ*. Intestin. *Streptopelia chinensis formosa* (Kuroda) (Ois.). Formose. *Japanese Journ. of Zoology*, VI, 1935, p. 197.

Paronia pycnonoti S. Yamaguti. *Anoplocephalidæ*. Intestin grêle. *Pycnonotus sinensis formosæ* (Ois.). Formose. *Japanese Journ. Zoology*, VI, 1935, p. 200.

Dilepis turdi S. Yamaguti. *Dilepididæ*. Intestin grêle. *Turdus aureus aureus* (Ois.). Aiti Prefecture (Japon) *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 202.

Dilepis capellæ S. Yamaguti. *Dilepididæ*. Intestin grêle. *Capella solitaria* (Hodgson) (Ois.). Japon. *Japanese Journ. Zool.*, VI, 1935, p. 203.

R.-Ph. D.

(1) Ce *nomen novum* ne semble pas acceptable : s'il s'agit d'une espèce indépendante de *C. cuneata* F. J. Meggitt 1924 (*C. cuneata tenuis* Meggitt 1924), elle doit s'appeler *C. nervosa* F. J. Meggitt 1924.

Le Gérant : F. AMIRAULT.