ANNALES DE PARASITOLOGIE

HUMAINE ET COMPARÉE

TOME XVI

1^{er} NOVEMBRE 1938

N° 6

MÉMOIRES ORIGINAUX

ANNALES
DE
PARASITOLOGIE

NOUVELLES RECHERCHES DE ZYMOLOGIE MÉDICALE

Par Maurice LANGERON et Paul GUERRA

DEUXIÈME PARTIE

ETUDES MONOGRAPHIQUES SUR LES MYCOTORULOIDÉES

(Suite)

LE GENRE *Candida* BERKHOUT 1923

(Suite et fin)

V. GROUPE *KRUSEI*

Les quatre groupes précédents (*albicans*, *tropicalis*, *pseudotropicalis*, *guilliermondi*) sont formés de levures zymato-oxidasi-ques (voir plus haut, p. 82), c'est-à-dire possédant, outre le complexe zymase, des hydrolases oxidasiques, leur permettant de dédoubler et de faire fermenter des diholosides et triholosides.

Nos 5^e et 6^e groupes vont comprendre les levures *zymatiques simples*, c'est-à-dire ne possédant que le complexe zymase, donc incapables de dédoubler les di- ou triholosides. Ces levures forment donc deux groupes, l'un faisant fermenter nettement le glycose et le lévulose (groupe *krusei*), l'autre à pouvoir fermentatif très faible, faisant à peine fermenter le glycose et très peu ou pas du tout le

ANNALES DE PARASITOLOGIE, T. XVI, N° 6. — 1^{er} nov. 1938, p. 481-525. 32.

PUBLICATION PÉRIODIQUE PARAISSANT TOUS LES DEUX MOIS.

lévulose (groupe *brumpti*) ; ce dernier groupe semble former passage aux levures proprement azymatiques.

1. Elements morphologiques. — A. *Filamentisation* en général très facile sur tous milieux (sauf pour *C. aldoi*).

B. *Blastospores* plus ou moins nombreuses, de formes variant suivant les espèces, quelquefois dimorphes.

C. *Chlamydospores* absentes.

D. *Pseudoconidies* rares.

2. Zymogramme. — Positif pour *glycose* et *lévulose* ; négatif pour tous les autres sucres.

3. Auxanogramme des sucres. — Ne suit pas le zymogramme sauf pour *C. krusei*.

4. Auxanogramme de l'azote très caractéristique. — Nette-ment positif pour l'urée pour *C. krusei* ; négatif pour l'urée pour les deux autres espèces.

5. Eléments systématiques. — Trois espèces :

C. krusei (Cast. 1910).

C. parakrusei (Cast. 1912).

C. aldoi Pereira 1927.

CANDIDA KRUSEI (Castellani 1910, p. 197) Berkhout 1923, p. 43 ;

C. W. Dodge 1935, p. 231

1910 *Saccharomyces krusei* Castellani 1910, p. 197.

1911 *Enantiothamnus brautli* Pinoy 1911 *apud* Brault et Masselot 1911, p. 592.

1912 *Cryptococcus lesieuri* Beauverie 1912, p. 994.

Endomyces intestinalis Castellani 1912, p. 1208.

E. nitidus Castellani 1912, p. 1208.

1913 *Endomyces blanchardi* Castellani 1913, p. 184.

1919 *Monilia balcanica* Castellani et Chalmers 1919, p. 1090.

M. parabalcanica Castellani et Chalmers 1919, p. 1090.

M. londinensis Castellani et Chalmers 1919, p. 1084.

1921 *M. enterocola* Macfie 1921, p. 275.

M. africana Macfie 1921, p. 275.

1926 *M. dissocians* Mattlet 1926, p. 24.

M. tonge Mattlet 1926, p. 22.

1930 *M. inexpectata* Mazza, Niño et Egüez 1930, p. 284.

1931 *Candida krusei* (Castellani 1910) Basgal 1931, p. 50.

1932 *Geotrichoides krusei* (Castellani 1910) Langeron et Talice 1932, p. 67.

- Blastodendron braulti* (Pinoy 1911) Langeron et Talice 1932, p. 62.
- 1934 *Mycocandida inexpectata* (Mazza, Niño et Egüez 1930) Talice et Mackinnon 1934 (1).
- 1935 *Trichosporum dendriticum* Ciferri et Redaelli 1935, p. 58.
- Syringospora braulti* (Pinoy 1911) C. W. Dodge 1935, p. 277.
- S. tonge* (Mattlet 1926) C. W. Dodge 1935, p. 278.
- Castellania orticoni* C. W. Dodge 1935, p. 261.
- C. lesieuri* (Beauverie 1912) C. W. Dodge 1935, p. 249.
- C. intestinalis* (Castellani 1912) C. W. Dodge 1935, p. 253.
- C. nitida* (Castellani 1911) C. W. Dodge 1935, p. 261.
- C. balcanica* (Castellani et Chalmers 1919) C. W. Dodge 1935, p. 249.
- C. parabalcanica* (Castellani et Chalmers 1919) C. W. Dodge 1935, p. 249.
- C. africana* (Macfie 1921) C. W. Dodge 1935, p. 262.
- C. dissocians* (Mattlet 1926) C. W. Dodge 1935, p. 250.
- C. londinensis* (Castellani et Chalmers 1919) C. W. Dodge 1935, p. 252.
- Pseudomonilia inexpectata* (Mazza, Niño et Egüez 1930) C. W. Dodge 1935, p. 296.
- Candida urinæ* C. W. Dodge 1935.
- Parendomyces blanchardi* (Castellani 1913) C. W. Dodge 1935, p. 243.
- P. enterocola* (Macfie, 1921) C. W. Dodge 1935, p. 245.
- Trichosporum krusei* (Castellani 1910) Ciferri et Redaelli 1935, p. 19 et 58.
- 1937 *Monilia krusoides* Castellani 1937, p. 304.

SOUCHES ÉTUDIÉES

1° Souches nommées

- Monilia krusei* (Castellani 1910). — Souche Curzi I, communiquée par Redaelli, août 1930. — *Souche 632 A*.
- Souche Ashford, de Porto-Rico, août 1928. — *Souche 339 A*.
- Souche originale de Castellani, provenant du Ross Institute de Londres, mars 1931. — *Souche 683 A*.
- Souche originale de Castellani, novembre 1937. — *Souche 770 B*.
- Monilia krusoides* Castellani. — Souche originale de Castellani, novembre 1937. — *Souche 771 B*.
- Monilia inexpectata* Mazza, Niño et Egüez 1930. — Souche Talice et Mackinnon n° 474. — *Souche 560 B*.

(1) A la page 53 du tome XVI de ces *Annales*, nous avons indiqué qu'une souche de *Monilia inexpectata*, étudiée par Talice et Mackinnon (1934), avait donné des ascospores du type *Saccharomyces*. Il s'agit d'une souche différente de celle qui est étudiée ici et qui porte, dans notre registre, le n° 560 B. Cette souche, actuellement morte, a bien présenté tous les caractères de *C. krusei* et n'a jamais donné d'ascospores.

Trichosporum dendriticum Ciferri et Redaelli 1935. — Souche originale de Redaelli n° 6. — Souche 584 B.

2° Souches non nommées

Souche Panayotatou (Alexandrie), décembre 1931. — Souche 161 B.

Souche D.C.L., Londres (levure H), mai 1932. — Souche 202 B.

Souche Gaultier (Montréal), mai 1933, provenant de fistules de la bouche, des joues et du cou chez un jeune homme de 20 ans. — Souche 275 bis B (cette souche de *krusei* était mélangée, dans la souche originale, à un *Candida albicans*).

Souche Ciarrochi, cas Andreoli Felice, Rome, juillet 1935. — Souche 530 B.

Souche Morenas, Lyon ; levure isolée d'un ulcère de l'estomac. — Souche 646 B.

Souche Tournant, cas Vaillant, levure isolée des crachats chez une jeune fille suspecte de tuberculose. — Souche 575 B.

Souche de Baarn, levure B du cacao. — Souche 214 B (= 738 A).

Souche Rouyer (Institut du radium, Paris) isolée d'une langue noire, n° 514 bis (8Q7 K, B).

Pour Shrewsbury (1934), *C. krusei* serait tout à fait différent des « *Monilia* » de Castellani et devrait former un genre à part. Cette opinion nous paraît exagérée : nous considérons aussi *C. krusei* comme un type parfaitement distinct et facile à reconnaître, mais nous avons vainement cherché, dans la mémoire de Shrewsbury, les arguments sur lesquels cet auteur peut s'appuyer pour séparer aussi complètement cette espèce des autres *Candida*. Notre description montre que les caractères macroscopiques de la filamentisation, du voile, de l'anneau, ainsi que la morphologie microscopique et la biologie de *C. krusei* sont exactement parallèles aux mêmes caractères chez les autres *Candida* et rentrent dans la même diagnose générique.

D'ailleurs, Shrewsbury ne reconnaît que deux groupes de « *Monilia* » : ceux qui font fermenter le saccharose (*tropicalis-candida*) et ceux qui ne font pas fermenter ce sucre (*albicans-psilosis-pinoyi*) ; *krusei* est placé en dehors, arbitrairement à notre avis. Quant aux autres types, dont l'importance et la netteté ne sont pas moindres (*parakrusei*, *pseudotropicalis*, *guilliermondi*, *zeylanoides-macroglossæ*, etc.), ils sont simplement méconnus.

Aux remarques qui ont été faites à propos de *C. albicans* (voir plus haut, p. 446-447), nous ajouterons d'autres annotations concernant *C. tropicalis* et *C. krusei*. Les descriptions et figures de Shrewsbury ne sont pas exactement comparables aux nôtres parce qu'elles ont trait à des cultures sur extrait de malt liquide ou gélosé. C'est probablement ce qui explique pourquoi la colonie géante de *C. krusei* (fig. 26, pl. XLIX et 31, pl. L) est fortement plissée au centre et pourquoi celles de *C. tropicalis*

(fig. 25, pl. XLIX et 30, pl. L) ne montrent pas la zone crémeuse que nous considérons comme caractéristique : ces figures, ainsi d'ailleurs que toutes les colonies géantes représentées dans ce mémoire, nous paraissent constituer des exceptions par rapport aux colonies que nous obtenons régulièrement sur nos milieux « standard » peptonés et glycosés. A noter aussi la fig. 13 de la pl. XLVI, représentant la germination d'une chlamydospore attribuée à *M. candida* souche Chapman (? = *tropicalis*), sur betterave après 34 jours. Il n'est pas impossible, *a priori*, qu'un *tropicalis* donne des chlamydospores, mais ce n'est pas la règle avec nos milieux, sur lesquels nous n'avons jamais observé cet organe en dehors du groupe *albicans* (à moins que la souche Chapman ne soit simplement un *albicans* ?).

Enfin, voici les remarques que nous suggèrent les quatre propositions qui résument le mémoire de Shrewsbury :

1. « Les *Monilia* vrais n'ont rien à voir avec les *Monilia* de Castellani ». C'est tout à fait notre avis, mais Langeron et Talice l'avaient déjà amplement démontré dès 1932 (1932, p. 34-37).

2. « La conception de Castellani de la pluralité des espèces ne concorde pas avec les résultats de l'étude de certaines de ces espèces ».

Nous pensons aussi que les espèces ont été beaucoup trop multipliées, comme le montrent nos longues listes de synonymes ; mais les types des grands groupes fermentatifs restent bien individualisés par Castellani.

3. « *M. krusei* n'est pas à sa place dans le genre *Monilia* (*sensu* Castellani) ». Pour nous, non seulement *krusei* est une espèce parfaitement distincte, mais en outre rien ne la sépare des autres *Candida*.

4. « Le genre *Monilia* (*sensu* Castellani) comprend au moins deux espèces distinctes (en dehors de *M. krusei*) ». Nous pensons que réduire le genre *Candida* à deux espèces serait méconnaître les autres grands types castellaniens, si nets et si faciles à reconnaître en suivant notre méthode, qui permet actuellement de séparer six grands groupes comprenant en tout 15 espèces valables.

Historique. — Espèce isolée à Ceylan par Castellani en 1910, de crachats de malades atteints de bronchite chronique. Cette levure a été retrouvée très fréquemment dans la suite, comme le montre son abondante synonymie.

C'est en général plutôt une levure intestinale, très fréquente même chez des sujets sains.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Colonies d'un blanc éclatant et mat, crémeuses, lisses, à bords découpés et irréguliers. Ces colonies ne sont pas convexes et s'accroissent très rapidement en surface.

Filamentisation. — Les colonies s'entourent de filaments, mais ceux-ci ne forment pas une couronne régulière car ils partent de points quelconques, même dans les colonies inférieures. Ces filaments sont en général très longs et, *caractère extrêmement important*, ils courent à la surface du milieu qui perd à leur niveau son aspect brillant habituel et ils ne s'enfoncent pas dans la profondeur ou très rarement.

Quelques souches peuvent présenter des irrégularités de surface ou de petits mamelons (souche 683 A, fig. 1, pl. XXXII, de droite à gauche, 2° tube), mais ce fait est rare.

En milieu fortement peptoné (10 p. 100), les colonies peuvent devenir entièrement membraneuses et se hérissier de pointes en mèches, formées par des coremiums (fig. 3, pl. XXXII), mais des faits de cet ordre sont rares.

Il est important de signaler que dès qu'une colonie atteint l'eau de condensation qui se trouve au fond du tube, il se forme immédiatement un voile et un anneau qui peut remonter assez haut (fig. 1, pl. XXXII).

En somme, la colonie de *C. krusei* est suffisamment caractéristique pour permettre à un œil exercé de faire à sa seule vue un diagnostic presque certain.

Les autres levures à colonies mates (*Hansenula anomala*, divers *Mycoderma*, etc.) ne présentent pas ces longs filaments très dégagés qui courent à la surface du milieu.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Au bout de 24-48 heures, apparition d'un voile blanc, aéré, lisse ou plissé et d'un anneau très haut (6-7 mm.), à bord supérieur festonné.

Par agitation du tube, le voile tombe en partie au fond, mais il reste toujours à la surface une pellicule formée de cellules qui flottent et ne peuvent pas s'immerger.

3. Liquide de Raulin. — Voile moins net, apparaissant plus tardivement.

4. Alcool à 3 p. 100. — Voile semblable à celui qui se développe en milieu glycosé liquide. Dépôt abondant, témoin d'une croissance luxuriante.

5. Lait tournesolé. — Pas de changement.

II. Morphologie microscopique

Le caractère le plus frappant de cette levure, dans les étalements, est que les blastospores sont toutes allongées et assez grandes. La

filamentisation est très facile sur tous les milieux, ce que fait déjà prévoir la filamentisation macroscopique des colonies.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — *Positif* pour : *glycose* et *lévulose* ; *négatif* pour : maltose, lactose, saccharose, galactose, raffinose.

Auxanogramme des sucres. — *Positif* pour : *glycose* et *lévulose* ; *négatif* pour : maltose, lactose, saccharose, galactose, raffinose.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : *urée*, peptone, asparagine, histidine, glycolle, tryptophane, sulfate d'ammonium ; *négatif* pour : nitrate de potassium.

Avec cette espèce, les phénomènes d'élection et d'assimilation sont très nets et les disques très opaques, par suite du développement en surface.

LECTURE DES PLANCHES

C. krusei, dans les cultures sur lames, peut se présenter sous trois aspects : *Mycotorula*, *Mycotoruloides* et *Mycocandida*.

La fig. 2, pl. XXV (culture sur lame de 15 jours à 25° sur gélose glycosée à 6 p. 100) montre les deux premiers aspects réunis sur le même filament (souche 339 A). En effet, dans la partie inférieure du champ, on voit des verticilles globuleux, régulièrement espacés, donnant l'aspect *Mycotorula* typique. Dans la partie supérieure du champ, les verticilles deviennent composés (*Mycotoruloides*) et donnent naissance à des rameaux latéraux. On remarquera que, dans les verticilles globuleux, les blastospores sont arrondies, tandis qu'elles sont allongées dans les parties *Mycotoruloides*.

L'aspect *Mycotorula* est très fréquent dans les cultures sur milieux riches en glycose (6 p. 100). On peut même dire que sur ce milieu, étalé en lames assez épaisses, c'est *C. krusei* qui donne les formes *Mycotorula* les plus typiques.

La fig. 1, pl. XXV montre à un plus fort grossissement un fragment de la partie haute de la préparation précédente (fig. 2, pl. XXV). On voit les blastospores très allongées, disposées en verticilles composés et, malgré la longueur des filaments axiaux, on se rend bien compte qu'il s'agit d'un pseudo-mycélium.

La fig. 3, pl. XXV (culture de 15 jours à 25° sur gélose glycosée à 2 p. 100) (souche 683 A) montre encore plus nettement l'aspect *Mycotoruloides*.

La fig. 4, pl. XXV (souche 202 B, culture sur milieu PC à 37°)

représente un arbuscule de la forme *Mycocandida* à rameaux très allongés et verticilles pauvres à la base, avec des blastospores un peu moins longues. C'est cet aspect qui a trompé Talice et Mackinnon et les a fait ranger dans le genre *Mycocandida*, comme espèce valable, le *Monilia inexpectata* de Mazza, Niño et Egües 1930, alors que ce champignon présente tous les caractères biologiques du *C. krusei*.

Il faut noter aussi que, lorsque cette espèce se développe sur des lames où la couche de gélose est trop mince ou lorsque le milieu est trop sec, les verticilles ne peuvent pas se développer normalement et s'aplatissent ; les blastospores, qui sont très caduques, tombent et le pseudo-mycélium se corémie. C'est probablement ce qui explique l'attribution au moins inattendue de cette espèce au genre *Trichosporum* par Ciferri et Redaelli (1935), sous le nom de *T. dendriticum*. Pourtant, on voit parfaitement, dans les microphotographies publiées par ces auteurs, qu'il s'agit d'un *Candida* des plus typiques. Les longues blastospores de *C. krusei* sont en outre bien reconnaissables, ainsi que l'aspect de la colonie géante.

Une partie des confusions qui se sont produites au sujet de cette espèce, pourtant bien caractérisée et facile à reconnaître, vient d'un accident arrivé au cours des recherches de Langeron et Talice (1932). Ces auteurs ont travaillé avec une souche de *C. tropicalis* qui leur avait été envoyée sous le nom de *Monilia krusei* (souche 267 que nous avons mentionnée en étudiant *C. tropicalis*). Il en résulte que leur description du genre *Geotrichoides* est entièrement à refondre puisqu'elle comporte des espèces telles que *Monilia tumefaciens*, *Candida kephyr*, *C. vulgaris* qui sont, comme nous l'avons vu plus haut, des *C. tropicalis* bien caractérisés.

La première idée qui vient à l'esprit est de se demander pourquoi l'erreur d'étiquette n'a pas été reconnue de suite. A cela il y a plusieurs raisons : la première est que les auteurs avaient confiance dans la détermination de la souche qu'ils avaient reçue ; une seconde raison est qu'ils ont travaillé uniquement par la méthode morphologique et avec une technique rudimentaire. Or, la morphologie de *C. tropicalis* est très variable : les fig. 2, pl. XIX et 1, pl. XX montrent les analogies qu'elle présente quelquefois avec celle de *C. krusei* et justement la souche 267, qui a fourni ces figures est, par une bizarre et malheureuse coïncidence, celle qui ressemble le plus à *C. krusei*. Mais il y a cette différence fondamentale que chez *C. tropicalis* les verticilles sont formés par des *chainettes de pseudoconidies*, tandis que chez *C. krusei* ces verticilles sont constitués par des *blastospores*.

Au cours de notre nouvelle série de recherches, l'erreur a été

reconnue par les épreuves de fermentation et aussi par l'examen de nos cultures sur lames. Ce sont les blastospores allongées caduques et les fragments de pseudo-mycélium trouvés dans les préparations par dissociation qui, pour *C. krusei*, ont été pris pour des arthrospores. Pour *C. tropicalis*, ce sont les cultures sur lait et sur lames gélosées qui nous ont révélé la véritable morphologie de cette espèce.

Cette fâcheuse méprise aura au moins servi à montrer l'insuffisance de la morphologie pour l'étude des champignons levuriformes.

CANDIDA PARAKRUSEI (Castellani 1912) (1)

- 1913 *Monilia parakrusei* Castellani et Chalmers 1913, p. 810.
 1915 *Saccharomyces unguium* Bourgeois 1915, p. 411.
 1919 *Spicaria unguis* P.-E. Weil et Gaudin 1919, p. 461.
 1926 *Monilia onychophila* Pollacci et Nannizzi 1926, *apud* Marengo, 1926, p. 35.
 1928 *Monilia parapsilosis* Ashford 1928, p. 518.
 1931 ? *Myceloblastanion tokioense* Fujii 1931, p. 959.
 1932 *Mycotoruloides unguis* (P.-E. Weil et Gaudin 1919) Langeron et Talice 1932, p. 50 ; C. W. Dodge 1935, p. 291.
Mycocandida onychophila (Pollacci et Nannizzi 1926) Langeron et Talice 1932, p. 58 ; C. W. Dodge 1935, p. 294.
 1933 *Blastodendrion gracile* Zach 1933, p. 103.
B. globosum Zach 1933, p. 99.
 1935 *Schizoblastosporion gracile* (Zach 1933) C. W. Dodge 1935, p. 234.
S. globosum (Zach 1933) C. W. Dodge 1935, p. 234.
 ? *S. tokioense* (Fujii 1931) C. W. Dodge 1935, p. 235.
Castellania unguium (Bourgeois 1915) C. W. Dodge 1935, p. 248.
C. parakrusei (Castellani et Chalmers 1913) C. W. Dodge 1935, p. 261.
Mycocandida parapsilosis (Ashford 1928) C. W. Dodge 1935, p. 294.

SOUCHES ÉTUDIÉES

1° Souches nommées

- Monilia parapsilosis* Ashford 1928. — Souche originale d'Ashford, août 1928. — *Souche 341 A.*
Monilia onychophila Pollacci et Nannizzi 1926. — Souche du Centraal-bureau de Baarn, avril 1930. — *Souche 517 A.*

(1) Date indiquée par l'auteur de l'espèce (1937, p. 304) et *in litt.*

Blastodendrion gracile Zach 1933. — Souche originale de Zach, juillet 1936. — *Souche 586 B.*

Blastodendrion globosum Zach 1933. — Souche originale de Zach, juillet 1936. — *Souche 588 B.*

2° Souches non nommées

Souche Baltazard, squames d'un bœuf, novembre 1930. — *Souche 82 B.*

Souche Duché, dysidrose trichophytique (Hôpital St-Louis), mai 1932. — *Souche 196 B.*

Souches Beron, Sofia (*Blastomyces*), mai 1932. — *Souches 196 B, 197 B et 198 B.*

Souche Mathis, Dakar, cas Bissenty Gomes, mai 1934. — *Souche 390 B.*

Souches Guerra, Hôpital St-Louis.

1. *Souche Guelaire*, onyxis et perionyxis. — *Souche 424 B.*

2 et 3. *Souches Anita (429 B) et Eugénie (430 B)*, ongles sains des mains.

4 et 5. *Souches Canina (432 B) et Flexner (477 B)*, hyperkératose plantaire.

6. *Souche Néret*, névrodermite de l'aîne (*434 B*).

7. *Souche Læby (514 B)*, squames de *pityriasis versicolor*.

Souche L. Brumpt, cathétérisme bronchial. — *Souche 565 B.*

Souches F. de Mello (Nova Goa, Inde portugaise) : n° 2 (*593 B*) ; n° 3 (*594 B*) ; n° 4 (*596 B*).

Souche Langeron (Maroc n° 645), Taffilalet, Goulmima, petite fille faveuse de 3 ans, cuir chevelu. — *Souche 649 B.*

Souche Dumas, onyxis, sillon de l'ongle. — *Souche 798 bis B.*

Historique. — Espèce isolée de crachats par Castellani. Le plus souvent cette levure se rencontre à la surface de la peau, notamment dans le sillon périunguéal où elle est très fréquente, même chez les personnes n'ayant ni onyxis, ni perionyxis, comme l'un de nous a pu le constater fréquemment à l'Hôpital Saint-Louis, à Paris.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. **Gélose glycosée à 2 p. 100.** — Sur ce milieu, les colonies sont très faciles à reconnaître, surtout au bout d'une quinzaine de jours.

Colonies blanches, crémeuses, humides, lisses. Il est très rare d'observer des plissements ou irrégularités à la surface, même dans les milieux fortement peptonés, comme ceux qui ont été employés par Kurotchkin. Les colonies sont parfaitement rondes, moyennement convexes, moins que chez *C. albicans* et plus que chez *C. guilliermondi*.

La couleur est d'un blanc éclatant, mais on peut voir apparaître des secteurs jaunâtres, composés en grande partie d'énormes cellules un peu acido-résistantes (fig. 4, pl. XXXII).

Filamentisation. — Les colonies supérieures sont toujours entourées d'une couronne de filaments très réguliers, assez développés. En les examinant à travers la paroi du tube, dans les endroits qui sont encore humides, on voit nettement et facilement leur forme en arbuscules caractéristiques, tels que Langeron et Talice les ont décrits pour leur genre *Mycocandida*.

Dans les colonies plus âgées (un mois) et lorsque la gélose est sèche, on voit aussi par transparence de longues chaînettes de très gros éléments. Ces chaînettes sont très caractéristiques et n'existent que dans cette espèce : elles sont constituées par des *blastospores géantes*.

En un mot, les colonies sont assez caractéristiques pour permettre dans la plupart des cas une détermination exacte, qui sera confirmée par les autres caractères, microscopiques et biologiques.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — La végétation a lieu pendant les premiers jours sous forme de *dépôt*. Vers le 8^e jour, on voit apparaître un *anneau* complet et bas. Vers le 15^e ou le 20^e jour, on peut voir flotter à la surface quelques îlots très petits, mais ce phénomène est plutôt rare et ne se manifeste que pour quelques souches.

3. Liquide de Raulin. — Ni voile, ni anneau ; le dépôt seul apparaît.

4. Alcool à 3 p. 100. — Ni voile, ni anneau ; seulement un dépôt.

L'apparition d'un anneau et l'absence de voile sont des caractères importants de cette espèce. En effet, les *Candida* appartenant au même groupe par leur zymogramme peuvent être facilement distingués par l'étude de leurs caractères en milieu liquide :

C. krusei donne un voile mycodermique sec en milieu liquide glycosé à 2 p. 100 et en alcool à 3 p. 100 ;

C. brumpti donne un voile muqueux (non aéré), seulement en milieu liquide glycosé à 2 p. 100 ;

C. aldoi ne donne *ni voile, ni anneau*, même après 25 jours, sur aucun de trois milieux liquides.

5. Lait tournesolé. — Non modifié ou seulement un très léger virage au bleu. Nous n'avons pas pu constater l'acidification et la coagulation du lait qui ont servi à Castellani pour distinguer *C. parakrusei* de *C. krusei*. C'est, à notre avis, un caractère à rejeter comme

inexact et provenant probablement de souches souillées par des bactéries.

II. Morphologie microscopique

La filamentisation est facile à obtenir et constante ; elle s'observe très bien dans les tubes. Pour les cultures sur lames, le milieu PC, en atmosphère carbonique non saturée, est celui qui favorise le plus la filamentisation.

L'aspect microscopique de cette levure est caractéristique et correspond assez bien à la définition que Langeron et Talice ont donné de leur genre *Mycocandida*. Néanmoins, cette morphologie n'est pas constante et elle offre de nombreuses anomalies, notamment le dimorphisme des blastospores, dû à l'apparition soudaine de *blastospores géantes*, comme nous le montrera la lecture des planches.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — *Positif* pour : glycose et lévulose (fermentation abondante) ; *négatif* pour : maltose, lactose, saccharose, galactose (1), raffinose.

Auxanogramme des sucres. — *Positif* pour : glycose, lévulose, maltose, galactose, saccharose ; *négatif* pour : lactose et raffinose.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : peptone, asparagine, histidine, glycolle, tryptophane, sulfate d'ammonium ; *négatif* pour : urée et nitrate de potassium.

LECTURE DES PLANCHES

1° *Forme Mycocandida.* — La fig. 3, pl. XXVI (souche 424 B, colonie de 5 jours sur lame sur milieu PC.) montre bien la forme typique *Mycocandida* en « rameau de sapin » avec verticilles pauvres et peu développés de 2-6 blastospores. La ramification est à angle obtus. C'est l'aspect habituel de cette espèce, que la fig. 1, pl. XXVI représente un peu plus développé et touffu, dans une colonie de 8 jours de la même souche sur milieu PC.

2° *Stade des blastospores géantes.* — La fig. 4, pl. XXVI, représente le début de ce stade sur des filaments âgés de 15 jours. Les articles

(1) Quelques souches peuvent, au bout de 2 mois, donner un peu de gaz avec le galactose.

du filament axial deviennent très volumineux et tendent à s'incurver, souvent en sens contraire, comme si le filament subissait une torsion. Les verticilles sont extrêmement réduits.

Les fig. 2, pl. XXVI et 2, pl. XXVII (souche 517, colonie de 8 jours sur milieu PC à 25°) montrent l'accentuation de ce phénomène. Le filament axial est constitué par de gros articles en forme de banane, dont les courbures alternent de manière à former une ligne ondulée sinusoïdale. Cet aspect se retrouve dans toutes les souches, surtout lorsque les lames sont mises dans une atmosphère riche en CO².

La fig. 4, pl. XXVII (souche 198 B, colonie de 3 jours sur milieu PC. en atmosphère carbonique) montre l'action de CO² sur une jeune colonie. Il y a ici accélération de la formation des blastospores géantes en banane et de l'allongement des filaments, de telle sorte que le stade *Mycocandida* n'a pas lieu. Les terminaisons fourchues, rappelant de loin celles des *Geotrichum*, expliquent pourquoi Langeron et Talice ont pris, dans leurs cultures en cellule, pour un *Geotrichoides*, la souche 82 B qui est pourtant un *parakrusei* authentique.

3° *Dimorphisme des blastospores.* — Ce phénomène, qu'on retrouve dans toutes les souches de *parakrusei*, est extrêmement visible dans les fig. 1 et 3, pl. XXVII (souche 341 A, ex *Monilia parapsilosis*, culture sur milieu PC. après passage sur Raulin), qui montrent bien le passage des petites blastospores aux blastospores géantes et *vice versa*.

Ce dimorphisme est difficile à obtenir en cultures sur lames, aussi n'est-ce qu'après de nombreux essais que nous avons pu exécuter ces deux belles microphotographies.

Par contre, il est extrêmement facile à observer à travers la paroi du tube, dans les vieilles colonies sur gélose glycosée à 2 p. 100, où les blastospores géantes sont constantes, comme nous l'avons dit plus haut. Ce sont ces chaînettes de gros éléments qui ont induit en erreur Langeron et Talice et leur ont fait placer dans leur genre *Candida*, à côté du *C. tropicalis*, la souche 341 qui est un *parakrusei* typique.

Ces gros éléments se retrouvent avec une extrême abondance dans les stries jaunes qui apparaissent de temps en temps dans les colonies âgées. Nous nous sommes demandé si on pouvait les considérer comme des chlamydospores dont elles ont le volume et dont elles présentent un peu l'acido-résistance ; mais elles n'en possèdent pas le double contour et elles bourgeonnent sur place, sans qu'on les change de milieu.

CANDIDA ALDOI (Pereira Filho 1927, p. 8)

1927 *Monilia aldoi* Pereira Filho 1927, p. 8.

1932 *Mycotoruloides aldoi* (Pereira Filho 1927) Langeron et Talice 1932, p. 49. C. W. Dodge 1935, p. 292.

1933 *Candida aldoi* (Pereira Filho 1927) Castellani et Jacono, 1933, p. 317.

On peut rattacher à cette espèce toutes les souches de *Candida* ne faisant fermenter que le glucose, ne donnant, en eau glycosée-peptonée, ni voile ni anneau et dont les colonies sont plissées.

SOUCHE ÉTUDIÉE

Souche Talice (Montevideo). — *Souche 648 A* (= 71 B).

Historique. — La seule souche de cette espèce actuellement connue de nous est la souche conservée sous le n° 648, dans la mycothèque de l'Institut de Parasitologie. Cette espèce a été isolée d'une glossite à Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Brésil), par Pereira Filho, en 1927. Elle a été dédiée au Prof. Aldo Castellani, sous le nom de *Monilia aldoi* Pereira 1927. Elle a été placée par Langeron et Talice (1932) dans leur genre *Mycotoruloides*; ces auteurs la caractérisent déjà, à cette époque, par ses colonies jaunâtres et *plissées*.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. **Gélose glycosée à 2 p. 100.** — Colonies blanches ou jaunâtres, crémeuses, humides, *finement plissées et granitées sur toute leur surface*. La croissance de ces colonies est rapide, leur surface est plane, non convexe, leurs *bords* sont irréguliers et *festonnés* (fig. 6, pl. XXXII).

Filamentisation. — Elle n'est visible que dans la colonie supérieure, où les filaments sont dégagés et courts.

2. **Milieu liquide glycosé à 2 p. 100.** — Dans ce milieu, *C. aldoi* se développe bien, sous forme de *dépôt*, mais ne donne *ni voile, ni anneau*. Lorsqu'on agite le tube, on voit nager dans le liquide de petites colonies séparées, qui ne produisent pas de trouble et se déposent rapidement au fond du tube.

3. **Liquide de Raulin.** — Un dépôt, ni voile, ni anneau.

4. **Alcool à 3 p. 100.** — *C. aldoi* y végète mal et ne forme qu'un faible dépôt.

5. **Lait.** — Non modifié.

II. Morphologie microscopique

La formation de filaments bien dégagés de la strie d'ensemencement, en culture sur lame, est assez difficile à réussir. Les milieux les plus appropriés sont notre milieu PC. et le milieu de Gorodkova.

La morphologie microscopique de cette espèce n'a rien de caractéristique, pourtant elle suffit à la distinguer nettement des autres espèces appartenant au même groupe fermentatif (zymogramme positif pour le glycose et le lévulose seul : *krusei*, *parakrusei*) et doit être considérée comme un bon caractère systématique.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — *Positif* pour : glucose et lévulose ; *négatif* pour : galactose, saccharose, maltose, lactose et raffinose.

Auxanogramme des sucres. — *Positif* pour : glycose, lévulose, galactose, maltose, saccharose ; *négatif* pour : lactose, raffinose.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : peptone, asparagine, glycocolle, histidine, tryptophane, sulfate d'ammonium ; *négatif* pour : urée et nitrate de potassium.

En résumé, *C. aldoi* est très voisin de *C. parakrusei* : tous deux présentent le même zymogramme et les mêmes auxanogrammes pour les sucres et pour l'azote. Mais *C. aldoi* se distingue facilement :

- 1° par ses colonies plissées, lobulées, sans couronne de filaments ;
- 2° par sa morphologie microscopique ;
- 3° par l'absence d'anneau en milieux liquides ;
- 4° par le très faible développement en alcool à 3 p. 100.

LECTURE DES PLANCHES

Nous empruntons à deux lames, faites avec deux milieux différents, les éléments morphologiques qui nous ont paru les plus caractéristiques.

1° *Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu de Gorodkova.* — La fig. 3, pl. XXVIII (souche 648, 9 jours à 25°) montre l'allure générale d'un filament bien dégagé de la strie d'ensemencement. Aspect *Mycotoruloides*, à verticilles composés, assez étalés. La fig. 4, pl. XXVIII, sur la même lame, donne l'aspect *Candida*, avec verticilles composés, très fournis, et tendance à la formation de chaînettes latérales de blastospores.

2° Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu PC. — La fig. 1, pl. XXVIII, montre encore un aspect *Mycotoruloides*, mais avec tendance à l'apparition de rameaux et de glomérules renversés, par suite d'un bourgeonnement non orienté. La fig. 2, pl. XXVIII, prise sur la même lame, fait voir des verticilles en arbuscules, dont les rameaux sont accolés au filament axial. En certains points, on remarque une germination des blastospores.

VI. GROUPE BRUMPTI (1)

Ce groupe, à pouvoir fermentatif très faible, limité au glycose et encore plus faiblement au lévulose, forme en quelque sorte le passage des levures zymatiques aux levures azymatiques (voir plus haut p. 82).

1. Eléments morphologiques. — A. *Filamentisation* assez difficile à obtenir, non caractéristique ; B. *Blastospores* plus ou moins nombreuses, quelquefois dimorphes ; C. *Chlamydospores* absentes ; D. *Pseudoconidies* rares.

2. Zymogramme. — Fermentation très faible du glycose et du lévulose, *négatif pour tous les autres sucres*.

3. Auxanogramme des sucres. — Ne suit pas le zymogramme ; positif au moins pour le glycose, le galactose et le maltose.

4. Auxanogramme de l'azote. — Négatif pour l'urée.

5. Eléments systématiques. — Deux espèces :

C. brumpti (Langeron et Guerra 1935).

C. flareri (Redaelli et Ciferri 1935).

CANDIDA BRUMPTI (Langeron et Guerra 1935), Guerra 1935, p. 25
1935 *Blastodendrion brumpti* (2) Langeron et Guerra 1935 (Guerra 1935, p. 25).

Candida ravauti Langeron et Guerra 1935 (Guerra 1935, p. 25).

(1) Ce groupe et son espèce-type sont dédiés au Prof. Emile Brumpt, Directeur de l'Institut de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris, en témoignage de profonde reconnaissance pour les facilités de travail qu'il nous a accordées et qui ont permis de mener à bien les longues recherches nécessitées par cette révision du genre *Candida*.

(2) Cette synonymie est due, comme il est dit plus loin (p. 498-499) au cours de la lecture des planches, au dimorphisme de cette espèce.

SOUCHES ÉTUDIÉES

Souches Guerra : perlèche (cas Dessigny), souche 415 B ; hyperkératose du talon, souche 478 B (*Candida ravauti*).

Historique. — Espèce isolée par Guerra, à l'Hôpital Saint-Louis, à Paris, en 1935, d'une perlèche et d'une hyperkératose du talon.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélase glycosée à 2 p. 100. — Colonies d'un blanc sale, crémeuses, humides, lisses, mais pouvant se plisser et prendre un aspect membraneux.

Bords irréguliers, découpés, formant une frange aplatie et luisante (colonies marginées) (fig. 5, pl. XXXII).

Filamentisation. — Des filaments courts et irréguliers sur les bords de la colonie supérieure de nos tubes.

2. Milieu liquide, glycosé à 2 p. 100. — En 5 à 6 jours, formation d'un voile muqueux, humide, avec un anneau très bas. Le liquide se trouble, au fond il y a un dépôt abondant.

3. Liquide de Raulin. — Ni voile, ni anneau.

4. Alcool à 3 p. 100. — Ni voile, ni anneau. Développement moyen.

5. Lait. — Non modifié.

II. Morphologie microscopique

Cette levure filamente assez bien, mais les verticilles se forment difficilement.

En étalement dans l'encre de Chine, les colonies lisses sont composées de petites cellules brièvement ovales, tandis que, dans les colonies plissées, on trouve des cellules allongées, réunies en chaînettes (pl. XXX, fig. 1 et 2).

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Fermentation très faible ou nulle du glucose seul. La souche 478 est un peu plus active que la souche 415.

Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose, galactose, maltose ; négatif pour : saccharose, lactose, raffinose.

La non-élection du saccharose individualise parfaitement cette espèce.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : peptone, asparagine, glycocolle, sulfate d'ammonium ; *négatif* pour : *histidine*, urée, nitrate de potassium.

La non-assimilation de l'histidine constitue encore un caractère très particulier de cette espèce.

LECTURE DES PLANCHES

1. *Souche 478 B* isolée d'une hyperkératose du talon (ancien *Candida ravauti* Langeron et Guerra 1935).

La fig. 2, pl. XXIX, représente à un faible grossissement ($\times 200$) l'aspect d'ensemble d'une colonie de 5 jours sur lame, en milieu PC. On voit les filaments moniliformes corémiés, ramifiés à angle droit, sans blastospores. La fig. 3, pl. XXIX, montre, à un plus fort grossissement, les détails de la fig. 2 : on constate l'absence totale de verticilles et de blastospores. Il est difficile de croire que cette morphologie soit celle d'un champignon levuriforme du genre *Candida*.

Mais la fig. 3, pl. XXX, prise sur une autre lame de cette même souche 478, sur milieu PC, représente une zone où on voit nettement les verticilles de blastospores, à côté d'autres points où la morphologie est celle que représentent les deux figures précédentes. Ici, les blastospores sont allongées et ont tendance à rester accolées pour former les filaments moniliformes. Cette figure montre aussi qu'il s'agit bien d'un *Candida*.

Dans la fig. 1, pl. XXX, on voit, dans un étalement à l'encre de Chine, de très petites blastospores et, au centre, un filament avec des chaînettes latérales de blastospores, rappelant l'aspect du *Candida tropicalis*.

2. *Souche 415 B*, isolée d'une perlèche (*C. brumpti* sensu stricto).

La fig. 1, pl. XXIX, montre, dans une colonie de 6 jours à 25° sur milieu PC, des filaments ramifiés en pinceau, formés de chaînettes de blastospores non encore étirées comme dans les fig. 2 et 3, pl. XXIX. On comprend très bien qu'après allongement des blastospores ces filaments deviennent moniliformes. Remarquer le monomorphisme des éléments de la strie d'ensemencement et de ceux des filaments.

Les fig. 4, pl. XXIX, et 4, pl. XXX (colonies de 15 jours à 25° sur milieu PC), montrent très nettement le *dimorphisme* de cette souche. On voit des pinceaux de filaments moniliformes donnant naissance, à leur extrémité, à une masse confuse de blastospores polymorphes,

arrondies ou allongées, la plupart volumineuses. La strie d'ensemencement est elle-même formée d'éléments polymorphes.

C'est cet aspect qui nous a induit en erreur, nous faisant croire que ces deux souches appartenaient à deux espèces différentes.

Enfin, la fig. 2, pl. XXX, donne l'aspect d'un étalement dans l'encre de Chine d'une *partie plissée* d'une colonie de 20 jours sur gélose glycosée à 2 p. 100. Comparer avec la fig. 1, pl. XXX, pour voir la différence d'aspect des éléments des parties crémeuses lisses et des parties plissées.

CANDIDA FLARERI (Redaelli et Ciferri 1935, p. 53)

1935 *Blastodendron flareri* Ciferri et Redaelli 1935, p. 53.

Cette espèce a été décrite par Ciferri et Redaelli en partant de deux souches isolées par Flarer à Messine, à la Clinique dermo-syphilopathique, l'une d'une lésion érythémato-squameuse, l'autre d'une lésion à type eczémateux. La souche étudiée, aimablement communiquée par Redaelli, est notre souche 583 B.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. **Gélose glycosée à 2 p. 100.** — Colonies très blanches, crémeuses, humides, lisses, mais pouvant se plisser au centre ou présenter des secteurs plissés qui peuvent gagner presque la totalité de la colonie (fig. 8, pl. XXXII). Les bords ne sont pas lobulés. La souche que nous possédons et que nous devons à l'obligeance du Prof. Redaelli peut présenter des secteurs sombres, surtout aux endroits plissés.

Filamentisation. — La filamentisation périphérique est nulle.

2. **Milieu liquide glycosé à 2 p. 100.** — Apparition rapide d'un anneau et quelquefois de petits îlots, mais pas de voile net. Le liquide est en général troublé par la chute de blastospores qui tombent de l'anneau.

3. **Liquide de Raulin.** — Ni anneau, ni voile.

4. **Alcool à 3 p. 100.** — Ni anneau, ni voile. Développement très pauvre.

5. **Lait.** — Non modifié.

II. Morphologie microscopique

La filamentation est assez difficile à obtenir. D'après Ciferri et Redaelli, elle n'aurait lieu qu'en milieux liquides. Sur les milieux solides, ce champignon pouvant être pris pour un *Torulopsis*. Les dessins donnés par ces auteurs ne montrent en effet que des ébauches de filamentation, constituées par quelques chaînettes (en eau de pommes de terre) ; ces éléments leur ont paru suffisants pour ranger ce champignon dans le genre *Blastodendron* de Langeron et Talice (1932).

Nous avons pu obtenir une bonne filamentation en culture sur lame sur notre milieu PC. La fig. 2, pl. XXXI, montre que cette filamentation n'a rien de caractéristique. Les blastospores sont en général allongées et les verticilles très pauvres. On aperçoit une tendance à la formation d'une pseudo-conidie à la base des rameaux latéraux.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Ciferri et Redaelli ont trouvé que cette levure est dépourvue de pouvoir fermentatif. Nous aussi avons reconnu que, dans les conditions habituelles où nous effectuons nos fermentations (eau peptonée), le pouvoir fermentatif est nul pour tous les sucres.

Toutefois, en opérant en eau de levure et en ensemençant tout le contenu d'un tube d'une culture fraîche, on peut obtenir un peu de gaz avec le glycose. On peut donc admettre que cette levure produit une très faible fermentation du glycose.

Auxanogramme des sucres. — *Positif* pour : glycose, lévulose, maltose, galactose, saccharose et raffinose ; *négatif* pour : lactose.

Le galactose est très faiblement élu ; par contre, l'élection du saccharose et du raffinose est très nette ; celle du saccharose sépare nettement cette espèce de *C. brumpti*.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : peptone, asparagine, histidine, glycolle, tryptophane, sulfate d'ammonium ; *négatif* pour : urée et nitrate de potassium.

L'assimilation du sulfate d'ammonium est faible.

VII. GROUPE AZYMATIQUE

Comme son nom l'indique, ce groupe réunit provisoirement les levures dont le pouvoir fermentatif est nul pour tous les sucres, au moins en eau peptonée. Les autres caractères sont trop discordants pour que nous puissions en établir un tableau, comme pour les six groupes précédents.

Ce groupe azymatique est évidemment très artificiel puisqu'il est formé de levures hétérogènes, n'ayant comme caractère commun que leur zymogramme négatif (1).

Aussi ne décrivons-nous que trois éléments systématiques : *C. zeylanoides* (Castellani 1917) et *C. deformans* (Zach 1934), auxquels nous joignons une souche très intéressante, que nous avons reçue du Centraalbureau de Baar, en mai 1932, sous le nom de *Geotrichum suaveolens* (Lindner) Ciferri et que nous conservons depuis cette époque.

CANDIDA ZEYLANOIDES (Castellani 1917) (2)

1920 *Monilia zeylanoides* Castellani 1920, p. 17.

1925 *M. macroglossiæ* Castellani 1925, p. 219.

1933 *Torulopsis macroglossiæ* Castellani et Jacono 1933, p. 314.

1935 *Parendomyces macroglossiæ* (Castellani) C. W. Dodge 1935, p. 241.

Souche étudiée : Souche originale de Castellani (360 B).

Historique. — Espèce isolée par Castellani à Ceylan (1903-1915) de trois cas de macroglossie et d'un autre cas en Angleterre (avec Broughton Alcock).

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. **Gélose glycosée à 2 p. 100.** — Colonies blanc ivoire, crémeuses, humides, lisses, mais pouvant se plisser finement par secteurs, rondes, à bords lisses non lobulés.

(1) Le type de ce groupe était *Monilia zeylanica* Castellani, 1910, p. 197, mais, comme la souche originale n'existe plus, nous avons étudié *M. zeylanoides*, qui lui est vraisemblablement identique.

(2) Date indiquée par l'auteur de l'espèce *in litt.*

Filamentisation. — Une petite couronne de filaments sur les colonies supérieures.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Des îlots, qui apparaissent au bout de quelques jours, *sans anneau*. Au 13^e jour, les îlots peuvent couvrir toute la surface, en formant un *voile* presque complet.

3. Liquide de Raulin. — Ni voile, ni anneau.

4. Alcool à 3 p. 100. — Ni voile, ni anneau. Développement presque nul.

5. Lait. — Non modifié dans les délais normaux.

II. Morphologie microscopique

La filamentisation est longue et difficile à obtenir sur lames. Le principal caractère est la forme allongée des cellules et leur tendance à se renfler à une de leurs extrémités.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — *Négatif* pour tous les sucres.

Auxanogramme des sucres. — *Positif* pour : glycose, lévulose ; *négatif* pour tous les autres sucres.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : peptone ; *négatif* pour tous les autres produits azotés.

LECTURE DES PLANCHES

La fig. 3, pl. XXXI montre la diversité d'aspects que ce champignon peut prendre sur une même lame (culture de 20 jours à 18°, sur milieu PC. en atmosphère carbonique. En haut, rameaux plus ou moins touffus, à verticilles pauvres et composés ; en bas, manchons globuleux rappelant l'aspect *Mycotorula*.

Sur la même lame, la fig. 4, planche XXXI montre, à un plus fort grossissement, un des rameaux à verticilles composés et pauvres. Les blastospores sont allongées, quelques-unes sont renflées à la base (phialiformes, ce qui est le contraire des blastospores stalagmoïdes, qui sont renflées dans la portion distale).

La fig. 1, pl. XXXI, montre les longs articles des filaments, ressemblant aux cellules en raquette des *Microsporium*. Le renflement apical donne naissance à une petite couronne de blastospores.

CANDIDA DEFORMANS (Zach 1934, p. 686)

1934 *Pseudomonilia deformans* Zach 1934, p. 686.

Historique. — Ce champignon a été isolé de lésions unguéales par St. Wolfram et F. Zach, chez une malade de la clinique universitaire de syphilidologie et dermatologie de Vienne. Il s'agissait d'une femme de 49 ans dont les ongles étaient malades depuis 18 mois : tous les doigts de la main droite, sauf le pouce, étaient atteints, ainsi que les 2^e et 3^e doigts de la main gauche. Les ongles étaient méconnaissables, recourbés en griffe, crevassés, friables. Ça et là, le bord libre était encore visible ; au-dessous, on trouvait une masse solide et poudreuse, facile à désagréger. Ces lésions paraissent de la racine de l'ongle. La lésion, absolument indolore, avait résisté à tous les traitements. Cinq tubes ensemencés sur gélose maltosée ont tous donné le même champignon. Le choix de ce milieu n'était pas heureux, car, par malchance, il se trouve que ce champignon n'assimile pas le maltose. C'est ce qui explique l'insuffisance des dessins représentant sa morphologie.

Dans la mycothèque de l'Institut de Parasitologie, la souche étudiée, due à l'amabilité du D^r F. Zach, porte le n° 585 B.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. **Gélose glycosée à 2 p. 100.** — Colonies d'un blanc jaunâtre (ivoire), très membraneuses, humides, très fortement plissées, à plis fins et profonds qui plus tard s'épaississent (fig. 7, pl. XXXII), en même temps que la surface pâlit et devient blanche. Colonies s'étendant rapidement et assez adhérentes au substratum.

Filamentisation. — Bien développée, surtout autour des colonies supérieures bien isolées.

2. **Milieu liquide glycosé à 2 p. 100.** — Un *anneau* membraneux et des *ilots* qui tombent au fond par agitation du tube, puis tardivement (au 10^e-15^e jour) un *voile membraneux*. Le liquide reste clair et il se forme au fond un dépôt membraneux.

3. **Liquide de Raulin.** — Ni anneau, ni voile.

4. **Alcool à 3 p. 100.** — Vers le 10^e jour, on constate des ilots et un dépôt épais, le liquide restant clair ; vers le 20^e jour, on voit apparaître un *voile* et le dépôt est très abondant.

5. **Lait.** — Le lait tournesolé est *coagulé* en 10 jours, puis le cail-

lot est peu à peu dissous, le liquide devenant rouge bordeaux et transparent.

6. Gélatine. — Nous mentionnons ici l'action sur la gélatine, parce qu'elle est *rapidement et totalement liquéfiée*. C'est donc un caractère important de cette espèce, car, chez les autres *Candida*, la liquéfaction est beaucoup plus tardive et moins nette.

II. Morphologie microscopique

La filamentisation est rapide et abondante sur tous les milieux, mais on voit très peu de blastospores libres. La ramification semble être du type *Mycocandida* et rappeler celle du *C. parakrusei*. Mais ce n'est qu'une simple apparence, car les rameaux sont le plus souvent alternes et non verticillés, comme chez *C. parakrusei*; en outre, au lieu de toujours naître, suivant la règle, au sommet des articles, ils sont le plus souvent pleurogènes, ce qui finit par donner au filament axial l'apparence d'un *mycelium vrai cloisonné*. C'est probablement cette particularité qui contribue à accentuer le caractère membraneux des colonies. Mais la structure des rameaux latéraux est bien celle des *Candida* typiques, avec bourgeonnement de petits verticilles de blastospores acrogènes (fig. 3, pl. XXXIII).

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — *Entièrement négatif*. Cette espèce ne fait fermenter aucun sucre.

Auxanogramme des sucres. — *Positif* pour : glycose et, très faiblement, galactose ; *négatif* pour : maltose, saccharose, lactose, raffinose.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : urée, peptone, asparagine, *histidine*, glyocolle, sulfate d'ammonium ; *négatif* pour : nitrate de potassium.

IV. Position systématique

L'attribution de cette espèce au genre *Pseudomonilia* Geiger 1910 ne nous paraît pas soutenable. La critique de ce genre a déjà été donnée par Ciferri et Redaelli (1929). Nous n'avons rien à ajouter aux réserves que ces auteurs ont formulées, car nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier les espèces décrites par Geiger. Mais, à sup-

poser que ce genre soit valable et corresponde à quelque chose de réel, l'espèce nommée *deformans* par Zach ne saurait y rentrer. En effet, Geiger donne, comme caractère morphologique principal, la présence de filaments non cloisonnés. Or, justement, cette espèce se distingue par son appareil filamenteux cloisonné à la fin et ressemblant étonnamment à un mycélium vrai. En outre, d'après Geiger, les *Pseudomonilia* assimilent très bien un grand nombre de sucres. Or, l'étude de *C. deformans*, faite à ce point de vue par la méthode auxanographique de Beijerinck, nous a montré que le glycose seul est élu et, très faiblement, le galactose.

CANDIDA SUAVEOLENS [(Lindner) Ciferri]

Souche 728 A, reçue en mai 1932 du Centraalbureau de Baarn, sous le nom de *Geotrichum suaveolens* (Lindner) Ciferri, sous lequel il figurait dans le catalogue de 1932 de cet Institut (p. 33).

Nous ne discuterons pas ici la synonymie compliquée de l'espèce *suaveolens*, qui a été rattachée aux genres *Sachsia* Ch. Bay 1894, p. 90 (par Lindner 1898, p. 217), *Oospora* Wallroth 1833 (par Lindau 1907, p. 35), *Oidium* Link 1809 (par Krzemecki), *Cylindrium* Bonorden 1851 (par Burns 1933, p. 433), *Geotrichum* Link 1809 (par Ciferri *in litt.*).

Nous nous contenterons d'étudier objectivement la souche 728 A, en lui laissant le nom spécifique sous lequel elle nous est parvenue et sous lequel nous l'avons conservée depuis 1932.

Nous avons longtemps hésité à joindre à notre mémoire la description de cette souche, dont la détermination est si difficile à établir et dont l'intérêt médical est, jusqu'ici, nul. Mais comme elle nous a fourni des faits très intéressants concernant la transformation des colonies lisses en colonies membraneuses, nous avons pensé qu'il était utile de l'adjoindre au groupe azymatique, ce qui ne préjuge rien de son identité véritable. Elle présente d'ailleurs suffisamment d'analogies avec les autres *Candida* pour justifier son maintien dans ce genre.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélouse glycosée à 2 p. 100. — Sur ce milieu, l'aspect des colonies est essentiellement variable :

- a) Colonies grisâtres, crèmeuses, très bombées, mates.
- b) Colonies crèmeuses, humides, lisses.

c) Colonies crémeuses, brillantes, muqueuses coulant au fond du tube.

d) Colonies membraneuses, sèches, plissées, à plis profonds.

Pourtant, la forme la plus habituelle, représentée par la fig. 2, pl. XXXII, est celle de colonies crémeuses, convexes, gris-jaunâtre, qui brusquement commencent à se plisser et à devenir membraneuses.

FIG. 1. — Boîte de Pétri préparée pour un auxanogramme des sucres (voir p. 165).

Filamentisation. — Abondante autour des colonies et surtout superficielle.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Production très rapide d'un *voile* et d'un *anneau*. Le voile, muqueux au début, devient bientôt *membraneux*, adhérent, très résistant, permettant d'incliner le tube sans se rompre.

3. Liquide de Raulin. — Anneau épais, voile muqueux continu ou en îlots.

4. Alcool à 3 p. 100. — Formation d'*îlots* et d'un *anneau*. Dépôt abondant.

5. Lait tournesolé. — Pas de changement ou seulement un léger virage au rose.

II. Morphologie microscopique

La filamentisation est facile sur tous les milieux. L'appareil sporifère verticillé est constant et généralement très net. Les verticilles sont constitués par des blastospores, le plus souvent allongées, ayant une tendance précoce à bourgeonner et étroitement appliquées contre le filament axial (fig. 1, pl. XXXIII). L'ensemble

FIG. 2. — Exemple d'auxanogramme de l'azote (p. 168) : au centre, peptone ; grand secteur, sulfate d'ammonium ; en haut, urée ; à gauche, asparagine.

représente exactement le contraire du type *Mycotoruloides*, dont les verticilles sont toujours très étalés (pl. XVIII, fig. 3, pl. XXI, fig. 2 et pl. XXII, fig. 1). Il en résulte une ramification en pinceaux très effilés, les verticilles finissant rapidement par confluer (fig. 2, pl. XXXIII), mais sans prendre l'aspect globuleux du type *Mycotomula* (pl. XII, fig. 1 et 2). Les rameaux sont donc longuement étirés, ce qui explique l'aspect bombé et la consistance membraneuse de certaines colonies.

Dans un prochain mémoire, nous étudierons plus en détail la forme la plus remarquable que peut prendre ce champignon : c'est celle qui, résultant de la germination et de l'étirement des blastospores, modifie complètement l'aspect macroscopique et microscopique des colonies.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Négatif pour tous les sucres.

Auxanogramme des sucres. — *Positif* pour : glycose, maltose, galactose, saccharose, lactose ; *négatif* pour : raffinose.

Auxanogramme de l'azote. — *Positif* pour : urée, peptone, asparagine, histidine, glycocolle, sulfate d'ammonium ; *négatif* pour : nitrate de potassium.

L'auxanogramme des sucres permet donc de distinguer immédiatement *C. suaveolens* des deux autres espèces de notre groupe azymatique.

INDEX SYNONYMIQUE

Nous croyons utile de donner cet index synonymique alphabétique (1), afin de permettre au lecteur de s'orienter dans la synonymie des *Candida*. Cet index ne comprend pas la synonymie totale et générique de ces champignons levuriformes ; il donne seulement l'équivalence synonymique de tous les noms spécifiques cités dans ce mémoire. Nous nous sommes bornés à mentionner les dénominations dont l'équivalence est certaine ou au moins probable. Il y a encore bien d'autres noms dont la signification est trop douteuse pour être cités. Le récent traité de Mycologie médicale de C. W. Dodge (1935) mentionne environ 143 espèces pouvant être rapportées aux Mycotoruloïdées, sans compter les synonymes ; sur ce nombre, nous estimons qu'à l'heure actuelle les 16 espèces décrites dans ce mémoire peuvent seules être déterminées avec certitude et servir de point de départ pour des recherches ultérieures. A 9 de ces 16 espèces correspond la centaine de synonymes figurant dans cet index, 7 espèces n'ayant pas encore de synonymes. Le reste ne peut guère être considéré que comme des *nomina nuda* : leur description est si incomplète (quand elle n'est pas tout à fait erronée) qu'il y a peu de chances qu'on les retrouve jamais.

accraensis = *tropicalis*.

actoni = *albicans*.

egyptiaca = *tropicalis*.

africana = *krusei*.

alba = *albicans*.

albicans (45 syn.).

(1) Cette synonymie est seulement *spécifique*. Comme les espèces ont été, à maintes reprises, changées de genres, la liste totale des synonymes spécifiques et génériques est beaucoup plus longue et a été donnée pour chaque espèce. Comme nous rejetons tous les genres autres que *Candida*, il suffit de connaître l'équivalence des espèces.

- aldoi*.
alvarezsotoi = *albicans*.
argentina = *tropicalis*.
arzi = *guilliermondi*.
ashfordi = *guilliermondi*.
balcanica = *krusei*.
bethaliensis = *albicans*.
blanchardi = *krusei*.
bonordeni = *tropicalis*.
braulii = *krusei*.
bronchialis = *tropicalis*.
brumpti (1 syn.)
bucalis = *albicans*.
burgessi = *tropicalis*.
candida (Chapman) = ? *tropicalis*.
candida (Talice et Mackinnon) =
albicans.
chalmersi (1 syn.).
colardi = *albicans*.
copelli = *albicans*.
cruzi = *tropicalis*.
cutanea (Dodge) = *albicans*.
cutaneum (Ota) = *albicans*.
decolorans = *albicans*.
deformans.
dentriticum = *krusei*.
dissocians = *krusei*.
enterica = *tropicalis*.
enterocola = *krusei*.
erectum (Langeron et Talice) =
albicans.
fæcalis = *albicans*.
favrei = *albicans*.
fiocci = *albicans*.
flareri.
gifuensis = *albicans*.
globosum = *parakrusei*.
gracile = *parakrusei*.
guilliermondi (6 syn.).
harteri = *albicans*.
hasegawæ = *albicans*.
inexorabilis = *albicans*.
inexpectata = *krusei*.
insolita = *tropicalis*.
intermedia.
intestinalis (Castellani) = *krusei*.
intestinalis (Mattlet) = *albicans*.
irritans = *tropicalis*.
issavi = *tropicalis*.
kartulisi = *pseudotropicalis*.
kauffmanni-wolffi = *albicans*.
kayongosi = *tropicalis*.
krusei (16 syn.).
laryngitidis = *albicans*.
lesieuri = *krusei*.
linguæ-pilosæ = *tropicalis*.
lodderi = *chalmersi*.
londinensis = *krusei*.
lustigi = *guilliermondi*.
macroglossiæ = *zeylanoides*.
mannitofermentans = *albicans*.
mazzæ = *pseudotropicalis*.
metalondinensis = *albicans*.
metatropicalis = *tropicalis*.
metchnikoffi = *albicans*.
molardi = *albicans*.
mortifera = *pseudotropicalis*.
muhira = *guilliermondi*.
mycotoruloidea = *albicans*.
nabarroi = *albicans*.
negrii = *guilliermondi*.
negroni (Dodge) = *albicans*.
nitida = *krusei*.
onychophila = *parakrusei*.
oosporoides = *albicans*.
orticoni = *krusei*.
ovalis = *albicans*.
parabalcanica = *krusei*.
parakrusei (7 syn.).
parapsilosis = *parakrusei*.
paratropicalis = *tropicalis*.
paratropicalis D = *guilliermondi*.
pelliculosa.
periunguealis = *albicans*.
perryi = *tropicalis*.
pinoyi = *albicans*.
pinoyisimilis = *albicans*.
procera = *pseudotropicalis*.
pseudoalbicans = *albicans*.
pseudobronchialis = *tropicalis*.
pseudolondinensis = *albicans*.
pseudolondinoides = *albicans*.

<i>pseudometalondinensis</i> = <i>albicans</i> .	<i>tokioense</i> = <i>parakrusei</i> .
<i>pseudotropicalis</i> (5 syn.).	<i>tonge</i> = <i>krusei</i> .
<i>psilosis</i> = <i>albicans</i> .	<i>triadis</i> .
<i>pulmonalis</i> (Cast.) = <i>tropicalis</i> .	<i>tropicalis</i> (Acton) = <i>albicans</i> .
<i>pulmonalis</i> (Senez) = <i>albicans</i> .	<i>tropicalis</i> (Castellani, 20 syn.).
<i>ravauti</i> = <i>brumpti</i> .	<i>unguis</i> = <i>parakrusei</i> .
<i>richmondi</i> = <i>albicans</i> .	<i>unguium</i> = <i>parakrusei</i> .
<i>skutetzkyi</i> = <i>albicans</i> .	<i>urinæ</i> = <i>krusei</i> .
<i>suaveolens</i> .	<i>verticillata</i> = <i>albicans</i> (p. 458).
<i>sulfurea</i> = <i>pseudotropicalis</i> .	<i>vuillemini</i> = <i>albicans</i> .
<i>talicei</i> = <i>tropicalis</i> .	<i>zeylanoides</i> (1 syn.).

INDEX DES ESPÈCES ADMISES

<i>albicans</i> , 432.	<i>krusei</i> , 482.
<i>aldoi</i> , 494.	<i>parakrusei</i> , 489.
<i>brumpti</i> , 496.	<i>pelliculosa</i> , 463.
<i>chalmersi</i> , 471.	<i>pseudotropicalis</i> , 464.
<i>deformans</i> , 503.	<i>suaveolens</i> , 505.
<i>flareri</i> , 499.	<i>triadis</i> , 452.
<i>guilliermondi</i> , 468.	<i>tropicalis</i> , 456.
<i>intermedia</i> , 461.	<i>zeylanoides</i> , 501.

RÉSUMÉ

Après une introduction historique et critique (p. 36-50), nous indiquons la marche à suivre pour la détermination d'un champignon levuriforme (p. 50-84 et 162-172) : purification des souches (p. 50-51) ; recherche et coloration des ascospores (p. 52-55) ; aspect des colonies sur milieux solides (p. 55-59) ; anneau et voile en milieu glycosé liquide (p. 59-61) ; examen microscopique des colonies (p. 61-62) ; cultures sur lames et lamelles gélosées (p. 65-70) ; zymogramme (p. 74-83) ; cultures en alcool (p. 162) ; auxanogrammes des sucres et de l'azote (p. 165-172).

Dans une deuxième partie (p. 172-179, 429-476, 481-525), nous décrivons les 16 espèces de champignons levuriformes que nous considérons comme étant actuellement seules valables en zymologie médicale. Ces espèces réunies dans un genre unique : *Candida*, sont réparties en sept groupes (1) :

1. Groupe *albicans*. — Fermentations : glycose et maltose. Des *chlamydospores*.

(1) Les caractères mentionnés sont réduits aux caractères différentiels. Sauf indication contraire, l'anneau et le voile sont en eau peptonée glycosée.

C. albicans (p. 432). — Colonies blanches. Pas de voile (rarement un voile membraneux).

C. triadis (p. 452). — Colonies jaunâtres. Voile muqueux au 5^e jour.

2. Groupe tropicalis. — Fermentations : glycose, maltose, saccharose. Anneau. Voile muqueux. Urée non assimilée.

C. tropicalis (p. 456). — Colonies lisses, partiellement membraneuses.

Pas de voile muqueux en alcool.

Anneau épais dans le lait.

Lactose non assimilé.

C. intermedia (p. 461). — Colonies plissées. Fermentations très fortes.

Pas de voile muqueux en alcool.

Lactose assimilé.

C. pelliculosa (p. 463). — Colonies lisses, non membraneuses.

Voile muqueux en alcool.

Auxanogramme de N, positif pour peptone seule.

Lactose non assimilé.

3. Groupe pseudotropicalis. — Fermentations : glycose, saccharose, lactose, raffinose ; jamais maltose. Urée assimilée.

C. pseudotropicalis (p. 464). — Colonies en glacis, semi-transparentes.

Lait fermente en 24 heures, avec gaz abondant.

Maltose non assimilé.

4. Groupe guilliermondi. — Fermentations : glycose, saccharose ; jamais maltose ni lactose. Auxanogramme de l'urée négatif.

C. guilliermondi (p. 468). — Colonies lisses, aplaties, à bords nets.

Blastospores très petites.

Anneau. Voile muqueux *mince*.

Fermentations : glycose, saccharose, raffinose.

Maltose et lactose non assimilés.

C. chalmersi (p. 471). — Colonies plissées, à bords lobulés, avec couronne de filaments.

Anneau. Voile *épais*, tombant au fond du tube.

Fermentations : glycose et saccharose, non raffinose.

Maltose assimilé, non lactose ni raffinose.

• 5. Groupe *krusei*. — Fermentations : glycose et lévulose seuls.

C. krusei (p. 482). — Colonies blanches, mates, lisses, aplaties, à bords découpés, irréguliers, entourées de filaments superficiels.

Anneau très haut. Voile blanc, aéré, lisse ou plissé.

Fermentations : glycose et lévulose.

Auxanogramme de l'urée très net.

Glycose (et lévulose) seuls assimilés.

C. parakrusei (p. 489). — Colonies blanches, lisses, convexes, à secteurs jaunâtres. Filamentisation avec chaînettes de *blastospores géantes*.

Anneau. Pas de voile net.

Forte fermentation du glycose et du lévulose.

Auxanogramme de l'urée négatif.

C. aldoi (p. 494). — Colonies blanches ou jaunâtres, plissées-granitées, à bords festonnés, sans couronne de filaments.

Ni anneau, ni voile.

Fermentations : glycose et lévulose.

Auxanogramme de l'urée négatif.

6. Groupe *brumpti*. — Fermentations : faible pour le glycose, très faible pour le lévulose. Urée non assimilée.

C. brumpti (p. 496). — Colonies blanc sale, à bords découpés, quelquefois plissées.

Anneau et voile.

Fermentation très faible du glycose seul.

Auxanogramme négatif pour saccharose et histidine.

C. flareri (p. 499). — Colonies blanches, à bords nets, quelquefois plissées, sans filaments périphériques.

Ni anneau, ni voile.

Pouvoir fermentatif presque nul.

Auxanogramme positif pour saccharose et histidine.

7. Groupe *azymatique*. — Pouvoir fermentatif nul pour tous les sucres.

C. zeylanoides (p. 501). — Colonies ivoire, lisses, quelquefois plissées.

Anneau nul. Ilots devenant voile.

Auxanogramme positif pour glycose et lévulose, négatif pour l'urée.

C. deformans (p. 503). — Colonies ivoire, très membraneuses et très plissées.

Anneau. Voile membraneux tardif (15 jours). Voile tardif en alcool (20 jours).

Coagule le lait. Liquéfie rapidement la gélatine.

Auxanogramme des sucres positif pour glycose et galactose seuls. Urée assimilée.

C. suaveolens (p. 505). — Colonies gris-jaunâtre, crémeuses, puis plissées-membraneuses, avec couronne de filaments.

Anneau. Voile membraneux. Anneau et ilots en alcool.

Auxanogramme des sucres positif pour : glycose, maltose, saccharose, lactose. Urée assimilée.

ESPÈCES LES PLUS FRÉQUENTES CHEZ L'HOMME

C. albicans : bouche et milieu de la langue.

C. tropicalis : poumon.

C. pseudotropicalis : poumon et tube digestif.

C. guilliermondi : peau, cuir chevelu.

C. krusei : intestin, selles.

C. parakrusei : peau, sillons des ongles des mains.

Debaryomyces (levures ascosporees) : sillons des ongles des orteils, espaces interdigitaux des orteils.

ZYMOGRAMME (en eau peptonée glycosée)

GROUPE	CANDIDA	GLYCOSE	GALACTOSE	Saccharose	MALTOSE	LACTOSE	RAFFINOSE	FRUCTOSE (LÉVULOSE)
<i>Albicans</i>	<i>albicans</i> <i>triadis</i>	++ ++	±	—	++ ++	—	—	++
<i>Tropicalis</i>	<i>tropicalis</i> <i>intermedia</i> <i>pelliculosa</i>	++ ++ ++	++ ++ ++	++ ++ ++	++ ++ ++	— — —	— — —	++ ++ ++
<i>Pseudotropicalis</i>	<i>pseudotropicalis</i>	+	—	+	—	+	+	+
<i>Guilliermondi</i>	<i>guilliermondi</i> <i>chalmersi</i>	++ ++	±	±	—	—	+	++
<i>Krusei</i>	<i>krusei</i> <i>parakrusei</i> <i>aldoi</i>	++ ++ +	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	++ ++ ++
<i>Brumpti</i>	<i>brumpti</i> <i>flavescens</i>	±	—	—	—	—	—	±
<i>Azymatique</i>	<i>zeylanoides</i> <i>deformans</i> <i>suaresii</i>	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —

GROUPES	CANDIDA	AUXANOGRAMME DES SUCRES					AUXANOGRAMME DE L'AZOTE				
		Glycose	Saccharose	Maltose	Lactose	Raffinose	Peptone	Asparagine	Histidine	Urée	Sulfate d'ammonium
Albicans.....	<i>albicans triadis</i>	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Tropicalis.....	<i>tropicalis intermedia pelliculosa</i>	+++	+++	+++	++	++	+++	++	++	++	++
Pseudotropicalis.....	<i>pseudotropicalis</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Guilliermondi.....	<i>guilliermondi chalmersi</i>	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Krusei.....	<i>krusei parakrusei aldoui</i>	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++
Brumpti.....	<i>brumpti flaveri</i>	++	+	++	++	++	++	++	++	++	++
Azymatique.....	<i>zeylanoides deformans suaveolens</i>	+++	++	++	++	++	+++	++	++	++	++

EXPLICATION DES PLANCHES XXV-XXXIII

PLANCHE XXV

Candida krusei

FIG. 1. — Aspect *Mycotoruloides*, verticilles composés et étalés, formés de blastospores très allongées (portion de la fig. 2). Souche Ashford 339 A. Culture sur lame de 15 jours à 25° sur gélose glycosée à 6 p. 100. $\times$ 200.

FIG. 2. — Aspects *Mycotorula* (partie inférieure, verticilles globuleux) et *Mycotoruloides* (partie supérieure) sur gélose glycosée à 6 p. 100. Souche Ashford 339 A. Culture sur lame de 15 jours à 25° sur gélose glycosée à 6 p. 100. $\times$ 100.

FIG. 3. — Aspect *Mycotoruloides* sur gélose glycosée à 2 p. 100. Souche originale de Castellani 683 A. Culture sur lame de 15 jours à 25°. $\times$ 100.

FIG. 4. — Aspect *Mycocandida*, verticilles pauvres, blastospores courtes. Culture sur lame sur milieu PC à 37°. Souche 202 B (souche D.C.L. de Londres, levure H). $\times$ 150.

PLANCHE XXVI

Candida parakrusei

FIG. 1. — Aspect *Mycocandida* bien développé et touffu. Culture sur lame de 8 jours sur milieu PC. Souche Guelaire 424 B. $\times$ 60.

FIG. 2. — Stade des blastospores géantes : gros articles en forme de banane à courbures alternées. Culture sur lame de 8 jours sur milieu PC à 25°. Souche 517 A (*Monilia onychophila*). $\times$ 400.

FIG. 3. — Aspect *Mycocandida* typique en « rameau de sapin ». Culture sur lame de 5 jours sur milieu PC. Souche Guelaire 424 B. $\times$ 60.

FIG. 4. — Début du stade des blastospores géantes. Apparition des articles en banane incurvés en sens contraire. Verticilles très réduits. Culture sur lame sur milieu PC. Souche Baltazard 82 B (squames d'un bœuf). $\times$ 200.

PLANCHE XXVII

Candida parakrusei

FIG. 1 et 3. — Dimorphisme des blastospores (blastospores géantes); culture sur lame sur milieu PC. Passage des petites blastospores aux blastospores géantes et *vice versa*. Souche Ashford 341 A (*Monilia parapsilosis*). Dans ces figures, les parties noires correspondent à la masse de blastospores produite au début de la microcolonie sur lame. $\times$ 400 et 200.

FIG. 2. — Stade des blastospores géantes : articles en banane à courbures alternées sur le bord d'une microcolonie. Cette figure complète la fig. 2 de la pl. XXVI. Culture sur lame de 8 jours à 25° sur milieu PC. Souche 517 A (*Monilia onychophila*). $\times$ 400.

FIG. 4. — Action morphogénique de CO₂. Accélération du stade des blastospores géantes en banane, allongement précoce des filaments, suppression du stade *Mycocandida*, apparition de terminaisons fourchues rappelant celles des *Geotrichum*. Bord d'une strie de 3 jours sur milieu PC en atmosphère carbonique. Souche Beron 198 B. $\times$ 200.

PLANCHE XXVIII

Candida aldoi

- FIG. 1. — Aspect *Mycotoruloides*, mais avec rameaux et glomérules souvent renversés. Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu PC. $\times 200$.
- FIG. 2. — Même lame que pour la fig. 1 : les verticilles forment des arbuscules dressés et appliqués contre le filament axial. $\times 200$.
- FIG. 3. — Aspect général d'une portion filamenteuse du type *Mycotoruloides*. Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu de Gorodkova. $\times 100$.
- FIG. 4. — Même lame que pour la fig. 3. Autre point présentant l'aspect *Candida* avec verticilles composés, touffus, formés de longues chaînettes de blastospores $\times 400$.

PLANCHE XXIX

Candida brumpti

- FIG. 1. — Aspect typique des filaments ramifiés en pinceau et formés de chaînettes de blastospores, identiques à celles de la strie d'ensemencement. Souche 415 B (perlèche, *C. brumpti sensu stricto*) ; culture sur lame de 6 jours à 25° sur milieu PC. $\times 400$.
- FIG. 2. — Aspect d'ensemble d'une colonie de 6 jours sur lame, sur milieu PC (souche 478 B, hyperkératose du talon, ancien *C. ravauti*). Filaments moniliformes corémiés et ramifiés à angle droit. Absence totale de verticilles de blastospores. $\times 200$.
- FIG. 3. — Détail plus fortement grossi de la fig. 2. On voit l'étirement des blastospores qui forment les articles des filaments. $\times 400$.
- FIG. 4. — Cette figure (à rapprocher de la fig. 4, pl. XXX) montre le dimorphisme de *C. brumpti*. On voit la strie d'ensemencement, formée de blastospores polymorphes, donner naissance à des pinceaux de filaments moniliformes, portant à leur extrémité un amas confus de volumineuses blastospores polymorphes. Souche 415 B (perlèche, *C. brumpti sensu stricto*). Colonie sur lame de 15 jours à 25° sur milieu PC. $\times 400$.

PLANCHE XXX

Candida brumpti

- FIG. 1. — Etalement dans l'encre de Chine d'une colonie lisse de la souche 478 B (hyperkératose du talon, ancien *C. ravauti*). Très petites blastospores disséminées, et, au centre, arbuscule avec chaînettes latérales de blastospores. $\times 400$.
- FIG. 2. — Etalement dans l'encre de Chine d'une partie plissée d'une colonie sur lame de 20 jours sur gélose glycosée à 2 p. 100, chaînettes de blastospores allongées. Souche 415 B. $\times 400$.
- FIG. 3. — Verticilles de blastospores allongées, montrant que cette levure appartient bien au genre *Candida*. Souche 478 B (hyperkératose du talon, ancien *C. ravauti*) ; culture sur lame sur milieu PC. $\times 400$.
- FIG. 4. — Dimorphisme de *C. brumpti*. Strie d'ensemencement formée d'éléments polymorphes : il en sort des pinceaux de filaments moniliformes, terminés par des chaînettes de blastospores plus ou moins volumineuses (comparer avec la fig. 4, pl. XXIX). Souche 415 B (perlèche, *C. brumpti sensu stricto*) ; colonie sur lame de 15 jours à 25° sur milieu PC. $\times 400$.

PLANCHE XXXI

Candida zeylanoides et *C. flareri*

- FIG. 1. — *Candida zeylanoides* : filaments formés de très longs articles renflés en raquette au sommet qui porte une petite couronne de blastospores. $\times 400$.
- FIG. 2. — *Candida flareri* : culture sur lame sur milieu PC. Filament portant des verticilles très pauvres, souvent réduits à deux rameaux opposés, formés de blastospores allongées. Ebauches de pseudo-conidies à la base des rameaux latéraux. $\times 400$.
- FIG. 3. — *Candida zeylanoides* : colonie sur lame de 20 jours à 18°, sur milieu PC en atmosphère carbonique ; en haut, rameaux touffus, à verticilles pauvres et composés ; en bas, rameaux entourés de manchons globuleux de conidies, comme dans le type *Mycotorula*. $\times 150$.
- FIG. 4. — *Candida zeylanoides* : détail plus fortement grossi de la fig. 3 : verticilles formés de blastospores allongées, quelquefois phialiformes. $\times 400$.

PLANCHE XXXII

Colonies géantes

- FIG. 1. — Série de 6 colonies géantes de *Candida krusei*. De gauche à droite, souches : 202 B (levure H de Londres, D.C.L.), 738 A (levure B du cacao, Baarn), 632 A (souche Curzi I, Prof. Redaelli), 339 A (souche Ashford, de Porto Rico), 683 A (souche originale de Castellani, Ross Institute), colonies géantes granuleuses, 161 B (souche Panayotatou, Alexandrie).
- FIG. 2. — *Candida suaveolens*.
- FIG. 3. — Colonie géante membraneuse de *Candida krusei* sur milieu fortement peptoné (à 10 p. 100), hérissée de pointes et de mèches.
- FIG. 4. — Deux tubes de *Candida parakrusei* : ces 4 colonies présentent sur leurs bords des secteurs jaunâtres. Souches 390 B (souche Mathis, Dakar) et 432 B (hyperkératose plantaire).
- FIG. 5. — *Candida brumpti* (souche 478 B, hyperkératose du talon, ancien *C. ravauti*).
- FIG. 6. — *Candida aldoi*.
- FIG. 7. — *Candida deformans*.
- FIG. 8. — *Candida pseudotropicalis* (colonies lisses, souche 681 B) et *C. flareri* (colonies plissées).

PLANCHE XXXIII

Candida deformans et *C. suaveolens*

- FIG. 1. — *Candida suaveolens* (souche 728 A) : verticilles formés de blastospores allongées, dressées, appliquées contre le filament axial, portant souvent un petit bourgeon. $\times 400$.
- FIG. 2. — *Candida suaveolens* (souche 728 A). Ensemble d'une colonie sur lame montrant la ramification en pinceaux très effilés dont les verticilles dressés et appliqués finissent par confluer. $\times 60$.
- FIG. 3. — *Candida deformans* : rameaux alternes, pleurogènes, portant de petits verticilles de blastospores acrogènes. $\times 200$.
- FIG. 4. — Manière de charger l'aiguille triangulaire pour préparer les auxanogrammes des sucres ou de l'azote (voir p. 166).
- FIG. 5. — Exemple de fermentations par la méthode de Guerra (voir p. 76) : *Candida albicans* (souche 587 B, *Blastodendron oosporoides*). De gauche à droite : saccharose, lactose, maltose, lévulose, glycose, ces trois derniers sucres seuls positifs.

BIBLIOGRAPHIE

- ACTON (H. W.). — Mycotic infections of the throat due to *Endomyces tropicalis*. *Indian Jl. med. res.*, VI, 1919, p. 591-600.
- ALMON (L.) et STOVALL (W. D.). — Serological reactions of cultures of *Monilia* and of some other yeast-like fungi. *Jl. infect. dis.*, LV, 1934, p. 12-35.
- ANDERSON (H. W.). — Yeast-like fungi of the human intestinal tract. *Jl. infect. dis.*, XXI, 1917, p. 341-387.
- ASHFORD (B.). — The etiology of sprue. *Amer. Jl. med. sc.*, CLIV, 1917, p. 157-176.
- Certain conditions of the gastro-intestinal tract in Porto Rico and their relation to tropical sprue. *Amer. Jl. trop. med.*, VIII, 1928, p. 507-538.
- BAEZA (M.). — Notes upon non-chromogenous anascospored yeasts and the value of fermentation reactions in order to establish their botanical position. *Jl. trop. med. hyg.*, XXXVIII, 1935, p. 161-163.
- BASGAL (W.). — *Contribuição ao estudo das blastomicoses pulmonares*. Thèse Fac. méd. Rio de Janeiro, 1931, 156 p., 21 pl.
- BEAUVIERIE (J.) et LESIEUR (Ch.). — Etude sur quelques levures rencontrées chez l'homme dans certains exsudats pathologiques. *Jl. physiol. path. gén.*, XIV, 1912, p. 983-1008.
- BENHAM (R. W.). — Certain *Monilia* parasitic on man. Their identification by morphology and by agglutination. *Jl. infect. dis.*, XLIX, 1931, p. 183-215.
- BERKHOUT (C. M.). — *De Schimmelgeschlachten Monilia, Oidium, Oospora, en Torula*. Thèse Fac. sc. Univ. Utrecht, 1923, 73 p., 4 pl.
- BEURMANN (L. de) et GOUGEROT (H.). — Les exascoses. *Tribune médicale*, XLII, 1909, p. 501-505, 517-524.
- DU BOIS (Ch.). — Etude d'un cas de trichosporie. *Ann. dermat. et syphil.*, 1910, p. 447-456, 3 pl. (*Trichosporum glycophile*).
- BONÉ (G.). — Les Monilias. *C.R. Soc. biol.*, CXXII, 1936, p. 803-805.
- BONORDEN (H. F.). — *Handbuch der allgemeinen Mykologie*. Stuttgart, 1851, 336 p., 12 pl.
- BOURGEOIS (M.). — Ueber Onychomycosis saccharomycetica. *Derm. Ztschr.*, XXII, 1915, p. 411-420.
- BOURGUIGNON (G.). — *Formes microbiennes du champignon du muguet (morphologie et pathologie expérimentale)*. Thèse Fac. méd. Paris, 1906, 220 p., 188 fig.
- BROCQ-ROUSSEAU (D.), GUILLIERMOND (A.) et des CILLEULS (L.). — Etude d'un champignon pathogène du genre *Monilia*. *Ann. de Paras.*, V, 1927, p. 48-62.
- BURNS (W. E.). — *Iowa State Coll. of sc.*, VII, 1933, p. 433 (d'après *Rev. appl. mycol.*, XIII, 1934, p. 60) (*Cylindrium suaveolens*).
- CARNEVALE-RICCI (F.). — *Fermenti e pseudo-fermenti parassiti e commensali delle cripte tonsillari*. Milano, 1926, 79 p., 5 pl. (*Mycotorula tonsillæ*, p. 22-26).
- CASTELLANI (A.). — Tropical bronchomycosis. *Philippine Jl. sc.*, B, V, 1910, p. 197-210.
- Observations on fungi of the genus *Endomyces* affecting man in the tropics. *Contrib. f. Bak.*, 1 Abt., LVIII, 1911, p. 236-238.

- CASTELLANI (A.). — Observations on the fungi found in tropical bronchomycosis. *Lancet*, 1912, 1, p. 13-15.
- Note on the importance of hyphomycetes and other fungi in tropical pathology. *Brit. med. J.*, 1912, 2, p. 1208-1212.
- Further observations on the fungi of the genus *Endomyces* found in man. *Arch. de Paras.*, XVI, 1913, p. 184-186.
- The plurality of species of the so-called « thrush fungus » (chamignons du muguet) of temperate climates. *Ann. Inst. Pasteur*, XXX, 1916, p. 149-154.
- The etiology of thrush. *Jl. trop. med. hyg.*, XXIII, 1920, p. 17-22.
- Notes on three new yeast-like organisms and a new bacillus with remarks on the clinical conditions from which they have been isolated : furunculosis blastomycetica, macroglossia blastomycetica, stomatitis cryptococcobacillaris. *Jl. trop. med. hyg.*, XXVIII, 1925, p. 217-223.
- Blastomycosis and some other conditions due to yeast-like fungi (budding fungi). *Amer. Jl. trop. med.*, VIII, 1928, p. 379-422.
- A mannitol fermenting *Monilia*. *Proc. Soc. exper. biol. med.*, XXVI, 1929, p. 544-545.
- Blastomycosis, a short general account. *Med. Press and Circular*, CXXXVI, 1933, p. 438-443.
- A short general account for medical men of the genus *Monilia*. *Jl. trop. med. hyg.*, XL, 1937, p. 293-307.
- CASTELLANI (A.) et CHALMERS. — *Manual of trop. med.*, 2^e éd., 1913, p. 826-827.
- CASTELLANI et CHALMERS. — *Manual of tropical medicine*, 3^e édition, 1919.
- CASTELLANI (A.) et JACONO (I.). — Observations on fungi isolated from cases of blastomycosis cutis and blastomycosis pulmonalis in North America and Europe. *Jl. trop. med. hyg.*, XXXVI, 1933, p. 314.
- CASTELLANI (A.) et LOW (G. C.). — The rôle played by fungi in sprue. *Jl. trop. med. hyg.*, XVI, 1913, p. 33-35.
- CIFERRI (R.). — Contribuzioni alla sistematica delle *Torulopsidaceæ*, II-XIV. *Archiv Protistenkunde*, LXXI, 1930, p. 405-452.
- CIFERRI (R.) et ASHFORD (B.). — A new species of *Blastodendron*. *Porto Rico Jl. publ. health trop. med.*, V, 1929, p. 91-105.
- CIFERRI (R.) et REDAELLI (P.). — Studies on the *Torulopsidaceæ*. *Annales mycologiques*, XXVII, 1929, p. 243-295, pl. IV-VI.
- Contribuzioni alla sistematica delle *Torulopsidaceæ*, XV-XXXIII. *Archiv f. Mikrobiol.*, VI, 1935, p. 9-72.
- CISNEROS (J. M. Gomez de). — *El diagnostico generico de las Torulopsidaceas patogenas del hombre*. Comision permanente de investigaciones sanitarias, Madrid, 1934, 48 p., 10 pl.
- Die Differenzierung der parasitischen *Torulopsidaceen* des Menschen mittels der Mikrokultur nach Fortner (1). *Archiv. f. Dermatol. und Syphil.*, CLXXI, 1934, p. 99-111.
- DODGE (C. W.). — *Medical mycology. Fungous diseases of men and other mammals*. St-Louis, U.S.A., Mosby Co., 1935, 900 p.

(1) Nous mentionnons ce procédé p. 65. Cisneros l'a employé pour distinguer divers genres de champignons levuriformes. Malheureusement il ne figure que des colonies très jeunes, non caractéristiques et indéterminables. Seules les fig. 16 (*Candida albicans* avec chlamydospores) et 17 (*Geotrichum candidum*) sont reconnaissables. Son tableau de genres (p. 109) ne résiste pas à l'examen critique.

- DUBRUNFAUT. — *Ann. de chim. et phys.*, (3), XXI, 1847, p. 169.
- FISCHER (E.) et THIERFELDER (H.). — *Berichte chem. Gesellsch.*, 1894, p. 2031 (fermentation des hexoses).
- FISHER (C. V.) et ARNOLD (L.). — Classification of yeasts and yeast-like fungi. Distribution of mycological flore on normal skin and mucous membranes. *Univ. Illinois Bull.*, XXXIII, 1936, n° 51. (*Illinois med. and dental monographs*, I, n° 3), 92 p., 10 pl.
- FLORENCE (G.) et LAFAY (G.). — Contribution à l'étude des variations des milieux de culture sous l'influence des microorganismes. *Arch. phys. biol.*, XII, 1935, p. 37-55.
- FREI (W.). — Eine Soormycose der Nägel bei einer Salvarsan Dermatitis. (Reaktionen tierischer Immunseren mit Soorpilzen). Soorähnliche Pilze als Saprophyten auf pathologisch veränderter Haut. *Archiv Dermat. Syphil.*, CXXIX, 1921, p. 404-433.
- FROILANO de MELLO (I.) et PAES (A.). — *Endomyces cruzi* n. sp., agente (?) duma endomycose bronquica simulando asma. *Arq. hig. pat. exot.*, VI, 1918, p. 51-60.
- FROILANO de MELLO (I.) et FERNANDES (L. G.). — Sobre a frequencia do parasitismo das vias respiratorias humanas por fungos do tipo de levaduras. *Arq. hig. pat. exot.*, VI, 1918, p. 61-69.
- Ensaio de classificação de fungos pertencentes a classe das *Blastomyces* com descrição dum genero e algumas especies novas. *Arq. hig. pat. exot.*, VI, 1918, p. 207-316.
- FUJII (S.). — Ueber Pompholyx und pompholyxartige Erkrankungen. *Japan Jl. Dermat. Urol.*, XXI, 1931, p. 959-983.
- GEIGER (A.). — Beiträge zur Kenntnis der Sprosspilze ohne Sporenbildung. *Centrbl. f. Bakt.*, II Abt., XXVII, 1910, p. 97-149, 2 pl.
- GRASSET (H.). — Etude d'un champignon pyogène parasite de l'homme. *Arch. méd. expér.*, V, 1893, p. 664-678.
- GRAWITZ (P.). — Zur Botanik des Soors und der Dermatomyosen. *Dtsch. Ztschr. prakt. Med.*, 1877, p. 209-211, 220-223.
- GRUBY. — Recherches anatomiques sur une plante cryptogame qui constitue le vrai muguet des enfants. *C.R. Acad. sc.*, XIV, 1842, p. 634-635.
- GUERRA (P.). — Rôle des levures en dermatologie. *Etude clinique et mycologique*. Thèse Fac. méd. Paris, 1935, 51 p.
- GUILLIERMOND (A.). — *The yeasts* (traduction Tanner), J. Willy, New-York, 1920.
- *Clef dichotomique pour la détermination des levures*. Paris, Le François, 1928, 124 p.; cf. p. 50-51.
- HALLIER (E.). — *Die pflanzlichen Parasiten des menschlichen Körpers*. Leipzig, 1866, 116 p., 4 pl.; cf. p. 86-92.
- JOHAN-OLSEN (O.). — Zur Pleomorphismusfrage. *Centrbl. f. Bakt.*, 2 Abt., III, 1897, p. 276.
- JONES (C. P.) et MARTIN (D. S.). — Identification of yeast-like organisms isolated from the vaginal tracts of pregnant and nonpregnant women. *Amer. Jl. obstetrics and gynecol.*, XXXV, 1938, p. 98-106.
- KHOURI (J.). — Sur une *Monilia* isolée des crachats d'un malade atteint de blastomycose pulmonaire : *Monilia aegyptiaca*. *C.R. Soc. biol.*, CXI, 1932, p. 419-420.
- KUFFERATH (H.). — A propos des spores du *Pseudosaccharomyces apiculatus* (Reess-Hansen) Klöcker. *Ann. Soc. de zymologie*, Bruxelles, I, 1929, p. 214-218. (Technique de la coloration des ascospores).

- KUROTCHKIN (T. J.). — Variation of colonial characters of certain yeast-like fungi. *Chinese med. Jl.*, suppl. I, févr. 1936, p. 171-178.
- KÜTZING (F.). — *Algarum aquæ dulcis Germaniæ, decas III*, 1833.
- LAMB (J. H.) et LAMB (M. L.). — A grouping of the Monilias by fermentation and precipitin reactions. *Jl. infect. dis.*, LVI, 1935, p. 8-20.
- LANDRIEU (M.). — *Les mycoses oculaires*. Thèse Fac. méd. Paris, 1912, 136 p.; cf. p. 106. (*Endomyces ouillemini*).
- LANGERON (M.) et TALICE (R.-V.). — Nouvelles méthodes d'étude et essai de classification des champignons levuriformes. *Ann. de Paras.*, X, 1932, p. 1-80, pl. I-V.
- LAURENT (E.). — Observations sur le champignon du muguet. *Bull. Soc. belge microscopie*, XVI, 1890, p. 14.
- LODDER (J.). — Die anaskosporogenen Hefen. *Die Hefesammlung des « Centraal-bureau voor Schimmelcultures »*. Beiträge zu einer Monographie der Hefearten. II Teil. Erste Hälfte. Thèse Fac. sc. Utrecht, 1934, 256 p.
- LUCET (A.). — Contribution à l'étude étiologique et pathogénique de la langue noire pileuse. *Arch. de Paras.*, IV, 1901, p. 262-289.
- MACFIE (J. W. S.) et INGRAM (A.). — Bronchomoniliasis complicating pulmonary tuberculosis in a native of the Gold Coast, West Africa. *Ann. trop. med. paras.*, XV, 1921, p. 53-58. (*Monilia accraensis*).
- MACKINNON (J. E.). — Identificación de los hongos levuriformes aislados de once casos de onixis y perionixis. 8ª Reunion Soc. argentina patol. region. del Norte. Santiago del Estero, 1933. Buenos-Aires, 1934, p. 169-175.
- MAGNUSSON (H.). — The commonest forms of actinomycosis in domestic animals and their etiology. *Acta pathol. et microbiol. scandinavica*, V, 1928, p. 170-245; cf. p. 177-178 (cultures en atmosphère carbonique).
- MARENGO (G.). — Su di una paronichia dovuta ad una nuova specie di *Monilia*: la *Monilia onychophila* Pollacci e Nannizzi. *Arch. di biol.*, III, 1926, p. 25-36.
- MARTIN (D. S.), JONES (C. P.), YAO (K. F.) et LEE (L. E.). — A practical classification of the Monilias. *Jl. of bacteriol.*, XXXIV, 1937, p. 99-124, 3 pl.
- MATTLET (G.). — Mycoses dans l'Urundi. *Ann. Soc. belge méd. trop.*, VI, 1926, p. 1-41.
- MAZZA (S.), NIÑO (F. I.) et EGÜEZ (A.). — Perionixis blastomicetica por *Monilia* (n. sp.), 5ª Reunion Soc. argentina patol. reg. Norte, Jujuy 1929. Buenos-Aires, 1930, 1, p. 284-288 (*Monilia inexpectata*).
- MAZZA (S.) et PALAMEDI (B.). — Caso mortal de blastomicosis cutaneo mucosa. 7ª Reun. Soc. argentina patol. reg. Norte, Tucuman 1931, Buenos-Aires, 1932, I, p. 424-467.
- MAZZA (S.) et RIOS (M. de los). — Sobre un caso de moniliasis vaginal. *Bol. Inst. clin. quir. Univ.*, Buenos-Aires, VI, 1931, p. 215-225 (6ª Reunion Soc. argent. patol. reg. Norte, Salta 1930).
- MAZZA (S.), NIÑO (F. L.), QUINTANA (H.) et BERNASCONI. — Blastomicosis grave generalizada por *Monilia* n. sp. *Bol. Inst. clin. quir. Univ.*, Buenos-Aires, VI, 1931, p. 180-214 (6ª Reunion Soc. argent. patol. reg. Norte, Salta 1930). (*M. alvarezsotoi*).
- MOLLIARD (M.). — Sur la signification physiologique de l'acide oxalique. *C.R. Soc. biol.*, LXXXII, 1919, p. 351-353.
- Influence de la nature de la source d'azote sur la production des acides organiques par le *Sterigmatocystis nigra*. *C.R. Soc. biol.*, LXXXVII, 1922, p. 967-969.

- MOLLIARD (M.). — Action du gaz carbonique sur l'élongation des cellules. *C.R. Soc. biol.*, CXIX, 1935, p. 347-349.
- NEGRONI (P.). — *Cryptococcus* sp. aislados de epidermomicosis. *Rev. Soc. argentina biol.*, CVI, 1931, p. 648-652.
- La capsule des levures. *Ann. de Paras.*, XIV, 1936, p. 501-510, pl. XXIII.
- Etude de la capsule de *Mycotorula albicans* (Ch. Robin 1853). *Ann. de Paras.*, XIV, 1936, p. 511-516.
- La capsula de la *Mycotorula albicans* (Ch. Robin 1853). *Revista Inst. bacterio.*, Buenos-Aires, VI, 1935, p. 671-676.
- NEVEU-LEMAIRE (M.). — *Précis de parasitologie humaine*, 5^e édition, Paris, Lamarre, VI-466 p., 1921.
- NIÑO (F. L.). — Onixis y perionixis de origen blastomicosico (estudio clinico y micologico). *Bol. Inst. clin. quir. Univ.*, Buenos-Aires, V, 1931, p. 270-281. (5^a Reunion Soc. argent. patol. reg. Norte, Salta, 1930).
- NIÑO (F. L.) et PUGLISI (A.). — Moniliasis bucal. Su estudio clinico y micologico. *Semana med.*, XXXIV, 1927, p. 222-229.
- OKABE (Y.). — Studien ueber den Soorpilz. I. Mitteilung : Bakteriologische Eigenschaften und systematische Stellung des Soorpilzes. *Contrib. f. Bakt.*, 2 Abt., CXI, 1929, p. 181-187.
- OTA (M.). — Remarques complémentaires sur la levure pathogène de Favre (*Myceloblastanion faurei* n. sp.). *Ann. de Paras.*, III, 1925, p. 181-184.
- Beiträge zur Morphologie, Biologie und Systematik der pathogenen, asporogenen Sprosspilze. *Dermat. Woch.*, LXXVIII, 1924, p. 216-237, 260-265.
- Champignons parasites de l'homme (Etudes morphologiques et systématiques). *Japan Jl. of dermat. and urol.*, XXVIII, 1928, p. 5-6 et 101-130.
- PEREIRA FILHO. — Macroglossia mycotica. *Jl. trop. med. hyg.*, XXX, 1927, p. 8-10. (*Candida aldoii*).
- PINOY in BRAULT (J.) et MASSELOT (L.). — Etude sur une nouvelle mycose. *Ann. de dermat. et syphil.*, 1911, p. 592-602. (*Enanthiothammus braulti*, p. 599-602).
- PLAUT (H. C.). — *Beitrag zur systematischen Stellung des Soorpilzes in der Botanik*, Leipzig, Voigt, 1885, 16 p.
- *Neuer Beitrag zur Systematik des Soorpilzes*, Leipzig, Voigt, 1887, 32 p., 1 pl.
- POLLACCI et NANNIZZI. — *I miceti patogeni dell'uomo e degli animali*. Siena, 1922, 10 fascicules (description de 100 champignons).
- Sui caratteri dei generi *Monilia* e *Cryptococcus*. *R. Accad. Fisiocritici*, Siena, 25 mars 1927.
- QUEYRAT (L.) et LAROCHE (G.). — Sur une mycose vaginale (*Parendomyces albus*). Etude microbiologique, expérimentale et thérapeutique. *Bull. Mém. Soc. méd. hôp. Paris*, XXVIII, 1909, t. 2, p. 111-136 ; cf. p. 136.
- QUINQUAUD (M.). — Nouvelles recherches sur le muguet. Classification et conditions de développement du *Syringospora robinii* (dit *Oidium albicans*). *Arch. physiol. norm. et pathol.*, I, 1868, p. 290-305, pl. VIII.
- RAULIN (J.). — *Etudes cliniques sur la végétation*. Thèse Fac. sc. Paris, 1870, 216 p. Réimpression, Paris, Masson et Cie, 1905.
- REDAELLI (P.). — *I miceti come associazione microbica nella tubercolosi pulmonare cavitaria. Osservazioni micopatologiche, istopatologiche e sperimentali*, Pavia, 1925, 99 p., 9 pl.

- REESS (M.). — Ueber den Soorpilz. *Sitzungsber. phys. med. Soc. Erlangen*, IX, 1877, p. 190-195.
- RIVALIER (E.) et SEYDEL (S.). — Nouveau procédé de culture sur lames gélosées appliqué à l'étude microscopique des champignons des teignes. *Ann. de Parasitologie*, X, 1932, p. 444-452.
- Cultures minces sur lames gélosées, colorées et examinées *in situ* en préparations définitives pour l'étude des cryptogames microscopiques. *C.R. Soc. biol.*, CX, 1932, p. 181-183.
- ROBIN (Ch.). — *Histoire naturelle des végétaux parasites qui croissent sur l'homme et sur les animaux vivants*. Paris, Baillière, 1853, 704 p., 15 pl.; cf. p. 488-513.
- ROUX (G.) et LINOSSIER (G.). — Recherches morphologiques sur le champignon du muguet. *Arch. méd. expér.*, II, 1890, p. 62-87, 222-252.
- SALVAT (P.) et FONTOYNONT (M.). — Contribution à l'étude des mycoses malgaches. Abcès sous-dermiques dus à l'*Endomyces molardi* (n. sp.). *Bull. Soc. pathol. exot.*, XV, 1922, p. 311-320.
- SARTORY (A.), PETGES et CLAOUÉ. — Laryngite chronique pseudotuberculeuse d'origine mycosique, due à une levure nouvelle : *Cryptococcus laryngitidis* n. sp. *C.R. Soc. biol.*, LXXXIV, 1923, p. 179-180.
- SENEZ (A.). — El *Endomyces pulmonalis*. *Bol. labo. bact. Tucuman* (Rép. Argentine), I, 1918, p. 58-60.
- SHAW (F. W.). — A new species of *Monilia* pathogenic for man. *Science*, LXIV, 1926, p. 300 (*Monilia richmondii*).
- SHREWSBURY (J. F. D.). — The genus *Monilia*. *Jl. of pathol. and bacteriol.*, XXXVIII, 1934, I, p. 313-354; pl. XLII-L.
- STELLING-DEKKER (N. M.). — Die sporogenen Hefen. *Die Hefesammlung des « Centraalbureau voor Schimmelcultures »*. Beiträge zu einer Monographie der Hefearten. I Teil. Thèse Fac. sc., Utrecht, 1931, 547 p.
- TANIGUCHI (Y.). — Experimentelle Studie ueber « *erosio interdigitalis blastomycetica* » besonders ueber diejenigen bei den Papierarbeiterne in der Provinz Gifu (Sadare Krankheit). *Japan Jl. med. sc.*, XIII. *Dermat., Urol.*, I, 1926, p. 74-94, 2 pl.
- TALIGE (R.-V.) et MACKINNON (J.-E.). — La valeur du voile des cultures en milieu liquide pour la classification des champignons levuriformes (Mycotorulées). *C.R. Soc. biol.*, CXI, 1932, p. 534-535.
- La valeur des réactions de fermentation dans la classification des champignons levuriformes (Mycotorulées). *C.R. Soc. biol.*, CXIII, 1933, p. 1286-1288.
- Observaciones sobre algunos hongos levuriformes (Micotoruleas) aislados en Montevideo. *Arch. Soc. biol. Montevideo*, V, 1933, 4 p.
- Propriétés biologiques et diagnose de *Monilia albicans*. *C.R. Soc. biol.*, CXIII, 1933, p. 1285-1286.
- Que es *Monilia albicans*? *Arch. Soc. biol. Montevideo*, V, 1933.
- Determinacion de algunas cepas argentinas de hongos levuriformes. 8ª Reunion Soc. argentina patol. region. del Norte. Santiago del Estero 1933. Buenos-Aires, 1934, p. 160-167.
- VERDUN (P.). — *Précis de parasitologie humaine*, 2ª édition, Paris, Doin, 1913; cf. p. 731. (*Parasaccharomyces harteri*).
- VIVOLI (D.), AVELLANEDA (R.) et BARDESSI (E. de). — Glositis ulcerosa por *Monilia argentina* n. sp. 7ª Reunion Soc. argentina patol. reg. Norte, Tucuman 1931, Buenos-Aires, 1932, 1, p. 239-277.

- VUILLEMIN (P.). — Les caractères spécifiques du champignon du muguet (*Endomyces albicans*). *C.R. Acad. sc.*, CXXVII, 1898, p. 630-633.
- Les formes du champignon du muguet. *Revue mycologique* de Roume-guère, XXI, 1899, p. 43-55, pl. CLXXXIX-CXC.
- Les blastomycètes pathogènes. *Rev. gén. des sc.*, 30 août 1901, 40 colonnes et 15 fig.
- Matériaux pour une classification rationnelle des *Fungi imperfecti*. *C.R. Acad. sc.*, CL, 1910, p. 882-884.
- Différence fondamentale entre le genre *Monilia* et les genres *Scopulariopsis*, *Acmosporium* et *Catenularia*. *Bull. Soc. mycol. de France*, XXVII, 1911, p. 137-152.
- *Les champignons parasites et les mycoses de l'homme*. Paris, Lechevalier, 1931, 291 p.
- WEIL (P.-E.) et GAUDIN (L.). — Contribution à l'étude des onychomycoses. Onychomycoses à *Penicillium*, à *Scopulariopsis*, à *Sterigmatocystis*, à *Spi-caria*. *Arch. méd. expér.*, XXVIII, 1919, p. 461-463, pl. XII.
- WILL (H.). — Beiträge zur Kenntniss der Sprosspilze ohne Sporenbildung welche in Brauereibetrieben und in deren Umgebung vorkommen. *Contrib. f. Bakt.*, 2 Abt., six mémoires publiés de 1903 à 1916 (1) ; (n° 6), XLVI, 1916, p. 226-281. Die Torulaceen. *Pseudomycoderma vini*.
- WOLFRAM (St.) et ZACH (F.). — Ueber einige durch niedere Pilze verursachte Nagelerkrankungen beim Menschen. *Arch. f. Derm. u. Syphil.*, CLXIX, 1933-1934, p. 95-104.
- Ueber durch niedere Pilze verursachte Nagelerkrankungen beim Menschen. *Arch. f. Derm. u. Syphil.*, CLXX, 1934, p. 681-694.
- ZOPF (W.). — *Die Pilze*. Breslau, 1890, 500 p. ; cf. p. 478.

(1) Citation bibliographique complète des six mémoires dans : LANGERON et TALICE 1932, *Ann. de Paras.*, X, 1932, p. 79.

Institut de parasitologie de la Faculté de médecine de Paris
(Directeur : Prof. E. Brumpt). *Section de mycologie*
(Chef de service : D^r Maurice Langeron).