

# RÉPERTOIRE

## D'ESPÈCES ET DE GENRES NOUVEAUX

### Actinomycètes

*Actinomyces inominatus* Baldacci nom. nov. pro. *A. hominis* Waksman *Mycopathologia*, II, 1940, p. 160.

*Actinomyces moormani* Franklin. *Actinomycetaceæ*. Homme. U.S.A. *Ann. intern. med.*, XIII, 1940, p. 1212.

*Actinomyces paraguayensis* Almeida. *Actinomycetaceæ*. Homme. Paraguay. *Mycopathologia*, II, 1940, p. 203.

*Asteroides splenicus-ovis* Carpano. *Actinomycetaceæ*. Agneau (*Ovis aries*). Albanie. *Riv. mil. med. veter.*, III, 1940, p. 13.

*Actinomyces undulans* (sic) A. Sartory. *Actinomycetaceæ*. Homme. France. *C. R. Acad. sc. Paris*, CCXIV, 1942, p. 502.

*Actinomyces mucosus* Basu. *Actinomycetaceæ*. Homme. Inde. *Indian med. Gaz.*, LXXVIII, 1943, p. 578.

*Streptomyces* Waksman et Henrici. *Streptomycetaceæ* n. fam. Espèce type : *S. albus* (Rossi-Doria) Waksman et Henrici (= *Actinomyces albus* Rossi-Doria). *J. bact.*, XLVI, 1943, p. 339.

*Actinomyces septicus* Mac Neal et Blevins. *Actinomycetaceæ*. Endocardite, sang. Homme U.S.A. *J. bact.*, XLIX, 1945, p. 605.

*Actinomyces funduliformis* A. et R. Sartory et Bouteille. *Actinomycetaceæ*. Absès dentaire. Femme. France. *C. R. Acad. sc.*, Paris, CCXXII, 1946, p. 915.

*Proactinomyces pseudomaduræ* Balducci. *Actinomycetaceæ*. Homme. Mycétome. Italie. *Atti Ist. bot. Univ. Pavia*, (5), III, 1944, p. 164.

*Actinomyces caballi* Morquer et Comby. *Streptomycetaceæ*. Cheval (*Equus caballus*) Mamm. Absès sous-cutané et aponévrotiques. Sud de la France. *C. R. Soc. biol.*, CXXXVI, 1942, p. 703.

*Actinomyces serophilus* A. et R. Sartory et P. Verdure. *Actinomycetaceæ*. Ostéomyélite à foyers multiples. Homme. France. *Bull. Acad. méd. Paris*, CXXVIII, 1944, p. 490.

M. LANGERON.

### Myxophycées

*Oscillatoria enterica* Silbergleit et Redaelli. *Oscillatoriaceæ*. Colon. *Cyncephalus hamadryadis* (Mamm.). Ménagerie à Sienne, Italie. *Boll. sez. ital., Soc. internaz. microbiol.*, X, 1938, p. 284.

M. LANGERON.

## Hyphomycètes

- Géotrichum redaellii* Negroni et Fischer. *Arthrosporaceæ*. Intestin. Homme. Rép. Argentine. *Rev. argentina de dermatosifil.*, XXIV, 1940, p. 147.
- Hymenostilbe aphidis* Petch. *Stilbellaceæ*. Sur aphides. La Dominique, Indes occidentales. *Trans. brit. mycol. Soc.*, XXV, 1942, p. 259.
- Isaria sphaerocephala* Petch. *Stilbellaceæ*. Cocons de *Thosea recta*. Ceylan. *Trans. brit. mycol. Soc.*, XXV, 1942, p. 260.
- Acrostalagmus bactrosporus* Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Maryland, Virginie, *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 782.
- Acrostalagmus obovatus* Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Virginie, *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 784.
- Cephalosporium balanoides* Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Wisconsin. *Phytopathology*, XXXI, 1941 p. 786.
- Trichosporon proteolyticum* P. Negroni et T. de Villafañe Lastra. *Arthrosporaceæ*. Mycose généralisée. Homme. Rép. Argentine, Serrezuella, province de Cordoba. *Rev. Inst. bacter.*, Buenos-Aires, VIII, 1939, p. 455, et *Mycopathologia*, II, 1939, p. 57.
- Trichophyton batonrougei* A. Castellani. *Aleuriosporaceæ*, Cuir chevelu, Enfant nègre, U.S.A. Nouvelle-Orléans, *Jl. trop. med. hyg.*, XLII, 1939, p. 373.
- Trichophyton guzzonii* A. Castellani. *Aleuriosporaceæ*. Dos du pied. Enfant nègre. U.S.A. Nouvelle-Orléans. *Jl. trop. med. hyg.*, XLII, 1939, p. 374.
- Trichophyton tenuishypha* A. Castellani. *Aleuriosporaceæ*. Peau des bras et du tronc. Femme. Londres. *Jl. trop. med. hyg.*, XLII, 1939, p. 376.
- Rhinocladium pererai* W. Miranda. *Conidiosporaceæ*. Lymphangite gommeuse. Homme. Brésil, Pernambuco. W. Miranda, *Um novo esporotricado*. Thèse Fac. méd. Recife (Brésil), 1936.
- Cephalosporium leptodactyli* H. Mann. *Conidiosporaceæ*. « Breadfleckenkrankheit », *Potamobius leptodactylus* Eschh. (Crust.). Hongrie, Tihany, *Ztschr. f. Parasitenkunde*, XI, 1939, p. 432.
- Nematoctonus* Drechsler. *Basidiomycetes*. Espèce type : *N. leiosporus* Drechsler. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 779.
- Nematoctonus leiosporus* Drechsler. *Basidiomycetes*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Wisconsin. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 779.
- Nematoctonus tylosporus* Drechsler. *Basidiomycetes*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Maryland, Washington, D.C.; Virginie. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 779.
- Polycephalomyces* Y. Kobayasi. *Stilbellaceæ*. Espèce type : *P. formosus* Y. Kobayasi. *Sc. Rep. Tokyo Bunrika Daig.*, Sect. B, V, 1941, p. 245.
- Polycephalomyces formosus* Y. Kobayasi. *Stilbellaceæ*. Sur larves de Coléoptères. Japon. *Sc. Rep. Tokyo Bunrika Daig.*, Sect. B, V, 1941, p. 245.
- Spicaria coccospora* Drechsler. *Phialosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Wisconsin. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 787.
- Torulopsis glycosi* Serrano. *Blastosporaceæ*. Homme. Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenk.*, XII, 1940, p. 21.
- Cephalosporium subclavatum* Petch. *Conidiosporaceæ*. Sur larves de Lépidoptères. Angleterre. *Trans. brit. mycol. Soc.*, XXV, 1942, p. 262.

- Nematoctonus haptocladus* Drechsler. *Basidiomycetes*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Colorado. *Mycologia*, XXXVIII, 1946, p. 19.
- Oospora colorans* Van Beyma. *Arthrosporaceæ*. Homme. Hollande. *Antonie van Leeuwenhoek*, VII, 1939-1940, p. 285.
- Phialophora atra* van Beyma. *Phialosporaceæ*. Branchies d'un axolotl. Hollande. *Antonie van Leeuwenhoek*, VIII, 1942, p. 114.
- Trichophyton otæ* Dowding et Orr. *Aleuriosporaceæ*. Homme. Dermatomythie. Canada. *Canad. J. res., E*, XXII, 1944, p. 67.
- Trichosporon minus* Area Leão. *Arthrosporaceæ*. Homme. Aisselles. Brésil. *Mem. Inst. O. Cruz*, XXXV, 1940, p. 742.
- Harposporium diceraeum* Drechsler. *Phialosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Virginie. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 799.
- Harposporium helicoides* Drechsler. *Phialosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A. Maryland, Virginie. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 794.
- Harposporium oxycoracum* Drechsler. *Phialosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A. Wisconsin. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 796.
- Meria coniospora* Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Wisconsin, Virginie. *Phytopathology*, XXXI, 1941, p. 792.
- Mycotorula azymatica* Serrano. *Blastosporaceæ*. Homme. Allemagne. *Ztschr. f. Parasitenk.*, XII, 1940, p. 18.
- Trichosporum condensatum* G. Cochet. *Arthrosporaceæ*. Intestin. Lapin. France, Lille (Nord). *C. R. Soc. biol.*, CXXXIII, 1940, p. 77.
- Trichosporum multisporum* G. Cochet. *Arthrosporaceæ*. Intestin. Rat blanc. France, Lille (Nord). *C. R. Soc. biol.*, CXXXIII, 1940, p. 78.
- Dactylaria haptospora* Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Virginie et îles Hawai. *Mycologia*, XXXII, 1940, p. 459.
- Dactylella doedycoides* Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Wisconsin. *Mycologia*, XXXII, 1940, p. 454.
- Rhinotrichum depauperatum* Charles. *Conidiosporaceæ*. Sur *Paratetranychus yohersi*. Acariens. U.S.A., Floride. *Mycologia*, XXXII, 1940, p. 540.
- Tridentaria implicans* Drechsler. *Conidiosporaceæ*. Prédateur de Nématodes. U.S.A., Wisconsin. *Mycologia*, XXXII, 1940, p. 466.
- Candida pulcherrima* (Lindner) Windisch. *Blastosporaceæ*. *Comb. nov. pro Torulopsis pulcherrima* (Lindner) Saccardo. *Arch. f. Mikrobiol.*, XI, 1940, p. 387.
- Fonsecaea compactum* (Carrion) Carrion. *Conidiosporaceæ*. *Comb. nov. pro Hormodendron compactum*. Porto Rico *J. publ. Health*, XV, 1940, p. 359.
- Glenosporella loboï* O. da Fonseca et Arêa Leão. *Aleuriosporaceæ*. Homme. Brésil. *Rev. med.-cir. Brasil*, 1940, p. 7.

---

Le Gérant : Georges Masson.

---

MASSON et Cie Editeurs, Paris  
 Dépôt légal : 1947 (4<sup>e</sup> trimestre) — Numéro d'ordre : 647  
 à Cahors (France). — 74 773. — C. O. L. 31.2330  
 Imprimé par Imp. A. COUSSLANT (personnel intéressé)