LA CULTURE DES DERMATOPHYTES *IN VITRO* SUR DES CHEVEUX ISOLÉS

Par R. VANBREUSEGHEM (Anvers) (1)

On accorde, depuis Sabouraud, une importance considérable, sinon exagérée, à la morphologie que les dermatophytes adoptent dans le cheveu ou dans le poil qu'ils parasitent. Une étude minutieuse de ces différents aspects conduisit l'auteur du magistral traité des *Teignes* à baser sur elle sa classification des dermatophytes. On sait qu'il fallut tout un temps pour démembler ces genres artificiels et pour admettre, par exemple, qu'un genre *Achorion* ne pouvait être basé sur la formation des godets. D'ailleurs, tous les auteurs sont loin d'admettre qu'un parasite qui prend dans le cheveu l'aspect d'un *Microsporon* puisse être autre chose qu'un *Microsporon*. C'est pourtant ce qui a lieu avec le *Trichophyton ferrugineum*, qui, en culture, a une morphologie caractéristique de *Trichophyton*, tandis que le cheveu qu'il parasite montre des lésions fort semblables à celles produites par un *Microsporon audouini* ou un *Microsporon felineum*.

Nous nous sommes demandé s'il ne serait pas possible d'ajouter à la diagnose des espèces un caractère nouveau en étudiant le développement des dermatophytes sur des cheveux en dehors de l'organisme et, dans une courte note présentée le 12 juin 1949, à la Société belge de biologie, nous avons rapidement résumé nos observations sur ce sujet. Nous n'ignorions pas que différents auteurs avaient entrepris de cultiver les champignons des teignes sur des cheveux ou des poils d'animaux *in vivo* ; nous savions que la plupart avaient vu se développer sur ces milieux de culture, constitués essentiellement par de la kératine, la même morphologie que sur les milieux de culture usuels ; mais nous n'étions pas satisfait, parce que nous n'avions pas trouvé de bonnes descriptions de l'aspect des dermatophytes sur les cheveux, ni des lésions que présentaient

(1) Etude effectuée sous les auspices de l'Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale.

ceux-ci. La raison, d'après nous, était que la plupart des cultures avaient été faites sur de grandes quantités de cheveux et que l'expérience ne réalisait pas ce que fait dans la nature le follicule pileux : l'isolement d'un parasite autour d'un poil. Aussi, avons-nous pensé que le mieux serait de réussir la culture des champignons sur des cheveux isolés et, après quelques hésitations, nous nous sommes arrêté à la technique que nous décrirons plus loin. L'expérience nous a montré qu'elle convenait parfaitement aux buts que nous poursuivions.

Mais nous ferons d'abord une revue rapide de la littérature consacrée à ce sujet : elle n'est pas considérable.

Selon Tate, Roberts en 1894, plaçant des cheveux et des poils d'animaux dans des cultures de *Trichophyton* et d'*Achorion*, constate qu'ils étaient attaqués. « Some species destroy the cuticle and cortex simultaneously, while others first attacked the cortex and invaded the cuticle only later, or not at all. » On comprend mal que le cortex puisse être atteint sans que la cuticule soit lésée.

Toma, en 1929, travaillant dans le laboratoire de Sabouraud, reprend le problème. Ayant déposé à la surface des milieux de culture des poils stérilisés à 100° dans du sérum physiologique, il constate que « les champignons poussaient à côté des poils sans les envahir, ceux-ci ne servant que de support à leur mycélium » et que la morphologie du champignon est celle qu'il adopte sur les milieux de culture. Cependant, partant de l'hypothèse que le poil pourrait ne pas être envahi, parce que le milieu nutritif offert au champignon est trop riche, Toma imagina de tremper les poils dans un milieu nutritif pauvre et de les ensemercer avec des dermatophytes. Il n'indique pas la technique qu'il a employée, mais prétend « avoir réussi de très belles contaminations intrapilaires avec l'*Achorion gypseum*, avec un aspect rappelant de très près celui du cheveu parasité *in vivo* ». « Cependant, ajoute-t-il, sur les poils parasités *in vitro*, on n'observe pas de groupes d'éléments parasitaires cubiques, agglomérés sans ordre sur diverses parties du poil et extérieurement à lui, comme il est normal d'en observer sur le vivant autour du poil parasité. » Cette observation de Toma semble être restée isolée et personne n'a confirmé les constatations de cet auteur.

Tate, en 1929, dans son travail d'ensemble sur les ferments produits par les champignons des teignes, déclare ne pas avoir réussi à isoler une kératinase. Il rappelle que Mac Fadyen (1894) réussit à faire pousser *Trichophyton tonsurans* sur de la kératine. La kératine qui a subi l'action de ce champignon se solubilise plus facilement dans les bases fortes.

En 1933-1934, J. W. Williams, se servant comme milieu de culture de cheveux recueillis chez les coiffeurs, lavés à l'eau et autoclavés dans des boîtes de Pétri ou des tubes à essai, constate qu'il peut cultiver sur ce milieu un grand nombre de dermatophytes. Il démontre, en outre, que certains dermatophytes qui poussent mal sur des cheveux d'adultes se développent parfaitement sur des cheveux d'enfants. Dans un travail ultérieur, paru la même année, Williams constate que des cheveux d'enfants, traités par de l'éther durant 24 heures dans un appareil de Soxhlet, permettent une croissance plus rapide et plus abondante que des cheveux non traités. Ceci doit être mis en relation avec le travail récent de : S. Rothman, A. Smiljanic, A. L. Shapiro et A. W. Weitkamp, qui, de cheveux d'adultes, réussirent à extraire par l'éther des acides gras fungistatiques actifs sur *Microsporon audouini*. Ces acides gras existent en quantité minime sur le cheveu de l'enfant.

Suivant Gregory, Davidson et Gregory, en 1934, plaçant dans des cellules de Van Tieghem, en atmosphère humide, des cheveux naturellement infectés par *Microsporon audouini*, *Microsporon felinum* et *Trichophyton gypseum*, constatèrent que « le champignon qui avait parasité le cheveu entraînait rapidement dans une nouvelle phase de croissance, dans laquelle tous les organes caractéristiques des cultures sur milieux artificiels se développent parfaitement.

En 1935, P. H. Gregory, dans un article d'intérêt général, attire l'attention sur le pouvoir spécial qu'ont les dermatophytes de croître sur la kératine, avantage que « les dermatophytes présentent sur la plupart des autres champignons et qui constitue la base de leur relation parasitaire avec l'hôte ». Il insiste, d'autre part, sur la rareté de l'utilisation de la kératine dans l'organisme vivant et cite le cas des mallophages, des dermestes, et de certains oiseaux de proie (*Astur palumbarius* et *Vultur monachus*). Il ajoute que l'enzyme kératolytique des dermatophytes n'a pas été isolé.

Il ne sera sans doute pas hors de propos de signaler ici l'observation de B. Appel et H. B. Ansell qui rapportent deux cas de teigne du cuir chevelu dus à *Microsporon felinum*, dans lesquels ils constatèrent la présence, sur les cheveux, de fuseaux. Cependant, ces observations ne nous paraissent pas convaincantes. Les auteurs eux-mêmes écrivent au sujet du premier cas, p. 172 : « To our amazement, several hair stubs were filled [*sic*], not only with a mass of small round spores but with large, boatshaped fuseaux, which took the cotton blue stain deeply. However, the fuseaux lost their sharpness and distinction before photomicrographs were made (fig. 4). Some of the cotton blue had diffused out of the cells, softening out lines. » Et plus loin, p. 173, au sujet du deuxième cas :

« The morphologic features of many of these fuseaux did not permit of immediate identification. Some did not show clearly the double contour of the wall. Most of them were recognizable only by their outlines ; the septations and the morphologic character of their cytoplasm were not distinguishable. Whether this state was due to a degenerative change after the fuseaux were once clearly formed or whether these fuseaux were in an aborted phase is a matter of speculation. »

Les lecteurs du travail de Appel et Ansell ne manqueront pas de remarquer que le dessin en cartouche annexé à la figure 4, p. 172, ne reproduit que très grossièrement l'image d'un fuseau. On devrait, notamment, pouvoir reconnaître, sur le fuseau, l'extrémité distale de l'extrémité proximale. Au reste, si Appel et Ansell ont correctement interprété les images qu'ils ont vues, il n'est pas impossible d'admettre qu'occasionnellement un dermatophyte puisse développer sa morphologie de saprophyte dans le cheveu, si celui-ci a perdu contact, tout en restant dans le follicule pileux, avec sa papille.

D'autre part, nous nous rappelons avoir examiné, avec le Dr Rivallier, dans son laboratoire de l'Hôpital Saint-Louis, des préparations de cheveux infectés dans lesquels nous avons cru reconnaître des fuseaux, et avoir été amené à conclure qu'il ne s'agissait que de cellules épithéliales entraînées avec le cheveu au moment de son extraction. Nous pensons que les observations de Appel et Ansell méritent d'être prises en considération, mais que de nouvelles preuves sont nécessaires avant de les accepter comme l'expression de la réalité.

Technique. — Pour isoler complètement le cheveu, nous avons construit, à l'aide d'un tube de verre, un portoir en forme de S, sur lequel nous l'avons tendu. Le cheveu est attaché à ses deux extrémités par un nœud consolidé par une goutte de collodion. Un minuscule fragment de culture de dermatophyte sur gélose glycosée à 2 p. 100 est prélevé et déposé au milieu de la longueur du cheveu. Cette opération assez délicate est réalisée à l'air libre, sans précaution de stérilité particulière. Le fragment de culture adhère au cheveu assez aisément et s'y maintient dans la plupart des cas. Le portoir, chargé de son cheveu ensemencé, est alors placé dans un récipient de verre muni d'un couvercle ; au fond du récipient, on verse une vingtaine de centimètres cubes d'eau. Le tout est placé à l'étuve à 25°. Le portoir est conçu de telle façon (1 et 2, pl. XXIV) que le cheveu ne baigne pas dans le liquide. Les résultats sont observés à partir du dixième jour. Les cheveux employés sont en général des cheveux d'adultes recueillis sur le personnel du laboratoire ; ils ne sont soumis à aucun traitement particulier.

Témoins. — Une série de témoins a été réalisée pour savoir si les lésions observées dépendaient bien de la prolifération du dermatophyte à la surface du cheveu.

1° Des cheveux furent tendus sur des portoirs et placés en atmosphère humide à 25° durant une vingtaine de jours. A la fin de ce laps de temps, ils furent examinés au microscope, entre lame et lamelle, dans du chloral-lactophénol. Nous n'avons jamais pu y déceler la moindre lésion.

Certains cheveux, cependant, après un long séjour à 25° en atmosphère humide, montraient un léger écartement des cellules de la cuticule ; cela nous a paru net surtout sur des cheveux de femmes qui venaient de faire faire une ondulation permanente.

Les lésions que nous avons observées ne peuvent donc être dues ni à la tension exercée sur le cheveu par les branches du portoir, ni au degré élevé d'humidité réalisé dans nos expériences (1).

2° Un fragment de gélose glycosée à 2 p. 100, stérile et n'ayant pas étéensemencée par un dermatophyte, est déposé sur un cheveu tendu sur un portoir et porté à 25° en atmosphère humide. Après une vingtaine de jours, les cheveux sont examinés et ne montrent aucune lésion.

Les lésions observées sont donc bien dues au développement du parasite et à lui seul.

3° Nous avons tenté de faire les mêmes expériences sur des cheveux maintenus à l'air sec pour dissocier l'influence de l'humidité de celle de la croissance du champignon, mais, dans ces conditions, le champignon ne pousse pas, de sorte qu'aucune lésion ne se produit.

4° Nous nous sommes assuré que les résultats observés valaient aussi bien pour des cheveux d'adultes des deux sexes que pour des cheveux d'enfants. Nous n'avons observé aucune des différences observées par Williams dans des conditions qui, il est vrai, s'écartent des nôtres.

5° Quoique toutes nos observations aient été réalisées à l'air libre, sans aucune précaution de stérilité, nous n'avons observé qu'une seule fois, sur plus de 200 essais, une contamination d'un cheveu nonensemencé par un *Aspergillus*. Il va de soi que la verrerie employée fut stérilisée entre chaque expérience ; de même, les prélèvements des fragments de culture furent effectués avec les précautions de stérilité habituelle. Enfin, nous n'avons jamais placé dans un même récipient que des cheveuxensemencés par une même souche de champignon.

(1) La tension des branches du portoir provient de ce que celles-ci sont construites en verre très mince ; d'où une certaine flexibilité. Lorsque le cheveu est monté sur ces branches, il est tendu de telle sorte que même lorsqu'il s'allonge dans l'humidité, le cheveu reste allongé, rigide.

Morphologie des dermatophytes sur cheveux isolés. — Nous avons employé dans nos expériences 25 souches différentes se classant dans les quatre genres admis par Langeron : *Ctenomyces*, *Sabouraudites*, *Trichophyton*, *Epidermophyton*. Certaines souches avaient été isolées depuis peu de temps ; d'autres nous avaient été remises il y a deux ans par le Docteur Rivalier et entretenues depuis lors sur les milieux usuels. Nous n'avons enregistré dans les résultats aucune différence qui puisse tenir à la fraîcheur de la souche.

Du fragment de culture déposé sur le cheveu, on voit bientôt se développer des hyphes mycéliennes qui le longent (3, pl. XXIV) et se divisent dichotomiquement. Ces hyphes mycéliennes pourront s'écarter, en cheminant le long du cheveu, de plus de 1 cm. de part et d'autre du point d'inoculation. Ce développement à la surface du cheveu est d'autant plus important que les lésions produites sont plus abondantes ; de plus, il continue à se faire alors même que les hyphes mycéliennes sont séparées, par la cassure du cheveu, de la gélose nutritive qui était leur point de départ ; cela prouve que le champignon peut trouver dans le cheveu seul les substances nécessaires à son développement.

La morphologie microscopique observée varie naturellement suivant les espèces, mais elle est toujours celle qui caractérise l'espèce à l'état saprophytique. Les *Ctenomyces* montrent de nombreuses aleuries en grappe, des vrilles, des croix de Lorraine. Les *Sabouraudites* développent des aleuries et, s'ils sont d'origine animale, de nombreux fuseaux (4, pl. XXIV). Les *Trichophyton* présentent des aleuries en thyrses s'ils en forment habituellement en culture (*Trichophyton rubrum*) ou prennent la morphologie assez réduite qui leur est propre (*Trichophyton schönleini*). L'*Epidermophyton floccosum* développe d'admirables fuseaux.

Tous ces éléments sont ceux qu'on rencontre dans les cultures ; il n'en apparaît pas d'autres, sauf ceux que nous décrirons ci-dessous sous le nom d'« organes perforateurs ».

La morphologie des dermatophytes sur cheveux s'observe aisément dans le chloral-lactophénol. Les préparations obtenues sont très belles et, à supposer qu'on ignore l'espèce inoculée, on en ferait aisément le diagnostic en s'aidant des cultures obtenues sur les milieux usuels.

Nous avons également employé la technique suivante pour colorer le champignon sur le cheveu (3, pl. XXIV) (1) : le fragment du

(1) Elle s'inspire de la technique recommandée récemment par Muskatblit (11) pour la coloration des cheveux parasités et de la technique de Rivalier-Seydel pour la coloration des cultures sur lame (12).

cheveu à examiner est déposé à la surface d'une lame porte-objet bien dégraissée par flambage. On verse sur le cheveu quelques gouttes de liquide de Carnoy (alcool absolu 60, chloroforme 30, acide acétique glacial 10). Après cinq minutes, on élimine le liquide et, dès que la préparation est sèche, on la plonge rapidement dans un mélange de : collodion 1, éther sulfurique 2, alcool absolu 2 ; on laisse sécher durant quelques heures à l'étuve. On colore suivant le procédé de Rivalier-Seydel pour les cultures sur lame (cf. Langeron, *Précis de Mycologie*, 1945, p. 467).

Lésions déterminées dans le cheveu par les dermatophytes. — Disons immédiatement que les lésions observées ne sont jamais celles qu'on constate dans le cheveu parasité. Nos observations confirment donc celles des auteurs que nous avons citées au début de ce travail, à l'exception de Toma, qui prétend avoir obtenu avec l'*Achorion gypseum* des lésions filamenteuses, intrapilaires. Le cheveu constitue donc, pour le champignon, hors de l'organisme, un support entièrement différent de ce qu'il est *in vivo*. Rappelons que la zone de croissance des dermatophytes dans le cheveu — frange d'Adamson — est en contact avec la papille du cheveu et que c'est en ce point vraisemblablement que se trouvent les substances spéciales qui font d'eux des parasites et non des saprophytes. Il serait intéressant de savoir si les parasites des Piedra cultivés suivant la technique que nous avons employée produiraient *in vitro* de vrais nodules piédriques.

Certains dermatophytes produisent peu ou pas de lésions du cheveu. Ce sont en général des champignons à développement lent, qui ne font pas apparaître de spores en cultures : tels *Trichophyton ferrugineum*, *Achorion schönleini*. Le cheveu examiné entre lame et lamelle montre un développement local de la culture, quelques hyphes mycéliennes s'étendant à la surface du cheveu et à courte distance du point d'inoculation. La cuticule du cheveu reste tout à fait indemne (5, pl. XXV).

Un type de lésion bien particulier est celui réalisé par *Trichophyton rubrum* ; nous ne l'avons vu apparaître que sous l'action des souches de cette espèce, quoiqu'elle puisse, rarement, déterminer des lésions du même type, mais toujours minimales, que celui que nous décrirons plus bas. Des cheveux inoculés avec *Trichophyton rubrum* présentent une fonte locale soit à l'endroit inoculé, soit à une courte distance de cet endroit. Le cheveu s'amincit progressivement suivant son diamètre et finit par se casser (6 et 7, pl. XXV). Les lésions ne sont pas toujours aussi accusées. Parfois, on ne constate qu'une érosion du cheveu qui supprime la cuticule et

une partie du cortex. Cette lésion est tellement caractéristique que nous avons tendance à la considérer comme spécifique du *Trichophyton rubrum*; encore faudrait-il s'entendre sur ce qui se cache sous ce nom. Tous nos essais ont été faits avec des souches belges ou congolaises qui ont fait l'objet d'un travail récent.

Le deuxième type de lésion est réalisé par des dermatophytes qui produisent en grand nombre des aleuries ou des fuseaux, mais non exclusivement par eux. Lorsque, après une dizaine de jours d'incubation à 25°, on extrait du récipient, où il a été maintenu dans une atmosphère humide, le cheveuensemencé, par exemple, par un *Ctenomyces persicolor* ou un *Sabouraudites (Microsporon) felineus*, on constate souvent que le cheveu est cassé. Ou, si le cheveu n'est pas cassé en apparence, les deux fragments sont maintenus l'un près de l'autre par les hyphes mycéliennes qui passent au-dessus de la cassure. La cassure se produit le plus souvent au niveau du point d'inoculation, parfois à 2 ou 3 mm. de ce point, parfois encore elle se produit en plusieurs endroits (8 et 9, pl. XXV).

Lorsqu'on examine au petit grossissement du microscope un de ces cheveux, on constate qu'il présente non seulement une ou plusieurs cassures perpendiculaires au grand axe du cheveu, mais encore un grand nombre d'incisions dirigées suivant la même direction. L'examen au fort grossissement montre, outre les éléments mycéliens et les formes de reproductions caractéristiques, que les fissures perpendiculaires au grand axe du cheveu sont occupées par des formations nouvelles auxquelles nous avons donné le nom d'« organes perforateurs » — et que nous aurions peut-être pu appeler *haustorium*, si nous n'avions craint de préjuger de leurs fonctions. Ces organes ont la forme d'un triangle à base très étroite parallèle à la cuticule du cheveu et à sommet arrondi dirigé vers la moelle du cheveu (10 et 11, pl. XXVI). Ils sont constitués par des cellules à double contour, disposées en une file régulière, les cellules situées vers l'extérieur du poil étant beaucoup plus grosses que les cellules dirigées vers l'intérieur. Ces organes progressent par leur extrémité, par division de la cellule terminale, et s'enfoncent dans le cheveu. On voit souvent, à leur entrée dans le cheveu, qu'ils forment une crosse qui se continue par le filament mycélien qui leur a donné naissance (fig. 1 et 2). Les cellules qui constituent cette crosse sont souvent chargées de pigments mélaniques : c'est toujours le cas lorsque le cheveuensemencé est de teinte foncée.

Voici, à notre sens, comment il faut comprendre la formation de ces crosses. Une hyphe mycélienne s'enfonce dans le cheveu, vraisemblablement à la faveur d'un ferment kératolytique qu'elle a

sécrété. Elle ne tarde pas à se segmenter, tout en s'enfonçant davantage. Mais, dans certains cas, soit que la croissance soit trop rapide, soit que le ferment soit sécrété en trop faible quantité, soit encore parce que la kératine se laisse difficilement attaquer, les cellules les plus anciennes sont repoussées hors du cheveu et entraînent avec elles les grains de pigment mélanique. Nous pensons que cette explication est conforme à la réalité pour deux raisons :

1° on s'expliquerait difficilement, d'une autre façon, la présence de pigment sur les éléments fungiques en dehors du cheveu. Ne s'y trouvant pas normalement, ils doivent y avoir été apportés et nous concevons qu'ils y ont été apportés par le recul des cellules du champignon au cours de la formation de l'organe perforateur ;

Fig. 1 et 2. — Organes perforateurs produits par *Ctenomyces persicolor* (souche RV 238).

2° c'est lorsque ces organes se trouvent le moins enfoncés dans le cheveu que les crosses sont le plus accusées ; ce qui s'explique par l'hypothèse que nous avons émise, d'une plus grande résistance de la kératine ou d'une quantité insuffisante de ferment.

Il va de soi que, le cheveu étant examiné au microscope sur toute son épaisseur, on doit s'attendre à trouver des images diverses formées par les organes perforateurs. Si ceux-ci se présentent latéralement à l'œil de l'observateur, on voit l'image que nous venons de décrire ; s'ils se présentent suivant leur point d'attaque sur le cheveu, on voit une surface arrondie ; s'ils se présentent légèrement de biais, l'œil parcourra les contours d'une surface ovalaire.

Il est naturel également de constater que plus on s'écarte du point d'ensemencement, plus on découvre des organes perforateurs dont les plus extrêmes ont à peine entamé le cheveu. Par contre, parcourant le cheveu vers le point inoculé, on rencontre des organes de plus

en plus importants qui entament le cheveu sur la moitié de son diamètre, le traversent complètement et vont jusqu'à déterminer la cassure.

A côté de ces deux types de lésions que nous venons de décrire, il existe des lésions moins précises et diverses. La cuticule du cheveu peut être soulevée ou légèrement érodée ; la cuticule peut être disparue sur une certaine longueur et le cortex légèrement entamé ; ou encore, il ne s'est formé que des organes perforateurs minuscules qui ne semblent pas avoir la force nécessaire pour pénétrer le cheveu et réaliser sa cassure.

Résultats obtenus avec différents dermatophytes. — Nous avons effectué plus de deux cents ensemencements de cheveux avec 25 souches de dermatophytes et une levure, *Candida albicans*. Disons tout de suite que cette levure, quoique s'étant développée sur le cheveu à une légère distance du point d'inoculation, n'y a déterminé aucune lésion ; nous n'avons vu apparaître que des éléments blastosporés et aucun élément filamenteux. Mais nous reconnaissons n'avoir pas poussé très loin cet essai, dans lequel nous ne voulions trouver qu'une indication de travail.

Les 25 souches de dermatophytes employées comprenaient quatre souches de *Ctenomyces*, appartenant à des espèces différentes : *C. persicolor* (souche RV 238), *C. interdigitalis* (souche RV 592), *C. asteroides* (souche Kopeliovitch, du laboratoire du Dr Rivalier, à Paris) et *C. granulosis* (souche RV 233) ; cinq souches de *Sabouraudites* (*Microsporon*) appartenant à trois espèces différentes : *S. felineus* (souches RV 33 et RV 45'), *S. audouini* (souches RV 5 et RV 373) et *S. duboisi* (souche RV 293) ; quatorze souches de *Trichophyton* appartenant à neuf espèces ou variétés différentes : *T. rubrum* (souches RV 440, RV 533, RV 209, RV 450, et souches Koch, Cameroun, du laboratoire du Dr Rivalier), *T. schönleini* (RV 125), *T. soudanense* (souches RV 629 et RV 671), *T. glabrum* (souche RV 570), *T. violaceum* (souche RV 544), *T. ferrugineum* (souche RV 341), *T. ferrugineum*, var. *album* (souche RV 540), *T. acumina-*

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXIV

FIG. 1. — Cheveu tendu sur un portoir. Grandeur : 7/10.

FIG. 2. — Cheveu tendu sur un portoir et ensemencé. Grandeur : 7/10.

FIG. 3. — *Trichophyton rubrum* (souche RV 440). Culture sur cheveu âgée de 10 jours. Coloration au bleu coton Soudan au lactophénol. Env. $\times 400$.

FIG. 4. — « Organes perforateurs » et fuseaux produits par *Sabouraudites felineus* (souche RV 45'). Culture sur cheveu âgée de 16 jours. Env. $\times 100$.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XXV

- FIG. 5. — *Trichophyton schænteini* (souche RV 125). Culture sur cheveu âgée de 16 jours. Absence d'altération du cheveu. Env. $\times$ 100.
- FIG. 6. — *Trichophyton rubrum* (souche Koch, Cameroun). Culture sur cheveu âgée de 17 jours. Fonte et cassure du cheveu. Env. $\times$ 100.
- FIG. 7. — *Trichophyton rubrum* (souche Koch, Cameroun). Culture sur cheveu âgée de 17 jours. Fonte du cheveu. Env. $\times$ 100.
- FIG. 8. — *Ctenomyces persicolor* (souche RV 238). Culture sur cheveu âgée de 16 jours. Cassures multiples. Env. $\times$ 100.
- FIG. 9. — *Ctenomyces persicolor* (souche RV 238). Culture sur cheveu âgée de 16 jours. Cassures. Env. $\times$ 100.
-
-

FIG. 10. — Organes perforateurs produits par *Ctenomyces persicolor* (souche RV 238). Culture sur cheveu âgée de 16 jours. Env. $\times 1.000$.

FIG. 11. — Organes perforateurs produits par *Ctenomyces persicolor* (souche RV 238). Culture sur cheveu âgée de 16 jours. Env. $\times 1.000$.

Microphotographies R. Ressler.

tum (souche RV 102) et *T. rodhaini* (souche RV 362) ; enfin, deux souches d'*Epidermophyton floccosum* (souches RV 452 et RV 523).

Nous avons jugé utile de résumer nos observations sur l'action déterminée par les dermatophytes par ces différentes souches, dans les paragraphes qui suivent. Mais nous voulons attirer l'attention sur le fait qu'à notre sens, ces valeurs sont relatives et qu'en multipliant les essais, on arrivera peut-être à trouver un *Ctenomyces persicolor* ou un *Sabouraudites felineus* qui n'attaque pas le cheveu ou qui l'attaque peu, ou encore, une souche de *Trichophyton ferrugineum* qui produise sur le cheveu des lésions légères. Nous sommes arrivé à ces conclusions en multipliant nos essais avec certains dermatophytes qui, dans nos premières expériences, s'étaient montrés inactifs. Il ne faudrait donc pas vouloir tirer de l'absence ou de la présence de lésions des caractères absolus de l'espèce.

DERMATOPHYTES N'AYANT JAMAIS ATTAQUÉ LE CHEVEU.

Trichophyton ferrugineum (souche RV 341),
T. ferrugineum, var. *album* (souche RV 540).

DERMATOPHYTES ATTAQUANT RAREMENT LE CHEVEU.

Ctenomyces interdigitalis (souche RV 592),
C. granulosis (souche RV 233),
Sabouraudites audouini (souche RV 5),
Trichophyton glabrum (souche RV 570),
T. rodhaini (souche RV 362),
T. rubrum (souche RV 209),
T. soudanense (souches RV 629 et 671).
T. violaceum (souche RV 544),
T. schönleini (souche RV 125).

DERMATOPHYTES ATTAQUANT TOUJOURS LE CHEVEU.

Ctenomyces asteroides (souche Kopeliovitch),
C. persicolor (souche RV 238),
Sabouraudites felineus (souche RV 33),
S. felineus (souche RV 45'),
S. duboisi (souche RV 293),
Trichophyton rubrum (souche RV 450),
T. rubrum (souche RV 533),
T. rubrum (souche Koch, Cameroun),
Epidermophyton floccosum (souche RV 523).

DERMATOPHYTES ATTAQUANT PRESQUE TOUJOURS LE CHEVEU.

Sabouraudites audouini (souche RV 373),
Trichophyton acuminatum (souche RV 102),

T. rubrum (souche RV 440),
Epidermophyton floccosum (souche RV 452).

DERMATOPHYTES FORMANT TOUJOURS DES « ORGANES PERFORATEURS ».

Ctenomyces persicolor (souche RV 238),
Sabouraudites felineus (souche RV 45'),
S. duboisi (souche RV 293).

DERMATOPHYTES AYANT PROVOQUÉ UNE CASSURE DU CHEVEU.

Ctenomyces persicolor (souche RV 238),
C. asteroides (souche Kopeliovitch),
Sabouraudites felineus (souche RV 45'),
S. felineus (souche RV 33),
S. duboisi (souche RV 293),
Trichophyton rubrum (souche RV 540),
T. rubrum (souche RV 533),
T. rubrum (souche Koch, Cameroun),
T. rodhaini (souche RV 362),
T. acuminatum (souche RV 102),
T. schönleinii (souche RV 125),
Epidermophyton floccosum (souche RV 452),
E. floccosum (souche RV 523).

DERMATOPHYTES CASSANT TOUJOURS LE CHEVEU.

Ctenomyces asteroides (souche Kopeliovitch),
Sabouraudites felineus (souche RV 45').

Il est évidemment impossible et il serait inutile de décrire complètement toutes les variations possibles de l'activité des dermatophytes envisagée du point de vue sur lequel notre attention s'est fixée. Il y a, et c'est ce qu'il faut retenir, des souches très actives et des souches peu actives. Il est possible que nous arrivions à préciser davantage ces phénomènes en les étudiant davantage.

On pourrait s'étonner de ce que le *Ctenomyces asteroides* (souche Kopeliovitch), qui a toujours cassé le cheveu sur lequel nous l'avions ensemencé, ne se trouve pas classé parmi les souches qui ont toujours des « organes perforateurs », alors que le mécanisme par lequel il attaque le cheveu n'est pas celui que nous avons reconnu propre au *Trichophyton rubrum*. Le fait doit sans doute s'expliquer par ceci que la souche de *Ctenomyces asteroides* étant très active, la cassure aura été produite par un bouchon unique dont nous aurons reconnu l'action sans en constater la présence.

Action de la lumière de Wood. — Les cheveux sur lesquels se développent les dermatophytes *in vivo* ne nous ont pas paru acqué-

rir une fluorescence autre que celle qui leur est propre et que celle de la culture. Nous avons cependant utilisé dans nos observations des espèces qui, *in vivo*, créent une fluorescence très particulière dans le cheveu parasité. Comme on admet généralement que la fluorescence du cheveu parasité est due à l'apparition de substances nouvelles sous l'action du parasite et non pas au parasite lui-même, il semblerait qu'il faille conclure que l'action du dermatophyte *in vivo* est différente de ce qu'elle est *in vitro*. Ainsi, à des morphologies différentes, correspondraient des physiologies variées.

Discussion. — Nous avons mis au point une technique nouvelle qui permet d'étudier la croissance des dermatophytes sur des cheveux *in vitro*. Nous avons confirmé les observations faites par d'autres auteurs et qui montrent que les parasites des teignes cultivés sur cheveux y prennent une morphologie identique à celle qu'ils adoptent sur les milieux de culture. Les préparations microscopiques, obtenues par l'emploi de la technique que nous préconisons, permettent de faire une étude complète de la morphologie du dermatophyte ; sans avoir la perfection des images obtenues par la technique des cultures sur lames gélosées de Rivalier-Seydel, elles fournissent toutefois une image très complète du champignon.

D'autre part, nous avons montré que les dermatophytes peuvent déterminer dans le cheveu des lésions particulières. Ces lésions se répartissent en deux types principaux :

1° une fonte du cheveu suivant son diamètre, fonte qui peut aller jusqu'à la cassure. Ce type de lésion n'a été réalisé que par des souches de *Trichophyton rubrum* ;

2° la formation de fissures perpendiculaires au grand axe du cheveu par pénétration d'« organes perforateurs ». Souvent, ce type de lésion aboutit à la cassure du cheveu.

Les lésions que nous avons observées apportent un nouvel argument à l'hypothèse de la sécrétion d'un ferment kératolytique par les dermatophytes. Cependant, à notre connaissance, l'existence de ce ferment reste toujours à démontrer, puisque, si l'on en constate les effets, personne, jusqu'à présent, n'est parvenu à l'isoler.

La raison pour laquelle les dermatophytes adoptent dans les cheveux *in vivo* une morphologie différente de celle qui les caractérise sur les cheveux *in vitro*, n'apparaît pas nettement. Il faut admettre que le parasite reçoit de la papille du cheveu, au niveau de sa zone de croissance, des substances spéciales qui déterminent sa morphologie. Ou bien, encore, on peut supposer que cette morphologie du parasite caractérise un état de défense contre un organisme vivant qui réagit.

On peut s'étonner qu'en employant une technique aussi simple que celle que nous avons décrite, nous n'ayons pas eu à enregistrer de contamination. Les raisons en sont peut-être :

1° l'absence du milieu de culture favorable pour la plupart des microbes et des champignons ;

2° le fait que le seul fragment de gélose apporté sur le cheveu au moment de l'ensemencement est déjà occupé par un champignon qui le défendrait contre des agressions éventuelles par des substances antibiotiques.

Les lésions produites dans les cheveux ensemencés sont différentes suivant les espèces. Nous n'avons pu, jusqu'à présent, déterminer avec certitude les facteurs qui régissent l'importance des lésions. Il semble cependant que celles-ci sont d'autant plus grandes que le champignon fabrique davantage d'éléments sporulés. Il sera intéressant à ce point de vue de déterminer l'action sur le cheveu des souches de dermatophytes devenues pléomorphiques. Il n'est pas abusif de croire que leur action pourrait être différente de celle des souches à morphologie normale. Etudiant les enzymes produits par les dermatophytes, Tate a pu démontrer que la forme normale de *Ctenomyces radiolatus* possède une activité protéolytique plus grande que la forme pléomorphique, tandis que cette dernière produit une uréase et une amygdalase plus forte que celle issue de la souche normale. Tate n'a pu démontrer de différences d'activité pour les autres ferments formés par les deux formes de *Ctenomyces radiolatus*.

Il sera également intéressant de rechercher si d'autres champignons pathogènes ou des saprophytes banaux peuvent se développer sur le cheveu *in vitro* et y créer des lésions. La détermination de ces caractères pourrait contribuer à la diagnose de certains dermatophytes ou de champignons que l'on suppose appartenir à ce groupe. Suivant Gregory, certains *Scopulariopsis* et *Aspergillus* pourraient se développer sur des tissus kératinisés. Nous avons dit au cours de ce travail qu'une souche de *Candida albicans* s'était développée sous sa forme blastosporée sans former de filaments et que nous n'avons pu déceler aucune lésion dans le cheveu.

RÉSUMÉ

Les champignons des teignes cultivés *in vitro* sur des cheveux isolés se développent suivant la morphologie qui leur est propre dans les milieux de culture. Au cours de plus de 200 essais effectués

avec 25 souches de dermatophytes appartenant aux quatre genres admis par Langeron : *Ctenomyces*, *Sabouraudites*, *Trichophyton*, *Epidermophyton*, nous n'avons pas vu une seule fois le champignon se développer sous sa forme parasitaire. D'autre part, les dermatophytes déterminent dans le cheveuensemencé des lésions particulières qui n'avaient pas été décrites jusqu'ici (1).

BIBLIOGRAPHIE

- APPEL (B.) et ANSELL (H. B.). — Large spores (macroconidia, fuseaux) of *Microsporum canis in vivo*. Report of two cases. *Arch. Derm. Syph.*, Chicago, LIX, 1949, 168.
- DAVIDSON (A. M.) et GREGORY (P. H.). — In situ cultures of Dermatophytes. *Canad. J. Research*, X, 1934, 373.
- GREGORY (P. H.). — The Dermatophytes. *Biol. Rev. of the Cambridge Philos. Soc.*, X, 1935, 208-233.
- MUSKATBLIT (E.). — Staining of fungi in scales and hairs : method of staining with polychrome methylene blue. *Arch. Derm. Syph.*, Chicago, LIX, 1949, 236.
- RIVALIER (E.). — La culture des champignons des teignes sur lames gélosées. *Ann. Derm. Syph.*, 7^e série, V, 1934, 780. *Ann. paras.*, X, 1932, 444-452.
- ROBERTS (L.). — The physiology of the Trichophytos. *J. Path. and Bact.*, III, 1894, 300-309.
- ROTHMAN (S.), SMILJANIC (A.), SHAPIRO (A. L.) et WEITKAMP (A. W.). — *J. Invest. Dermat.*, VIII, 1947, 81.
- TATE (P.). — On the enzymes of certain dermatophytes or ringworm fungi. *Parasitology*, XXI, 1929, 31.
- TOMA (A.). — Sur l'infection des cheveux « in vitro » par les champignons des teignes. *Ann. Dermat. et Syph.*, X, 1929, 641.
- VAN BREUSEGHEM (R.). — A propos de *T. rubrum*. Sa présence en Belgique et au Congo Belge. *Soc. Belge de Derm. et de Syph.*, Séance du 12 juin 1949.
- Lésions déterminées *in vitro* par les dermatophytes sur des cheveux isolés. *Soc. Belge de Biologie*, Séance du 25 juin 1949.
- WILLIAMS (J. W.). — Scalp products and hair as a culture medium for certain pathogenic fungi. *Proc. Soc. Exper. Biol. and Med.*, XXXI, 1933-34, 586.
- Scalp products and hair before puberty as a culture medium for certain pathogenic fungi. *Proc. Soc. Exper. Biol. and Med.*, XXXI, 1933-34, 944.

(1) Les « organes perforateurs » ont été décrits dans une note précédente sous le nom de « bouchons », dénomination à laquelle nous préférons renoncer.