REVUE CRITIQUE

VIRUS NEUROTROPES ENCÉPHALITOGÈNES

Par Manuel ANSEL

Au cours de ces dernières années, les investigations des chercheurs ont considérablement augmenté nos connaissances, tant au point de vue scientifique qu'au point de vue clinique, dans le domaine des infections à virus. Il paraît utile de confronter avec les faits et de coordonner des opinions, parfois confuses et contradictoires, suivant qu'elles sont considérées par un naturaliste, un homme de laboratoire ou un médecin. Ceci nous a paru plus particulièrement intéressant en ce qui concerne certains parasites du système nerveux.

I. - Parasites du système nerveux

Parmi les êtres vivants qui peuvent parasiter le système nerveux et s'y adapter, nous trouvons non seulement des virus ou des bactéries, mais aussi des protistes, voire des animaux, même très élevés en organisation.

Les larves de certains diptères (*Æstridæ* entre autres) s'attaquent au système nerveux et s'y développent ; il en est de même des larves de certains nématodes (trichine), de cestodes (cysticerques, cœnures ou hydatides), de trématodes (œufs de bilharzies). Parmi les protistes, il suffit de rappeler, par exemple : des levures telles que *Torulopsis neoformans*, des flagellés tels que le trypanosome de la maladie du sommeil ou des sporozoaires tels que *Toxoplasma gondii*. Parmi les bactéries, nombreuses sont les espèces susceptibles de provoquer des méningo-encéphalites, puisque ces organismes peuvent indifféremment s'attaquer à la plupart des appareils ou des tissus.

L'étiologie des encéphalites ou des méningo-encéphalomyélites devient par contre plus intéressante, étant donnée la plus grande

spécificité des virus. Ceux-ci, entendus au sens large et habituel du mot, sont des micro-organismes constitués morphologiquement par une masse de nucléoprotéide généralement sans membrane, et caractérisés biologiquement par leur intense pouvoir de multiplication, l'impossibilité de les cultiver sur les milieux habituels, utilisés pour les microbes, en dehors de la présence de tissus vivants, ainsi que, le plus souvent, par leur étroite spécificité parasitaire pour un appareil, voire un tissu ou même certaines cellules.

Vu l'insuffisance de nos connaissances sur la constitution fondamentale de ces virus, une classification naturelle de ces êtres est encore actuellement impossible. Toutefois, deux mesures s'imposaient pour mettre de l'ordre dans ce vaste groupe d'organismes.

La première consistait à donner à ces êtres une dénomination conforme à la nomenclature binominale de Linné et c'est ce qui n'a été fait qu'en dernier lieu et tout récemment, dans la dernière édition du *Bergey's Manual of Determinative Bacteriology* (6^e édition, 1948) ; la deuxième mesure devait être de grouper ces organismes en ordres, familles et genres. Cette systématisation fut entreprise tout d'abord par Levaditi qui proposa, pour les virus animaux, les groupements en virus ecto, endo ou mésodermotropes. La classification en familles, récemment proposée par les bactériologistes américains, se superpose à peu près aux groupes de Levaditi, sauf quelques exceptions.

Si l'on considère cette ordonnance en familles, nous remarquons, au point de vue qui nous intéresse, que la spécificité parasitaire n'est pas aussi strictement marquée qu'on le dit parfois. En effet, le système nerveux n'est pas perturbé par une seule famille de virus strictement neurotropes, mais aussi par d'autres. C'est ainsi que :

1° Dans l'ordre des *Rickettsiales*, le genre type *Rickettsia*, agent des typhus exanthématiques, donne des réactions extrêmement marquées au niveau de l'encéphale et caractérisées par le « *τρυφός* » constant de ces affections.

2° Si, quittant ce groupe de virus mésodermotropes, nous considérons les virus de type *organotrope* et *endodermotrope*, il apparaît que, parmi les agents pathogènes de la famille des *Charonaceæ*, non seulement les *Tarpeia*, agents des gripes, ou les *Tortor*, agents des « pestes », mais encore les espèces du genre *Charon* perturbent considérablement le système nerveux. *Charon evagatus*, agent de la fièvre jaune, présente des souches adaptées au système nerveux et le virus de la dengue, qui lui est étroitement apparenté, représente un virus qui semble être un mutant désormais à affinités surtout neurotropes.

3° Enfin, dans l'important groupe des virus *ectodermotropes*, nous trouvons de nombreux types encéphalitogènes, non seulement parmi les virus strictement neurotropes de la famille des *Erronaceæ*, mais encore parmi des virus dermatotropes purs, tels que les *Borreliotaceæ*, ou des organotropes tels que les *Rabulaceæ*. *Rabula inflans*, agent des oreillons, donne des méningo-encéphalites et ces manifestations sont les plus fréquentes après la parotidite et l'orchite.

Parmi les *Borreliotaceæ*, qu'il nous suffise de rappeler, par exemple, l'affinité bien connue du *Briareus varicellæ* pour les ganglions spinaux, où il détermine le zona, et celle du *Br. morbillorum*, qui peut donner des encéphalites, signalées comme complication de la rougeole.

Ainsi donc, nous constatons que le tropisme pour le système nerveux n'est pas uniquement l'apanage d'un genre ou d'une famille, mais que l'on peut occasionnellement rencontrer, chez des espèces de diverses origines, une adaptation provisoire, ou parfois définitive, au système nerveux.

II. - Virus strictement neurotropes

Il ne faudrait pas, en constatant ces faits, se laisser aller à une conception sceptique sur la spécificité des tropismes des différents virus ; dans l'ensemble, elle demeure et nous pouvons constater que les virus à affinité nerveuse forment un groupe assez homogène. Ce groupe est constitué par la famille des *Erronaceæ*, proposée par les bactériologistes américains. Divers auteurs y ont individualisé trois genres qui représentent assez bien trois groupes d'affections différentes. Le genre *Formido* a comme espèce type *F. inexorabilis*, l'agent de la rage ; nous pensons qu'il eût été tout naturel d'y ajouter une autre espèce, agent de la maladie d'Aujeszky, bien étudiée par Remlinger et Bailly, et peut-être même l'agent de la tremblante du mouton (« *Scrapie* » des auteurs anglais).

Le deuxième genre : *Legio*, donne des affections telles que la poliomyélite (*L. debilitans*), la chorioméningite lymphocytaire (*L. crebea*) ou même la maladie des porchers (*L. suariorum*) que d'autres considèrent comme une spirochétose due au *Leptospira pomona*, ce qui est actuellement le plus généralement admis,

III. - Virus encéphalitogènes du genre *Erro*

Les véritables encéphalites, encéphalomyélites et même le plus souvent méningo-encéphalomyélites forment un groupe homogène relevant d'espèces incontestablement très étroitement apparentées. Il était naturel de grouper les diverses espèces dans un genre commun : le genre *Erro*, créé par Holmès en 1948.

Les virus de ce groupe actuellement connus sont plus nombreux qu'il n'est généralement indiqué dans les ouvrages classiques. Avant d'en faire une étude comparée, nous indiquerons comme suit les divers types d'encéphalites et les espèces qui les déterminent :

1° La première et la mieux connue des encéphalites, celle décrite et individualisée à la fois par Cruchet à Paris et Von Oeconomov à Vienne, est l'*encéphalite léthargique*.

Cette encéphalite constitue un premier groupe à elle seule, car elle est indiscutablement contagieuse, mais l'agent n'a pu encore en être isolé.

2° Dans un deuxième groupe, nous trouvons six espèces déterminant chez l'homme des encéphalites ou méningo-encéphalomyélites typiques. Ce sont :

Erro scoticus, agent du « Louping ill », commune à l'homme et surtout au mouton.

Erro silvestris, agent de l'encéphalite de la Taïga ou encéphalite verno-estivale russe (« spring-summer encephalitis »).

Erro japonicus, agent de l'encéphalite japonaise dite du type B ou encore encéphalite automnale de l'Extrême-Orient russe.

Erro incognitus, agent de l'encéphalite australienne (« Australian X disease »).

Erro scelestus, agent de l'encéphalite de St-Louis aux U.S.A.

Erro equinus, agent de l'encéphalomyélite équine et humaine qui s'observe en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

3° Il y a lieu d'inscrire à part dans un troisième groupe :

Erro bornensis, agent de la maladie de Borna, qui n'affecte pas l'homme, mais seulement le cheval, les bœufs et moutons, et qui s'écarte aussi des autres espèces tant par sa taille que par son neurotropisme absolument strict.

4° Enfin, dans un dernier groupe, pourront être réunis provisoirement des virus rares ou connus seulement expérimentalement ;

c'est, comme type de ce groupe, *E. nili* qui a été isolé une fois d'une indigène de l'Ouganda présentant seulement de la fièvre.

Puis les virus de Bunyamwera,
de la Bwamba fever,
de la Semliki forest,
de l'Ilheus,
de Californie BFS 867,
de Mengo.

Dans les considérations qui suivront, ce seront surtout les espèces bien individualisées du deuxième groupe et pathogènes pour l'homme qui retiendront notre attention. Les autres espèces ou les autres encéphalites nous fourniront surtout des éléments de comparaison.

I. Morphologie. — La morphologie de ces organismes est surtout connue en ce qui concerne leur taille. Il y a une assez remarquable uniformité de dimensions dans les virus du deuxième groupe, à savoir : *Erro silvestris*, *E. japonicus*, *E. scelestus*, *E. equinus*, qui tous oscillent entre 20 et 33 $m\mu$. Seul *E. scoticus* présente une taille plus petite de 15 à 20 $m\mu$ et, seul des autres groupes, *E. nili* s'en rapprocherait par sa taille de 21 à 31 $m\mu$. Tous ces organismes traversent les bougies Berkefeld V.N.W., Chamberland L3, Seitz E.K. Par contre, *E. bornensis* mesure de 85 à 125 $m\mu$ et le virus de la *Bwamba fever*, de 113 à 150 $m\mu$.

II. Physiologie. — La physiologie de ces êtres est peu connue. On a surtout recherché leur résistance aux conditions du milieu extérieur. Ceci offre un intérêt pratique immédiat en ce qui concerne la conservation de ces virus qui, une fois prélevés dans leur hôte, doivent subir un transport avant d'arriver au laboratoire où ils seront étudiés. Certains se conservent bien dans la glycérine (à 50 p. 100 en général). *E. bornensis* est particulièrement remarquable à ce point de vue : il peut ainsi être conservé six mois et même un an. *E. equinus* s'y conserve également bien, ainsi que *E. japonicus* (3 mois) et même *E. scelestus* (1 mois). La plupart se conservent assez bien à la glacière après dessiccation dans le vide. Leur résistance à la chaleur montre que *E. bornensis* est un des plus résistants, puisqu'il n'est tué qu'en une heure entre 60° et 70°. *E. equinus* est déjà tué en 10 minutes à 60°. *E. japonicus*, *scelestus*, *nili* sont tués à 55°-56° en 30 minutes. *E. scoticus* est un des plus sensibles à la chaleur, il est inactivé à 58° en 10 minutes.

III. Distribution géographique. — La répartition géographique de ces espèces est très variable, ainsi que l'importance de leur extension. Alors que l'encéphalite dite léthargique, du type Von Economo, est cosmopolite, les autres sont plus généralement limitées à un continent, voire à une région. *E. equinus* et *E. bornensis* semblent avoir la plus vaste répartition géographique, le premier dans les deux continents, Amérique du Nord et Amérique du Sud, le second peut-être dans toute la zone paléarctique, en tout cas en Amérique du Nord, en Europe, en Russie et en Amérique du Sud. *E. silvestris* s'observe depuis la Russie (bassin de la Volga) jusqu'aux rives du Pacifique, région de Khabarovsk notamment. *E. japonicus* a une extension moins en latitude comme *silvestris* qu'en longitude ; on l'observe non seulement au Japon et sur les rives pacifiques du continent asiatique lui faisant face (jusqu'à Vladivostock), mais en allant vers le sud à Peiping, Shanghai, jusque dans la région de Amoï et à Formose, où on l'observe chaque été. *E. scoticus* a surtout été observé en Ecosse, mais on l'a retrouvé en Russie blanche, et il paraît exister dans toute l'Europe.

C'est déjà dans un territoire plus limité, quoique très vaste, les Etats-Unis d'Amérique, que nous trouvons signalé *E. scelestus* ; de même, *E. incognitus* n'a été observé qu'en Australie.

Les autres virus ne sont jusqu'à présent signalés qu'en des points très limités ; il en est ainsi d'*E. nili*, trouvé chez un indigène de l'Ouganda, ainsi que des virus de la forêt de Semliki et de la région de Bwanha en Afrique Orientale, de même l'*Ilheus virus* et les deux virus du Colorado, de Mengo et de Bunyamwera en Uganda.

Un seul de ces virus paraît avoir un habitat physique particulier, c'est le virus de l'encéphalomyélite verno-estivale russe, appelée encore encéphalomyélite de la taïga, parce qu'elle ne s'observe que chez les travailleurs forestiers de la zone russe du continent paléarctique.

IV. Evolution. — Dans certains cas, la maladie est endémique, se manifestant régulièrement chaque année par divers cas sporadiques, tels les encéphalites de St-Louis et de la Taïga. D'autres éclatent plus volontiers par épidémie, quoique signalés aussi chaque année ; il en est ainsi de l'encéphalite japonaise, dont certaines épidémies sont célèbres, telles celles de 1870, 1924, 1935. Celle de 1924, qui provoqua 6.000 décès, causa une véritable panique parmi les habitants du centre du Japon. Celle de 1935 ne causa pas moins de 5.000 décès. L'encéphalite léthargique est la plus typique de ce groupe et est actuellement peu signalée.

Si l'histoire de ces maladies peut être marquée de dates mémora-

bles, l'apparition au cours du *cycle annuel* ne manque pas de présenter un intérêt certain. Il est bien connu que le louping-ill apparaît surtout au printemps, que l'encéphalite de la taïga (« spring summer encephalitis ») se manifeste surtout en mai et juin ; par contre, l'encéphalite japonaise n'apparaît qu'en été et au début de l'automne, et c'est ce qui a permis de supposer, puis de vérifier, que l'encéphalomyélite estivo-automnale, que l'on observe en Extrême-Orient russe, dans les mêmes régions que l'encéphalite de la Taïga, n'est qu'une forme continentale de l'encéphalite japonaise.

De façon générale, l'encéphalite de St-Louis s'observe surtout en été et l'encéphalomyélite équine, aux Etats-Unis tout au moins, est plus particulièrement estivo-automnale. La notation du temps d'éclosion de ces épidémies ou même des cas sporadiques permet donc de soupçonner des relations avec un hôte intermédiaire ou un réservoir de virus, dont les périodes d'activité correspondent précisément à ces périodes épidémiques.

V. Espèces animales naturellement infectées. — Certains virus se trouvent hébergés, en dehors de l'homme qui n'est parfois qu'un hôte accidentel, par certains animaux qui peuvent, soit présenter des affections plus ou moins importantes, soit ne présenter aucun trouble morbide. Il est à noter que la multiplication ou la conservation de ces virus ne nécessitent pas forcément l'apparition de troubles pathologiques. L'exemple le plus intéressant nous paraît être le *virus de l'encéphalomyélite de la taïga*. C'est en effet au printemps ou au début de l'été, dans ces régions très froides une grande partie de l'année, que nous voyons se réveiller d'un sommeil hivernal ou tout au moins d'une période de ralentissement marqué du rythme vital, divers animaux qui hébergent l'*Erro silvestris* ; on a pu, en effet, le déceler chez des rongeurs surtout : campagnols tels que *Eutamias rufocanus arsejevi*, des « chipmunk », *Eutamias asiaticus* (sortes d'écureuils terrestres), chez des lièvres, des hamsters, des porcs-épics et des taupes. En Amérique du Nord, on trouve le virus de l'encéphalomyélite équine, non seulement chez les chevaux, mais encore chez divers bestiaux : bœufs, moutons, chèvres, chiens, porcs, et même des mammifères sauvages : *Rattus rattus*, *Mustela frenata*, *Microtus montanus* (« field mouse »), *Peromyscus maniculatus* (« white footed mouse »). Le virus se retrouve même chez des oiseaux tant domestiques (poulets, dindons, canards) que chez des oiseaux sauvages : un charadriidé : *Oxyechus vociferus*, un falconidé : *Falco sparverius* (« sparrow hawk »), un strigidé : *Bubo virginianus* (« great orned owl »), un phasianidé : *Colaptes cafer* (« red shafted flicker »), et enfin *Turdus migratorius*, le « robin »

bien connu des Américains du Nord (différent du « robin » des Anglais).

L'encéphalite de St-Louis présente aussi des réservoirs de virus à peu près semblables, ce sont des mammifères domestiques : bœufs, chèvres, moutons, cochons, chiens, rats d'égout ou sauvages : *Lepus californicus* (« jack rabbit »), *Sylvilagus nuttalli* (« cotton tail rabbit »), et aussi des oiseaux domestiques : oies, canards, pigeons, dindons, poulets, ou sauvages : un columbidé : *Lenaidura macrura* (« western morning dove »), les *Falco sparverius*, *Bubo virginianus*, *Lophortyx californica*, *Colaptes cafer*, et un autre picidé : *Asyndesmus lewis*, le « lewis wood pecker ».

Pour les autres encéphalomyélites, on n'a pas relevé jusqu'à présent d'aussi nombreux réservoirs de virus. On a suspecté le chien comme réservoir de virus dans l'encéphalomyélite japonaise, le mouton semble rester le seul réservoir de virus d'*Erro scoticus*. On a soupçonné le *Cercopithecus nictitans* de conserver le « Semliki forest virus ». *Erro bornensis* n'a été rencontré dans la nature que chez les chevaux, vaches, moutons et peut-être cerfs. Enfin, le virus de Californie BFS 283 n'a été trouvé que chez des moustiques et BFS 867 que chez des acariens d'oiseaux sauvages, mais ces animaux doivent plutôt être considérés comme des vecteurs de virus. On n'a pas trouvé de réservoirs de virus, semble-t-il, jusqu'à présent ni pour l'*E. incognitus* d'Australie, ni pour *E. nili*, ni enfin pour l'agent de la « Bwamba fever ».

VI. Vecteurs. — C'est alors que se pose pour l'homme la question des *vecteurs de virus* ou du mode de propagation des virus qui, se trouvant chez ces réservoirs de virus, vont pénétrer chez l'homme où ils déclenchent la maladie.

Dans ces diverses encéphalomyélites, il est à ce point de vue possible d'établir deux groupes : ceux chez lesquelles le mode de propagation nous est inconnu, il en est ainsi de l'encéphalite léthargique, type Von Economo, mais aussi d'encéphalites à virus bien individualisés tels que : *E. incognitus*, *E. nili*, *E. bornensis*, et ceux chez lesquelles des vecteurs réels ou possibles ont été vérifiés. Parmi ces maladies à vecteurs connus, se trouvent le louping-ill et l'encéphalite de la taïga. Toutes deux ont comme caractère commun d'être transmises par des tiques : l'*E. scoticus* est transmis de mouton à mouton par *Ixodes ricinus*, parfois *Rhipicephalus appendiculatus*. Il n'est toutefois pas prouvé que ces tiques soient les agents inoculateurs pour l'homme ; dans des cas récents, observés en 1948, de maladie contractée spontanément dans la nature, les malades n'ont pu signaler de piqûres préalables par des

Parmi les signes objectifs, nous relèverons :

Au niveau de la tête : le *nystagmus* et la *diplopie* qui, très fréquents dans l'encéphalite léthargique, peuvent s'observer dans l'encéphalite japonaise, mais de façon bien moins fréquente, plus rarement encore dans l'encéphalite australienne ou celle de St-Louis. L'œdème des paupières se voit dans l'encéphalite équine. Enfin, les tremblements de la tête, si marqués dans le louping-ill du mouton, sont accentués surtout au niveau des lèvres et de la langue chez l'homme, dans l'encéphalite japonaise et de St-Louis.

Au niveau du corps, les tremblements sont presque généralisés dans l'encéphalite équine, où ils peuvent se présenter sous forme de secousses musculaires violentes, et ils peuvent aboutir à de véritables convulsions dans l'encéphalite australienne.

D'ordinaire, il y a une rigidité marquée de la nuque ou des membres ; cette rigidité s'accompagnant de paralysie est nettement localisée au niveau de la nuque, de la ceinture scapulaire et du dos dans l'encéphalite de la Taïga ; elle s'observe seulement au niveau de la nuque dans la majorité des cas d'encéphalite de St-Louis, et constamment dans l'encéphalite équine. Il y a surtout des paralysies flasques dans l'encéphalite japonaise.

Au point de vue psychique, les formes légères ou les formes de début sont surtout marquées par de l'excitation, parfois du délire, mais le plus souvent s'installent de l'apathie, de la stupeur, de la somnolence, et l'évolution fatale se termine dans le coma. La somnolence, particulièrement signalée dans l'encéphalite du type Von Economo, est un aspect peu fréquent dans l'encéphalite australienne ou équine. Au contraire, les délires sont particulièrement marqués dans l'encéphalite japonaise, et à un degré moindre dans les encéphalites de la Taïga. Dans l'encéphalite de St-Louis, les malades sont tantôt délirants, tantôt somnolents.

Il y a lieu de signaler des *formes bulbaires* plus fréquentes dans l'encéphalite de la Taïga, où l'on observe alors des troubles de la respiration, de la phonation et de la déglutition qui peuvent rendre le diagnostic difficile d'avec certaines formes de poliomyélite.

La durée de la maladie est extrêmement variable dans un même type d'encéphalite : celle de la Taïga peut évoluer entre deux et dix jours ; elle dure généralement 5 à 6 jours ; par contre, il est curieux de constater que le louping-ill, considéré comme généralement très bénin, a pu offrir un cas d'infection naturelle ayant nécessité 11 semaines d'hospitalisation.

La gravité de ces infections mérite surtout d'être signalée. La maladie de Bornu n'atteint pas l'homme, le louping-ill, connu surtout comme accident de laboratoire à évolution bénigne, a été signalé récemment comme contracté dans la nature et a exigé dans le cas cité des soins prolongés. La mortalité est extrêmement variable dans le cas de l'encéphalite équine. Si elle n'est que de 5 % dans les infections avec la variété de l'Ouest, elle peut atteindre 50 % dans la variété de l'Est. Ce sont néanmoins des chiffres relativement élevés de mortalité qu'il y a lieu de relever dans ces affections : la mortalité est de 20 % dans l'encéphalite de St-Louis, de

30 % en moyenne dans l'encéphalite de la Taïga, comme dans celle du type Von Economo. Elle peut atteindre 60 % dans l'encéphalite japonaise et même 70 % des cas dans l'encéphalite australienne. Chez les animaux, elle est de 50 % dans le cas du louping-ill du mouton, de 90 % dans la maladie de Bornu, et peut même atteindre 95 % chez les chevaux atteints du virus de l'encéphalite équine.

Les suites de ces encéphalomyélites chez les sujets qui en guérissent sont variables. On connaît un certain degré d'apathie à la suite de la maladie de Von Economo, ainsi que des spasmes de torsion au niveau de la tête et du cou et même du tronc, mais surtout la complication chronique et définitive de la maladie de Parkinson. Dans les encéphalites à virus, des séquelles peuvent aussi s'observer, surtout dans les encéphalites japonaises et de la Taïga. L'encéphalite japonaise peut laisser dans 25 % des cas des séquelles qui consistent soit en troubles moteurs, tels que attitude défectueuse d'un membre, faiblesse d'un ou plusieurs membres, incoordination des mouvements, parfois même hémiplégie ou quadriplégie, soit en troubles nerveux légers comme le changement de caractère, ou plus importants, comme de l'aphasie ou de l'obnubilation mentale. Des troubles plus ou moins semblables peuvent s'observer dans 20 % des cas, à la suite d'infections par l'*Erbo silvestris*. Parmi les autres encéphalites, seule celle de St-Louis peut laisser à sa suite des troubles légers tels que somnolence, irritabilité ou perte de mémoire, mais les cas sont rares. Par contre, la guérison complète sans séquelles est de règle dans les encéphalites équine, australienne ou du louping-ill. Tous ces troubles sont la conséquence, soit d'infections qui peuvent passer à l'état chronique, cas de l'encéphalite léthargique, soit des lésions cicatricielles ou de dégénérescence qui se sont produites à la phase aiguë.

(à suivre).