ANALYSES

H. HARANT. — **Parasitologie médicale et Pathologie exotique.** Maloine S.A., édit., Paris, 1963, 5^e édit., p. 301.

Cet ouvrage résulte de la fusion de deux volumes, le *Précis de Parasitologie médicale*, qui comptait déjà quatre éditions, et le *Précis de Pathologie exotique*, dont c'est ainsi la deuxième édition. Sous cette forme il doit fournir un enseignement mieux adapté aux exigences de la nouvelle réforme des études médicales.

Le préambule trahit les préoccupations de l'auteur qui sont celles d'un naturaliste autant que d'un médecin, tendances qui s'affrontent souvent, en médecine, dans les sciences fondamentales, bien que compatibles dans les faits. Le rappel des grandes découvertes qui jalonnent, au XIX^e siècle, l'histoire de la Parasitologie montrent à l'évidence la participation importante des recherches non spécifiquement médicales (zoologiques, botaniques et biologiques). Cependant, la scission apparaît de plus en plus profonde entre la recherche proprement médicale et la recherche scientifique dite désintéressée, et il faut se féliciter de voir l'Ecole de Montpelier continuer à cultiver dans cette discipline sa double vocation.

Le plan général de ce précis comporte trois chapitres : l'étude générale d'une maladie transmissible, les maladies parasitaires cosmopolites ou localisées, les maladies tropicales non parasitaires.

L'étude d'une maladie transmissible familiarise immédiatement le lecteur avec des notions souvent inhabituelles, et dont certaines constituent l'ésotérisme de la Parasitologie médicale : citons en particulier les facteurs qui conditionnent l'épidémiologie d'une parasitose, les modalités de l'agression parasitaire (pathogénie des parasites et réactions de l'hôte) ; les grands syndromes, expression la plus fréquente de ces affections, les diagnostics de certitude ou de probabilité, les principes de conduite d'un traitement et de la prophylaxie. Il n'est presque aucun acte médical sur lequel la pénétration, l'évolution, les localisations, l'élimination, en un mot la biologie du parasite, n'aient ici leur retentissement.

L'inventaire des maladies parasitaires se divise, selon le mode classique, en quatre sections principales : l'Entomologie médicale, la Protozoologie médicale, l'Helminthologie médicale et la Mycologie médicale. On y trouvera un exposé succinct de la morphologie et l'évolution des parasites, la symptomatologie majeure des maladies déterminées, enfin, une mise au point fort utile des méthodes diagnostiques, ainsi que des thérapeutiques spécifiques ou symptomatiques les plus généralement utilisées.

Les maladies tropicales non parasitaires groupent principalement des maladies bactériennes ou virales, transmises ou non par des Arthropodes (peste, choléra, mélioiïdose, lèpre, bartonellose, borrélioses, fièvre jaune, dengue, rickettsioses, etc.), des maladies climatiques (bourbouille) ou carencielles (béribéri, scorbut, kwashiorkor, etc.), diverses hémopathies (dyshémo-globinoses F, C, S, E) dont l'électivité raciale n'est plus admise aujourd'hui sans réserve,

l'éosinophilie dite tropicale, généralement associée à un parasitisme évolutif, erratique, ou bloqué en impasse, enfin des toxicoses variées et des phénomènes d'envenimation consécutifs à des piqûres d'Arthropodes, de serpents ou de poissons venimeux.

L'ouvrage s'achève sur un bref aperçu de quelques maladies cosmopolites, fréquentes en pays tropical, telles, en particulier, celles dues à une sensibilisation du myocarde à certaines agressions infectieuses ou nutritionnelles, le cancer primitif du foie, les hépatites à virus A ou B, des méningococcies, pneumococcies, la poliomyélite, la rage, la syphilis, la tuberculose, enfin, certaines dermatoses à streptocoques et à staphylocoques.

Cette présentation rapide d'un ouvrage ne dépassant pas les 300 pages rendra compte cependant du très large éventail de connaissances que son savant auteur met à la disposition de ceux qui, pour des motifs d'information épidémiologique, clinique ou thérapeutique, seront appelés à le consulter.

A. BUTTNER.

Bilharziasis. — Symposium de la Fondation Ciba (en commémoration du centenaire de la mort de Theodor Maximilien BILHARZ). Edité par G. E. W. Wolstenholme et M. O'Connor. Londres, 1962, J. et A. Churchill Ltd. 433 p., 46 illustr., nombr. ref.

Présidé par le Professeur A. H. Mousa, ce symposium sur les bilharzioses réunissait au Caire un grand nombre de spécialistes de ce problème.

Fait historique en Egypte, et fondamental, la présence de ces maladies tropicales intéresse toutes les régions endémiques où le développement de l'économie rurale, de la productivité, l'accroissement de la population sans amélioration notable de la condition humaine, apparaissent comme des facteurs supplémentaires d'expansion et de dissémination de ces parasitoses.

Nous ne pouvons donner ici qu'un aperçu très limité des questions évoquées au cours de ce Congrès, laissant aux lecteurs attirés par des sujets particuliers le soin de se reporter au document original.

Un premier groupe de communications concerne le complexe « Mollusque-Schistosome » (écologie, biologie, dynamique des populations, et leurs incidences sur les modalités de la transmission ou la conduite de la prophylaxie).

Force a été de constater qu'en dépit du nombre et de l'importance des recherches effectuées depuis dix ans, sur ces constituantes épidémiologiques, les résultats en sont encore dispersés et nullement systématisables. Ils ne peuvent s'objectiver dans une prophylaxie lucide et souple, chaque foyer se présentant comme une entité épidémiologiquement originale. A la vérité, c'est la diversité qualitative des foyers qui rend malaisée la standardisation des méthodes préventives.

N. G. Hairston, dans un article sur l'« Ecologie des populations et problèmes épidémiologiques » pourrait apporter à ce problème une solution mathématique : l'usage de formules équationnelles, comportant un certain nombre de variables dont l'estimation dépendrait du foyer considéré, serait peut-être le moyen de couler dans un moule abstrait des données concrètes, caractéristiques d'un foyer endémique, et d'en tirer les informations théoriques et pratiques le concernant exclusivement.

C'est sous l'angle taxonomique que C. A. Wright envisage l'association Mollusque-Schistosome. D'après cet auteur, il paraît se produire, sous l'action de facteurs externes, une

évolution parallèle chez l'hôte et le parasite dépendant d'un même biotope, les liant étroitement l'un à l'autre. Cette ségrégation progressive serait à l'origine des races de bilharzies, géographiquement et biologiquement individualisées, devenues ensuite inaptes à se développer chez des Mollusques originaires d'un autre biotope. Cette adaptation irréversible peut-elle entraîner également des modifications biologiques au niveau de l'espèce ? On est tenté de l'admettre avec le Roux (1951), cité par l'auteur, qui constate en Afrique, parmi les Schistosomes humains, que *S. haematobium* est strictement inféodé au *Bulinus* groupe *truncatus*, tandis que *S. capense* (Harley, 1864) est uniquement attaché au groupe *africanus*, et pourrait acquérir de ce fait une validité spécifique ; de même, parmi les Schistosomes animaux, *S. matthei* paraît étroitement lié au complexe *africanus*, tandis que *S. bovis* semble strictement inféodé au groupe *truncatus*.

Le problème des animaux, réservoirs de Schistosomes en Afrique, est abordé par Nelson, Teesdale et Highton. Dans ce domaine, il semble que les recherches soient encore au stade de l'information, et que le rôle effectif du réservoir animal dans l'épidémiologie des bilharzioses ne puisse être estimé avec exactitude. Toutefois, les auteurs apportent diverses précisions intéressantes : ils admettent sept espèces valides de Schistosomes en Afrique : *S. haematobium*, *S. mansoni*, *S. bovis*, *S. matthei*, *S. intercalatum*, *S. rodhaini* et *S. margrebowiei*. Des animaux appartenant à six ordres différents de Mammifères (Périssodactyles, Artiodactyles, Rongeurs, Insectivores, Carnivores et Primates) ont été trouvés spontanément infestés, parmi lesquels des babouins, au Kenya, parasités dans 50 % des cas par *S. mansoni*, sont peut-être des réservoirs potentiels susceptibles de concurrencer l'homme.

Dans certains foyers africains où les Schistosomes animaux sont prédominants, l'homme est constamment exposé à l'attaque de leurs cercaires. Les expériences d'immunité croisée entre souche animale et humaine de *S. japonicum*, effectuées par Hsu et Hsu en 1961, suggèrent à N. T. et H. que des infections animales à *bovis* ou à *matthei*, se développant chez l'homme en Afrique, lui confèrent peut-être aussi une immunité préventive vis-à-vis d'infestations humaines. Le phénomène demande à être confirmé. Cependant, les auteurs pensent que cette zooprophylaxie spontanée joue peut-être dès à présent un rôle important en Afrique.

Sur les autres aspects des bilharzioses, signalons l'originalité des recherches de A. F. Shérif et S. R. Smithers concernant divers problèmes d'immunologie.

A. F. Sh. fait état des résultats obtenus par lui, par I. D. R. ou réaction de précipitation, en utilisant des antigènes nouveaux provenant de l'activité métabolique des vers. Il s'agit, soit de métabolites produits par les miracidia d'œufs incubés et tamisés de *S. haematobium*, soit d'une précipitine urinaire, isolée chez des patients infestés par *S. haematobium* ou *S. mansoni* après centrifugation lente (1 heure) et neutralisation de la couche surnageante. Cette précipitine existe chez tous les sujets présentant une bilharziose évolutive, aussi bien humaine qu'animale. L'antigène miracidien réagit dans 100 % des cas dans les bilharzioses actives à *S. haematobium*, et dans 20 % des cas dans les bilharzioses à *mansoni*. Le test se négative en dix semaines environ après un traitement curatif efficace. Si, au cours de ce traitement, il y a arrêt momentané de la ponte, le test renouvelé périodiquement traduit fidèlement la courbe de disparition et de réapparition des œufs. Il définit donc à la fois l'espèce et le stade évolutif (présence d'œufs vivants) de la bilharzie en cause. C'est un bon instrument de contrôle thérapeutique.

L'antigène urinaire est un produit métabolique des vers adultes. On verse dans un tube 0,2 ml de sérum auquel on ajoute un volume égal de la suspension de métabolites. Le tube est placé à l'étuve à 37° pendant 2 à 4 heures et donne une réaction positive quand un anneau blanc de précipitation apparaît au niveau de l'interphase. Dans ce cas également, l'auteur

insiste sur la fidélité du test. Les réactions positives se négativent en 12 semaines environ après un traitement opérant (éradication des vers), mais jamais en cours de traitement, même lorsque la ponte est provisoirement suspendue. Ce test définit le groupe et le stade évolutif (vers adultes vivants), de l'agent étiologique. Aucun de ces antigènes ne permet de mesurer quantitativement les anticorps du sérum.

L'auteur conclut en souhaitant que des recherches ultérieures sur l'action de ces antigènes métaboliques soient entreprises. L'une des voies les plus intéressantes ouvertes à cette expérimentation concerne le rôle de ces métabolites dans la résistance antiparasitaire. Thomson (1953-1954), Thillet et Chandler (1957) et enfin Kagan (1958) ont déjà démontré que la vie de souris exposées à des doses léthales de cercaires pouvait être prolongée par une immunisation préalable avec des antigènes métabolisés par les vers adultes.

Les travaux de S. R. Smithers sur la résistance acquise aboutissent à une conclusion voisine. Expérimentant sur des singes et des souris, l'auteur observe que la protection obtenue est sensiblement proportionnelle à la quantité de vers qui parasitent l'animal, à leur activité métabolique et à leur durée de survie. L'inoculation d'un matériel parasitaire tué induit peu ou n'induit pas de pouvoir protecteur. Tout se passe donc comme si le stimulus de la résistance était lié, non particulièrement à la présence de vers sexuellement mûrs ou d'œufs vivants, mais à la somme de l'activité métabolique de la masse parasitaire, quels qu'en soient les stades évolutifs. Par ailleurs, l'auteur précise que si ces antigènes métaboliques sont nécessaires pour induire la résistance, ils sont néanmoins hautement labiles et disparaissent rapidement après la mort des parasites.

W. B. de Witt présente un intéressant article sur le rôle du régime alimentaire dans des infestations bilharziennes expérimentales ou spontanées. Des régimes carencés en cystine, selenium et vitamine E, chez des animaux parasités par *S. mansoni*, perturbent profondément le développement des vers qui demeurent immatures. Des effets identiques sont obtenus par des carences protéiniques. Si l'on fait abstraction des dommages qui peuvent résulter pour l'hôte de ces carences essentielles, il faut observer que cette non-maturation des vers réduit considérablement leur pathogénie, les œufs étant la cause dominante des lésions histo-pathologiques qui se produisent dans les organes.

Dans un second groupe d'expériences, l'auteur démontre que, sous certaines conditions, le régime alimentaire de l'hôte peut aussi influencer l'efficacité d'un traitement antimonial (Fouadine) dans une infection à Schistosomes. Sur deux lots de souris infestées et traitées à la Fouadine, l'un est nourri avec un régime strictement dosé en caséine, graisses, sels minéraux et vitamines, l'autre avec un régime de formule analogue, mais vendu dans le commerce. L'efficacité du traitement s'est révélée très supérieure dans le premier lot (95 % des vers tués) que dans le second (13 %). D'autre part, une étude a été effectuée durant 15 mois, à Porto Rico, sur des sujets sous-alimentés et infestés par *S. mansoni*; elle a montré qu'une alimentation riche en protéines (viande rouge, lait, beurre, fromage, œufs) et en calories (4.000 à 5.000 par jour) potentialise rapidement les effets de la thérapeutique et accélère la restauration des fonctions hépatiques; ce qui ne se produit pas avec un régime alimentaire composé uniquement de riz et de haricots. Toutefois, cette action qualitative de l'alimentation ne se manifeste plus quand les malades sont soumis à un traitement massif (0,5 mg de stibophen par kg de poids, deux fois par jour pendant dix jours) (efficacité identique, très satisfaisante quel que soit le régime utilisé).

Une connaissance plus précise du rôle de ces facteurs nutritionnels sur le développement des vers et la réaction de l'organisme au médicament pourrait améliorer utilement la thérapeutique des bilharzioses.

Dans le domaine chimiothérapique, O. D. Standen étudie l'action spécifique du 1: 7 bis (p-aminophénoxy) heptane sur la cuticule des Schistosomes, laquelle joue un rôle essentiel dans la nutrition du parasite. L'Helminthe réagit en produisant un exsudat péricuticulaire où viennent s'agglomérer les leucocytes, entraînant progressivement la destruction du ver.

A. Abdallah et M. Saif examinent la répartition dans l'organisme humain, et l'élimination, d'un autre antimonial, le dimercaptosuccinate de sodium-124. La rétention hépatique, pendant une longue durée, de la majeure partie de la dose inoculée apparaît avec évidence, et la répétition des cures entraîne une accumulation du médicament au niveau du foie. Toutefois, cette rétention est toujours secondaire et relativement tardive. Dans les 24 heures qui suivent l'injection, 1/3 environ de la dose est éliminée par l'urine. Lorsque la dose individuelle est accrue et les cures répétées, une phase initiale et rapide d'excrétion est suivie par une phase de ralentissement relatif de l'élimination et par une rétention du produit dans les tissus. Le taux de concentration du médicament dans le sang n'est pas constant. Il dépend du mode d'inoculation (intramusculaire ou intraveineuse) et peut-être de la répétition des cures. Il ne peut expliquer clairement le mouvement de repli des Schistosomes vers la veine porte qui suit immédiatement la première administration du traitement.

Les résultats de la prophylaxie anti-mollusques sont exposés par différents auteurs, à la fois sur le plan expérimental (R. Gönnert et R. Strufe) et sur le terrain (N. Ayad, R. S. Pitchford, A. A. El Halawani). Dans une communication qui pourrait servir de conclusion aux travaux précités, D. B. McMullen constate que la lutte anti-mollusques requiert une grande variété de moyens, et, le plus souvent, doit s'intégrer dans un programme local d'aménagement du sol, des voies d'eau, compte-tenu des possibilités financières.

Un ensemble de recommandations concernant la transmission, les orientations nouvelles de l'expérimentation, les manifestations clinico-pathologiques et la prophylaxie des bilharzioses terminent ce recueil très dense qui réalise un tour d'horizon complet et dynamique sur les perspectives actuelles de cet important problème épidémiologique.

A. BUTTNER.

Satyu Yamaguti (1963). — **Systema Helminthum**, volume V: **Acanthocephala**, 423 pages et 856 figures hors-texte.

La classe des Acanthocéphales, si l'on en jugeait par les travaux antérieurs, semblait avoir tout particulièrement retenu l'attention de Satyu Yamaguti. Il convenait de le louer pour la minutie avec laquelle les descriptions étaient rédigées et l'excellence des figures qui illustraient ces textes. Nous attendions donc beaucoup de la publication du cinquième volume de la série des *Systema Helminthum* consacré aux Acanthocéphales.

Puisqu'aussi bien il nous faut faire ici œuvre non seulement d'analyste, mais aussi de critique, nous devons avouer que nous avons été déçu par cet ouvrage, sans doute parce que nous en espérions trop. Le but d'un tel travail n'est pas, bien entendu, d'apporter des idées nouvelles, encore qu'Anton Meyer et V. I. Petrotschenko l'aient fait dans leurs monographies respectives traitant du Phylum, mais, du moins, convient-il d'y admettre les notions antérieurement reçues avec un certain degré d'esprit critique.

Après une brève introduction consacrée à l'historique des études systématiques faites sur les Acanthocéphales, l'auteur rappelle très succinctement les principaux caractères morphologiques et biologiques de ces Helminthes.

Puis vient la partie essentielle de l'ouvrage qui traite de la Systématique.

Notons tout d'abord que l'auteur a tenté un effort de normalisation de la nomenclature du groupe en adoptant les décisions de Copenhague de 1963 sur la nomenclature zoologique et concernant le genre grammatical attaché aux désinences des noms génériques. Malheureusement, du moins à notre point de vue, ces décisions nous apparaissent comme aberrantes et aboutissent à corriger des noms latins donnés aux XVIII^e et XIX^e siècles par des auteurs dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils connaissaient, pratiquaient et écrivaient le latin infiniment mieux que nous, leurs successeurs de la seconde moitié du XX^e siècle. C'est ainsi que l'on a décrété que les noms se terminant par *rhynchus* seront, désormais, considérés comme neutres parce que la racine grecque est neutre. Mais, l'on sait qu'en Grec, le substantif change de genre lorsqu'il entre en composition et que, de plus, il s'agit là d'une « latinisation » considérée jusqu'ici comme un nominatif masculin de la seconde déclinaison latine. On aboutit ainsi à des binomes dysphoniques tels *Neoechinorhynchus agile* au lieu de *N. agilis* (Rudolphi 1819), *Centrorhynchus globocaudatum* et non plus l'original *Centrorhynchus globocaudatus* (Zeder 1800) (= *Echinorhynchus globocaudatus* Zeder 1800), tandis que l'on continue d'écrire *Acanthocephalus acerbus* Van Cleave 1931. Pour être logique il eût fallu pousser le paradoxe jusqu'à son terme et imposer *Acanthocephalus acerba* puisque la racine terminale du nom de genre est féminine en Grec. On ne peut raisonnablement penser que ce changement constitue un progrès. Les opinions de 1961 du *Code International de Nomenclature Zoologique* ont modifié cet état de chose puisque désormais les noms en *ides*, *istes*, *ites*, *odes*, *oides*, *rhynchus*, *somus*, *stomus* et *gnathus* sont du genre masculin.

Si l'on ne peut faire grief à Yamaguti de cette nomenclature bizarre, on est dans l'obligation de lui reprocher d'autres modifications qui sont de son fait et tout aussi contestables. Il adopte, pour les Ordres, la désinence *idea* sous prétexte que certains noms de genres se terminent en *ida*, tel *Astrida*, etc. Il fait disparaître des noms d'Ordres ou de Classes universellement adoptés depuis qu'ils ont été créés par les grands spécialistes du groupe que demeurent Anton Meyer et Harley J. Van Cleave, au profit de noms extraits d'ouvrages antérieurs. Or, à l'échelle supra-familiale, aucune loi de Nomenclature n'a jamais prescrit de respecter la priorité de ces noms antiques. Tout ceci, pour une part, contribue à nuire à la clarté de la classification utilisée.

Cette impression d'ouvrage touffu « mal aéré » est encore renforcée par l'adoption d'une typographie peu claire, ne permettant pas une vision immédiate des divisions de cette partie systématique. Le prix de cet ouvrage en librairie étant élevé, on eût pu avoir plus d'attentions envers le lecteur. Il en va de même en ce qui concerne le groupement et par planches rejetées à la fin du volume de toutes les illustrations. Il est infiniment plus agréable de trouver la figure au niveau du texte auquel elle se rapporte plutôt que d'avoir constamment à la recherche, au milieu d'une dizaine d'autres, dans une planche. La qualité de la reproduction des dessins originaux ne compense pas les inconvénients de cet irritant effort que l'on doit s'imposer.

La classification proposée par Yamaguti ne diffère guère de celle établie par V. I. Petrotschenko en 1956 et 1958. Nous-même et J. G. Baer avons maintes fois dit combien de difficultés entraîne cette classification basée plus sur l'éthologie des hôtes que sur la biologie et l'anatomie des parasites. Il faut remarquer que Petrotschenko avait basé sa systématique sur un caractère fort important qu'il a eu le grand mérite de bien mettre en lumière : la spinulation des Acanthors.

Yamaguti reconnaît quatre Ordres.

1. — *Apororhynchidea* est le premier cité et ne compte que le seul genre *Apororhynchus* Shipley 1899. Thapar (1927), Yokogawa et Morisita (1933) puis Byrd et Denton

(1949) avaient déjà voulu créer un ordre spécial pour ces formes. Or Van Cleave a montré de façon indiscutable ce qu'A. Meyer soupçonnait depuis 1931, à savoir que ce genre dérivait par spécialisation de formes voisines des *Mediorhynchus* actuels et qu'en conséquence il trouvait tout naturellement place dans l'Ordre des *Archiacanthocephala* (*Gigantorhynchidea* *sensu* Yamaguti 1963). En tout état de cause il eût été normal de placer cet Ordre après les *Gigantorhynchidea* auquel il est manifestement apparenté, alors qu'il n'a pas grand-chose de commun avec les *Neoechinorhynchidea*.

2. — *Neoechinorhynchidea* : les Acanthors sont inermes, les hôtes intermédiaires sont des Invertébrés « aquatiques » et les hôtes définitifs des Poissons, des Batraciens et des Chéloniens.

3. — *Echinorhynchidea* : les Acanthors portent des crochets céphaliques, mais le reste du tégument est inerme. Nous avons récemment montré que ce caractère n'était que partiellement exact et ne pouvait servir à individualiser une Sous-Classe ou un Ordre. Les hôtes intermédiaires sont des Invertébrés aquatiques et les hôtes définitifs des Poissons, des Batraciens, des Reptiles, des Oiseaux de mer ou des Oiseaux limicoles, voire des Mammifères, marins.

4. — *Gigantorhynchidea* : les Acanthors portent non seulement des crochets au pôle céphalique, mais également de toutes petites épines sur le reste de la surface cuticulaire. Les hôtes intermédiaires sont des Invertébrés « terrestres » et les hôtes définitifs des Oiseaux et des Mammifères également terrestres, ainsi que des Reptiles et des Batraciens ayant la même éthologie.

Si l'on ne tient compte que de la spinulation des Acanthors, on en vient à négliger d'autres caractères majeurs : morphologie du proboscis, disposition et nombre des crochets du rostre, papilles sensorielles, protonéphridies, morphologie des noyaux géants, structure et nombre des glandes cémentaires, anatomie du réceptacle, disposition des canaux lacunaires principaux et de leurs anastomoses, etc. Il ne faut pas perdre de vue que certains de ces caractères sont également liés à des structures embryonnaires et qu'ils se sont montrés, jusqu'à ce jour, parfaitement valables.

Répetons encore une fois que chez les Acanthocéphales qui se sont récemment adaptés à certains hôtes, il ne peut exister de parallélisme entre la phylogénie des hôtes et celle des parasites qu'ils hébergent. L'hôte le plus évolué ne possède pas obligatoirement l'Acanthocéphale le plus évolué, de même que ce n'est pas parce que l'Homme occupe le sommet de la hiérarchie des Primates qu'il se doit de donner asile aux espèces hyperévoluées de Nématodes. Dans chaque genre S. Yamaguti énumère les espèces décrites, classées par ordre alphabétique à l'intérieur de leurs genres respectifs. Il conserve souvent des espèces tombées en synonymie depuis longtemps, alors que ces « résurrections » ne s'imposent nullement puisque l'on ne possède sur elles aucun renseignement nouveau. Ces noms sont suivis de quelques mensurations importantes (taille du corps, nombre de crochets du rostre, dimensions des embryophores), des noms de quelques hôtes, de leur provenance géographique et des références bibliographiques les plus importantes. La bibliographie nous a paru suffisante, en particulier elle donne les références d'articles soviétiques ou japonais que nous avons toujours beaucoup de mal à nous procurer et aussi à déchiffrer.

Le volume se termine sur un index qui nous a semblé bien fourni.

En conclusion, nous considérons cet ouvrage comme une compilation qui ne saurait être négligée par ceux qui ont déjà une bonne connaissance du groupe. En revanche, il ne nous

semble pas qu'il s'agisse là d'un travail de base à recommander pour une initiation à l'étude des Acanthocéphales. Les ouvrages de Anton Meyer et de V. I. Petrotschenko demeurent pour longtemps encore des traités classiques indispensables.

Y.-J. GOLVAN.

T. S. Detinova. — **Méthodes à appliquer pour classer par groupes d'âge les Diptères présentant une importance médicale, notamment certains vecteurs du paludisme.** Organisation Mondiale de la Santé, Genève, 1963. Série de Monographies : n° 47, 220 p.

Les Entomologistes d'U.R.S.S. ont entrepris de mettre au point les meilleures méthodes pour déterminer l'importance épidémiologique des populations de vecteurs et pour évaluer l'efficacité des mesures prises contre divers Insectes Diptères dangereux pour la santé de l'homme. Cette monographie peut se résumer par les trois notions qui suivent et les conséquences qui en découlent :

1° Comment juger d'après l'aspect du système trachéen gastrique si une femelle a déjà pris un repas de sang.

Chez les femelles non encore gorgées, les trachéoles forment des boucles et spirales serrées qui constituent des réserves trachéennes permettant d'assurer une alimentation uniforme en oxygène à l'organe distendu lors de la prise du repas sanguin ; l'estomac se distend et simultanément le système trachéen s'étire. Lorsque la digestion est achevée, les trachées ne se rétractent pas et sont par conséquent beaucoup plus longues chez les femelles qui ont déjà été gorgées de sang que chez les spécimens nouvellement éclos (Detinova, 1945). En outre, l'examen de la trachéation gastrique permet de préciser la proportion de femelles hématophages en diapause ; en effet, chez les femelles gonoactives chaque repas de sang est suivi de développement ovulaire et de ponte.

2° Différenciation entre femelles pares et nullipares par l'examen du système trachéen des ovaires.

L'aspect le plus caractéristique du système trachéen des ovaires est la présence à l'extrémité des trachées les plus fines, de pelotes résultant de l'enchevêtrement de trachées et trachéoles extrêmement ténues. La présence de pelotes caractérise toutes les femelles nullipares, y compris les Insectes ayant hiberné. Les modifications les plus importantes pendant le premier cycle trophogonique se produisent dans les parties terminales des trachées. Lorsque les follicules augmentent de volume, les pelotes se dévident ; au terme de la première oogenèse, elles sont entièrement dévidées. On peut donc conclure à la possibilité de distinguer avec certitude les femelles nullipares des femelles pares d'après l'état du système trachéen des ovaires (Detinova, 1942).

3° Détermination de l'âge physiologique des femelles d'après le nombre de dilatations des ovarioles.

La plupart des Diptères hématophages (Orthoraphes), c'est-à-dire Culicidés, Phlébotomes, Simulidés, Héléidés, Tabanidés, présentent le phénomène de la « concordance trophogonique »,

terme qui se réfère à l'étroite corrélation entre le processus de digestion du sang et le développement des ovaires. Un repas de sang complet est nécessaire à la maturation d'une ponte d'œufs. La période qui s'écoule entre le commencement d'un repas sanguin et le suivant constitue un cycle trophogonique. Le nombre de cycles accomplis par la femelle représente son âge physiologique. Chez les Diptères hématophages à concordance trophogonique, la détermination de l'âge physiologique des femelles permet d'établir le nombre de repas sanguins pris par les femelles, c'est-à-dire d'évaluer leur importance épidémiologique.

Dans les ovarioles se produisent des phénomènes irréversibles liés au passage des œufs mûrs (Polovodova, 1947-1949). On peut établir en fonction de ces modifications l'âge physiologique des femelles, c'est-à-dire déterminer le nombre des ovipositions de chacune d'elles.

Après la sortie de l'œuf mûr, on trouve à l'endroit de son développement une dilatation ampullaire. Le nombre de ces dilatations est égal au nombre des cycles (voir tableau 2, page 120).

Pour établir l'importance épidémiologique des vecteurs du paludisme, il est nécessaire de savoir :

1) La durée de la sporogonie à partir de chaque jour d'infection possible pendant toute la saison (méthodes Moshkovsky et Rashina, 1951, d'Oganov et Rayevsky, 1947) (voir tableaux 4, 5 et 6) ; l'ensemble du processus de sporogonie s'étend à partir de la prise d'un repas sanguin par la femelle sur un sujet atteint de paludisme jusqu'à l'apparition de sporozoïtes dans les glandes salivaires de cette femelle. Dès lors, celle-ci est épidémiologiquement dangereuse.

2) La durée des cycles trophogoniques également pendant toute la saison (méthodes exposées dans cet ouvrage d'après les observations de Beklemishev, 1944, Zviangintzev, 1946, Rashina, 1951, Shlenova, 1938, West et Eligh, 1952, Detinova, 1953) ;

3) L'âge des femelles potentiellement dangereuses. Pour déterminer l'âge physiologique de ces femelles, il faut connaître :

a) la durée de la sporogonie ;

b) la durée, de chaque cycle trophogonique pendant cette période. On peut en déduire le nombre des cycles trophogoniques pendant un cycle de sporogonie et déterminer l'âge à partir duquel les femelles sont potentiellement dangereuses (tableau 7, fig. 30, 31 et 32) ;

4) la proportion des femelles potentiellement dangereuses parmi toutes celles disséquées quotidiennement (fig. 32) ;

5) le nombre des moustiques dans les abris diurnes ;

6) le degré de contact entre les moustiques et l'homme.

Il est donc possible de déterminer l'importance épidémiologique des populations de Diptères hématophages d'après leur composition par âge, âge évalué avec exactitude. Après chaque campagne de démoustication, il est capital de juger l'efficacité des mesures prises (Beklemishev 1960, Markovitch et Bandin 1960). Un emploi correct des insecticides rémanents type D.D.T. ou H.C.H. doit être suivi :

1) d'une forte diminution du nombre absolu des femelles (Fig. 33 p. 161. Detinova 1948, Essais d'éradication de l'Institut de Paludologie de 1947, 1949).

2) de la quasi-disparition des femelles ayant pondu 4 fois et plus (voir p. 166).

- 3) d'une augmentation relative très nette des femelles nullipares.
- 4) enfin, de la non-réapparition de nouveaux cas de paludisme.

Cet ouvrage présente donc un très grand intérêt, tant au point de vue entomologique que médical.

Il semble constituer un document objectif puisqu'il s'appuie sur une expérimentation d'un quart de siècle, au cours de laquelle un grand nombre de spécimens ont été disséqués (plus de 30.000 entre 1949 et 1954).

De très nombreux tableaux et figures agrémentent le texte et concrétisent certaines données théoriques.

Pour compléter ce travail, on trouve *in fine* une bibliographie détaillée (pages 173 à 194), et une annexe (pages 197 à 213) composée de notes du Professeur D. S. Bertram sur la structure des ovaires et ovarioles de moustiques et d'un glossaire).

Roger MERCIER.

M. THIBAUT. — **Les maladies par allergie mycosique**, Lib. Arnette. Edit., Paris, 1963, 233 p.

Dans ce travail très documenté, Mlle Th. présente une description d'ensemble, morphologique et biologique, des principales espèces de Champignons allergisants, ainsi qu'une synthèse clinique des troubles d'origine fongique relevant du mécanisme de la sensibilisation, troubles pour lesquels l'auteur, reprenant la terminologie d'E. Brumpt, propose le nom de « mycétides ». Les espèces fongiques allergisantes s'observent pour la plupart, d'après cet ouvrage, chez les Adélomycètes (*Fungi imperfecti*), mais aussi chez certains Champignons supérieurs (Zygomycètes, Ascomycètes, Basidiomycètes).

Leur origine, le plus souvent extérieure à l'homme (air, sol, habitation, animaux, plantes), rend compte de la souillure toujours possible de l'environnement immédiat des sujets atteints.

L'auteur étudie les facteurs déterminants de cette agressivité fongique : facteurs extrinsèques résultant du climat (humidité, brouillard) ou de la profession (certains métiers favorisant le contact journalier avec les spores de champignons) ; facteurs intrinsèques, agissant en synergie, et définissant le terrain allergique propre aux mycétides. Citons à cet égard la race, le sexe (sensibilité plus grande du sexe féminin), l'âge (maxima entre 25 et 50 ans), et surtout des facteurs pathologiques personnels (infections, troubles hormonaux ou métaboliques, incidents post-thérapeutiques influençant le développement de la flore mycosique).

Les phénomènes immunologiques au cours des mycétides sont également analysés : la composition des antigènes allergisants d'origine fongique est mal connue et leur spécificité discutée ; il semble que les produits métaboliques des moisissures n'aient pas la même antigénicité que les substances sensibilisantes apportées directement par les spores ou les fragments mycéliens. On admet la notion d'une sensibilisation de groupe tout en reconnaissant l'existence de facteurs spécifiques pour certaines espèces d'*Aspergillus*, de *Penicillium*, de *Cladosporium*.

L'auteur passe en revue les principaux types d'allergie dans les mycétides : allergies cutanées, muqueuses, respiratoires, digestives, nerveuses et sensorielles, cardio-vasculaires, urinaires, articulaires, et qui sont illustrées *in fine* par 47 observations personnelles.

Le diagnostic de ces manifestations repose essentiellement sur l'anamnèse, la séméiologie, les tests (cutanés, muqueux, respiratoires, etc.). Les prélèvements, cultures et inoculation à l'animal des produits pathologiques, la recherche du pouvoir histaminopexique du plasma chez le malade (50 % chez le sujet normal ; ≤ 5 % chez le sujet allergique) contribuent en outre à orienter la conviction du praticien.

Deux chapitres intéressants sont consacrés au traitement des mycétides et à la désensibilisation spécifique.

La thérapeutique consiste à traiter les foyers infectieux primaires, mycosiques en particulier lorsqu'ils existent, et à neutraliser les complications allergiques par des produits appropriés (théophylline pour l'asthme, anti-histaminiques variés pour les autres types d'allergie).

Une modification du terrain doit être poursuivie parallèlement par un traitement général de l'allergie et une désensibilisation progressive avec l'allergène spécifique : des injections répétées suscitent l'apparition d'anticorps « bloquants » qui « copulent » avec l'allergène agresseur et le rendent inoffensif. Ces anticorps tampons entre les antigènes et anticorps naturels déterminent peu à peu une véritable mithridatisation de l'organisme sans accroître pour autant le degré d'immunité. Il s'agit davantage, observe l'auteur, d'une hyposensibilisation que d'une désensibilisation vraie. La mise en application de ce traitement est longue et délicate. Les premiers effets en sont souvent labiles et nécessitent alors des cures d'entretien. Une importante bibliographie complète utilement cette étude dont l'intérêt et l'originalité n'échapperont pas aux chercheurs, ni aux cliniciens.

A. BUTTNER.