Contribution à l'étude
des *NYCTERIBIIDAE* et des *STREBLIDAE* (DIPTERA, PUPIPARA)
du Congo-Léopoldville
Raymondia boquieni *nv. sp.*

Par C. VERMEIL

Le Docteur J. Cooreman, sous-directeur du Laboratoire d'Entomologie à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, a bien voulu nous confier l'étude d'une collection de Diptères pupipares récoltés sur des Chiroptères du Congo-Léopoldville, grâce au concours du Père Anciaux de Faveaux, ces prélèvements relevant d'une étude générale de la faune cavernicole congolaise.

Ce matériel comprend 77 exemplaires, soit 50 *Nycteribiidae* et 27 *Streblidae*.

Si les lieux de capture sont bien définis, il n'en a pas toujours été de même des hôtes.

Il sera ainsi question pour les premiers :

Grotte III de Mulungwishi.
Grotte de Mwela-Pande (Tenke).
Grotte de Shinkolobwe.
Grotte de Panda.
Grotte aux Cervettes Pempéré et Jadotville.
Grotte Kalomoni à Jadotville.

Quant aux hôtes, il s'agira de *Nycteridae*, de *Rhinolophidae* (*Rhinolophus hildebrandti*), d'*Hipposideridae* (*Hipposideros caffer*), enfin de *Vespertilionidae* (*Miniopterus* sp.).

Nous avons, pour mener à bien cette étude, utilisé les travaux remarquables de Jobling et de Théodor qui ont eu l'occasion d'observer un abondant matériel en provenance du Congo-Léopoldville. Nous ajouterons donc dans ce texte les quelques particularités qu'il nous a été possible d'observer, ainsi que la définition d'une espèce nouvelle.

Nous n'avons par là d'autre prétention que de compléter l'œuvre qui a été entreprise par les auteurs précités sur les Diptères pupipares parasites des Chiroptères de ce pays. Nous remercions bien vivement M. W. Aellen, Conservateur au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, de ses conseils et de ses indications bibliographiques.

I. — NYCTERIBIIDAE

PENICILLIDIA FULVIDA Bigot, 1885

Quatre exemplaires :

- une femelle sur *Miniopterus* sp., grotte Kalomoni, à Jadotville (6-1960) ;
- un mâle sur *Miniopterus* sp., grotte de Mwela-Pande, à Tenke (6-1959) ;
- deux femelles sur *Nycteridae*, grotte de Mwela-Pande, à Tenke (12-1959).

THORAX.

L'examen de ces exemplaires nous permet de noter que la face antérieure des fémurs est couverte de longues soies selon une valeur décroissante : F1 en est recouvert sur plus de la moitié distale, F2 sur plus du tiers distal et F3 seulement sur le quart distal. Les quatre rangées de longues soies implantées sur la surface distale et ventrale des tibias sont faites chacune de cinq à six éléments. Les trois dernières rangées distales sont faites d'éléments plus longs que la largeur du tibia et dépassant le sommet de celui-ci, ce caractère valable pour les tibias 2 et 3, pour le tibia 1 les deux dernières rangées distales seulement présentent cette structure.

ABDOMEN - FEMELLE.

Le tergite 1 présente une rangée postérieure de 23 soies, le tergite 2 une rangée postérieure simple de longues soies, des soies courtes recouvrent la surface postérieure de ce tergite, remontant au centre pour former une image en triangle avec une bande médiane moins fournie. Le tergite 3 ne présente pas de division en sclérites latéraux il est porteur d'une triple rangée de soies postérieures.

ABDOMEN - MALE.

Les pinces hypopygiales sont couvertes de longues soies sur les trois quarts basaux de la surface dorsale. La surface ventrale de l'aedeagus est pourvue de petites dents qui, non seulement occupent sa partie médiane, mais aussi remontent vers la partie apicale et sont là de plus en plus petites et espacées. Les soies du bord dorsal des paramères sont irrégulièrement implantées.

PENICILLIDIA PACHYMELA Speiser, 1901

Deux exemplaires mâles, l'un sur *Hipposideros* sp., grotte de Mulungwishi (10-1959), l'autre sur un hôte non précisé, grotte de Shinkolobwe (6-1960).

THORAX.

Les fortes soies incurvées des deux rangées distales à la surface ventrale des tibias sont au nombre de quatre par rangée et dépassent nettement l'extrémité du tibia.

ABDOMEN.

Au niveau du tergite 1, nous n'observons pas de rangée régulière de soies prémarginales, il existe de courtes et rares soies sur la surface de ce tergite.

La dénudation médiane des tergites 2 et 3 est peu marquée.

La face ventrale des pinces hypopygiales est nue sur la partie médiane et sur toute la hauteur. Les deux bandes de la phallobase s'unissent à la base pour ensuite former deux diverticules divergents. La surface ventrale de l'aedeagus présente une plage de petites dents en épine de rosier formant une courte pointe en direction de l'extrémité apicale de cet organe, mais elle ne remonte pas comme c'est le cas chez *Penicillidia fulvida*. Les paramères sont très nettement triangulaires sans qu'il y ait de dents individualisées à la pointe. Les paramères ont une incurvation interne. L'implantation des soies au bord dorsal des paramères est plus régulière que dans l'espèce précédente.

NYCTERIBIA SCHMIDLII SCOTTI Falcoz, 1923

Quinze exemplaires : six femelles, neuf mâles, récoltés sur *Miniopterus sp.* de la grotte Kalomoni à Jadotville (6-1960).

ABDOMEN - FEMELLE.

Le tergite 3 présente quatre longues soies postérieures, les deux soies médianes sont séparées par deux à trois épines. Le tergite 4 présente de six à huit longues soies postérieures et de onze à quinze épines, les deux soies médianes séparées par deux à trois épines. Les lobes anaux portent de trois à quatre longues soies.

La plaque génitale porte de trois à cinq soies.

ABDOMEN - MALE.

Les tergites 4 et 5 portent quatre longues soies postérieures séparées par des épines allongées, les deux soies médianes séparées par deux épines.

Le tergite 6 porte une rangée marginale de soies postérieures modérément longues avec un espace médian glabre plus ou moins prononcé selon les exemplaires.

Le sternite 5 porte de onze à quatorze épines postérieures formant une rangée irrégulièrement implantée. La membrane dorsale de l'aedeagus est munie à la base de dents aiguës très espacées, au nombre de 7 à 14×2 . Il existe deux épines apicales espacées à l'extrémité des paramères. L'aedeagus porte une extrémité bifide généralement très marquée, plus rarement peu prononcée.

NYCTERIBIA groupe SCISSA

A. — Exemplaires mâles.

Onze exemplaires :

neuf sur *Nycteridae*, grotte de Mwela-Pande (Tenke) (12-1959) ;
deux sur *Rhinolophus hildebrandti*, grotte de Shinkolobwe (6-1960).

La clef de détermination de Théodor nous dit :

Pour le groupe *N. scissa* Speiser, 1901 : la rangée postérieures d'épines du sternite 5 est faite d'épines très longues, longues et plus courtes, l'indentation médiane est étroite, ceci s'opposant aux caractères suivants valables pour l'espèce *N. hoogstraali* Theodor, 1957 : seulement de courtes soies, pas d'épines au bord postérieur du sternite 5 (quelques-unes d'entre elles sur les côtés, intermédiaires entre la soie et l'épine très longue).

Nous n'avons guère trouvé que deux exemplaires qui correspondent au caractère donné pour *N. scissa*, c'est-à-dire ayant une rangée postérieure au 5^e sternite qui ne soit faite que d'épines au moins dans la région médiane ou médiolatérale. Chez tous les autres exemplaires se trouve souvent sans ordre un mélange de soies et d'épines de divers calibres. Même chez un exemplaire se rapprochant le plus de la définition de l'espèce *hoogstraali*, existent quelques épines minces et courtes, ne serait-ce qu'à l'angle de l'encoche. Toutes les combinaisons peuvent être ainsi trouvées quant aux proportions de soies et d'épines et quant aux formes de transition entre les soies et les épines.

— L'examen des paramères dont les structures ont été de même proposées comme critères de différenciation, qu'il s'agisse des exemplaires les plus proches de la définition de *N. scissa* ou qu'il s'agisse de ceux les plus proches de *N. hoogstraali*, révèle l'existence de formations de 176 microns (alors que l'aedeagus mesure 266,5 microns), présentant une extrémité comparable fine et stapulée (même chez les exemplaires les plus proches de *N. scissa*).

— Nous notons que les pinces hypopygiales présentent à leur face ventrale, chez les formes plus proches de la définition de *scissa*, de courtes soies disposées irrégulièrement, plus nombreuses vers l'apex qu'à la base, et que le processus postérieur de l'arc basal est légèrement plus long chez les formes proches de *N. scissa* que chez les formes proches de *N. hoogstraali*.

Nous avons étudié les structures abdominales autres que génitales, en fonction de trois catégories d'individus, selon la disposition de la rangée postérieure d'épines ou de soies du 5^e sternite : c'est-à-dire d'abord les plus proches de *N. scissa* (a), puis les plus proches de *N. hoogstraali* (b), enfin les spécimens intermédiaires (c) entre ces deux définitions.

a) Spécimens proches de *N. scissa*

Cinq spécimens : quatre trouvés sur *Nycteridae*, un sur *Rh. hildebr.*

THORAX.

Il existe une soie notopleurale surnuméraire, unilatérale, au niveau de la suture mésopleurale, observée chez trois individus sur cinq.

ABDOMEN.

Le tergite 2 est complètement divisé mais les deux parties sont contiguës, il existe de douze à treize soies marginales postérieures longues et minces pour chaque moitié du tergite. Des soies plus ou moins longues selon les exemplaires vont couvrir toute la surface de ces dernières.

Les tergites 3 et 4 sont divisés mais les parties sont contiguës ; sur le tergite 3, il existe des petites soies sur les deux tiers ou les trois quarts médians ; sur le tergite 4, il y a quelques petites soies aux deux tiers médians : le tergite 5 ne présente pas de ligne de suture, quelquefois un repli témoin d'une zone amincie, il y existe quelques soies médianes, ceci réduit à une ou deux petites soies médianes submarginales. Le tergite 6 est non divisé et nu, il existe quelquefois quatre à cinq petites soies en rangée submarginale (ceci valable pour l'exemplaire s'éloignant le plus de la définition de *N. scissa*), la concavité du bord antérieur est peu marquée.

Le sternite 1 + 2 présente une cténidie de 42 dents.

b) *Spécimens proches de N. hoogstraali*

Quatre spécimens tous trouvés sur *Nycteridae*.

THORAX.

Deux exemplaires sur quatre vont présenter une soie notopleurale surnuméraire, interne, unilatérale, au niveau de la suture mésopleurale. Le groupe des petites épines au tibia 1 est dans le tiers proximal, au tibia 3 dans la moitié distale de la surface dorsale.

ABDOMEN.

Le tergite 2 est complètement divisé mais les deux parties sont contiguës ; des soies plus ou moins longues selon les exemplaires couvrent ce tergite.

Le tergite 3 est divisé mais les parties sont très proches ou contiguës, il y a de petites soies quelquefois plus longues sur les trois-quarts ou la totalité du tergite.

Le tergite 4 présente une ligne de suture médiane mais pas de vraie division, des soies assez courtes aux deux-tiers médians, ou seulement médianes.

Les tergites 5 et 6 sans suture, quelquefois au tergite 5 la suture est seulement amorcée ou bien il existe un pli. Il y a des soies médianes quelquefois groupées en une rangée transversale. Le tergite 6 est nu, il peut y exister une ou deux petites soies médianes submarginales postérieures.

Sternite 1 + 2 : cténidie de 38-40 dents. le sclérite post-stigmatique porte quatre soies (dont une intermédiaire entre soie et épine). Sur le 5^e sternite : antérieurement au groupe d'épines, une double rangée de soies longues et courtes, quelques soies plus petites au tiers antérieur de la surface du sternite.

c) *Spécimens intermédiaires*

Deux spécimens : un trouvé sur *Nycteridae*, un sur *Rh. hildebr.*

ABDOMEN.

Tergite 2 divisé mais les parties sont contiguës ; sur un exemplaire la division est réduite à une ligne de suture, des soies assez longues sur toute la surface.

Le tergite 3 est divisé mais les parties sont rapprochées, soies sur les deux tiers, ou les trois-quarts médians, mais une rangée s'étend sur toute la longueur du tergite.

Le tergite 4 est divisé, la division réduite quelquefois à une ligne de suture, quelques soies en une ou deux rangées médianes ou réparties sur la moitié médiane de chaque partie.

Tergite 5 : ligne de suture ou pli, de trois à neuf petites soies médianes.

Tergite 6 : non divisé, de trois à six petites soies en rangée médiane submarginale.

Le sternite 1 + 2 présente une cténidie de 39-40 dents.

B. — *Exemplaires femelles.*

1) Un exemplaire sur A. 1587 [Grotte de Mwela-Pande (Tenke)] (11-1959).

Il répond à la définition de *N. scissa* Speiser 1901.

On peut observer au niveau du thorax une soie notopleurale surnuméraire de chaque côté.

Au niveau de l'abdomen, c'est au tergite 3 que l'on remarque les plus nettes variations : au bord marginal postérieur de celui-ci existe une véritable rangée de soies et non pas deux lots nettement séparés de ces éléments : deux longues soies, deux moyennes, une plus courte, deux épines. Sur la surface de ce tergite, trois petites épines sont observées.

La partie ventrale de l'abdomen correspond bien à la description, nous notons trois soies sur le sclérite post-stigmatique, dont la distale est la plus courte.

Nycteribia scissa tergite 3

2) Neuf exemplaires : huit sur *Nycteridae*, grotte de Mwela-Pande (Tenke) (12-1959) ; une sur *Rhinolophus hildebrandti*, grotte de Shinkolobwe (6-1960).

Là aussi existent des formes assimilables à la définition de *N. hoogstraali* et des formes intermédiaires entre cette dernière forme et *N. scissa*.

THORAX.

Pas de soies notopleurales surnuméraires.

ABDOMEN.

Tergite 1 : de six à onze soies marginales postérieures pour chacun des deux lots, cinq petites soies par demi-surface.

Tergite 2 : de sept à onze soies marginales postérieures par demi-surface, il est incomplètement divisé. Toujours par demi-surface : de vingt-deux à vingt-cinq petites soies surtout médianes et paramédianes. Petites soies sur toute la surface antérieure au 3° tergite ; très peu de zones dénudées avant ce dernier (chez quelques exemplaires).

Tergite 3 : deux longues soies, deux petites soies courtes, chez deux exemplaires, une petite soie surnuméraire interne. Chez un exemplaire à soie surnuméraire, le tergite 3 (254,5 microns) est aussi grand qu'un des sclérites du segment anal.

Plaque génitale ventrale particulièrement craquelée.

Les sclérites péri-anaux portent sept soies sur la surface et postérieurement deux longues soies, quelquefois une.

Le sternite 1 + 2 porte une cténidie de 42 dents. Sclérite post-stigmatique étroit et droit portant quatre soies (deux longues, deux courtes). Le sternite 5 : deux sclérites assez gros se rejoignant presque : une seule grosse soie entre les deux.

Les sclérites du 7° sternite portent trois à quatre longues soies et une courte postérieurement.

Puisque l'on retrouve autant de caractères intermédiaires entre les deux définitions pourtant si proches de *scissa* et de *hoogstraali*, pourquoi ne retiendrait-on pas cette dernière comme une sous-espèce appartenant au complexe *scissa* ?

***EUCAMPSIPODA AFRICANUM* Theodor, 1955**

Huit exemplaires : quatre femelles et quatre mâles, sur A. 1620, grotte de Panda (12-1959).

ABDOMEN - FEMELLE.

Deux à trois longues soies au bord postérieur de la surface épineuse dorsale de l'abdomen. Le tergite 6 présente de six à sept soies.

La plaque médiane du sclérite anal porte deux soies moyennes au bord postérieur et quatre à cinq petites épines sur sa surface, quelquefois en disposition médiane grossièrement linéaire. Dans un cas, une de ces épines est insérée pratiquement entre les deux soies moyennes, dans un autre cas, la pointe d'une de ces petites épines se prolonge entre les deux soies moyennes.

Plaques génitales : la plaque ventrale est en deux ailerons portant chacun de six à sept épines, dont la taille va du simple au double, et irrégulièrement implantées, la plaque dorsale est bien arrondie, présentant dans un cas un épaississement médian.

ABDOMEN - MÂLE.

Tergite 4-6 : les longues soies ne sont pas strictement médianes mais latéro-médianes.

Le sternite 5 présente un prolongement grossièrement triangulaire au milieu de la marge postérieure avec deux longues soies à chaque pointe latérale ; entre ces deux dernières, se trouvent deux soies latérales moyennes et quatre soies centrales plus fines.

Les pinces hypopygiales présentent sept épines en patère à la rangée latéro-dorsale, huit épines en patère à la rangée latéro-interne, dont quatre petites apicales et quatre plus grosses médianes.

A la surface interne des pinces hypopygiales, une rangée de soies s'étendant de l'apex à la base, la soie apicale est médiane, les autres sont latéro-externes.

La surface barbulée de la membrane de connection est en deux zones à peu près symétriques et représente les deux-tiers de la longueur de l'aedeagus (ce dernier : 0,44 mm).

Les paramères présentent de trois à quatre petites soies implantées en quinconce.

II. — STREBLIDAE

NYCTERIBOSCA AFRICANA (Walker, 1849) Speiser, 1900

Six exemplaires :

deux femelles et trois mâles sur *Nycteridae*, grotte de Mwela-Pande (Tenke), (12-1959) ;

un. femelle sur *Hipposideros caffer*, Grotte Defrennes Pempéré (Jadotville).

Nous n'avons à ajouter à la description que les quelques détails suivants : le 7^e sternite est nettement triangulaire, les longues soies y sont, non seulement postérieures, mais apparaissent dès la partie médiane du sternite.

L'apex de la gonapophyse droite est à pointe ventrale très adoucie, l'aedeagus apparaît à la dissection nettement « enfourché » par les deux gonapophyses.

5

17microns

Nycteribosca africana, Extrémité de la gonapophyse droite

RAYMONDIA SETILOBA Jobling, 1954

18 exemplaires :

onze femelles et cinq mâles sur *Nycteridae*, grotte de Mwela-Pande (Tenke) (12-1959) ;

un mâle sur *Rhinolophus hildebrandti*, grotte de Shinkolobwe (6-1960) ;

une femelle sur *Rhinolophus hildebrandti*, grotte aux cervettes (Pempéré) Jadotville (8-1960).

TÊTE :

Dorsalement, il nous paraît que l'espace entre les deux latéro-vertex est assez important, il existe sur la face dorsale de ces latéro-vertex cinq soies de première grandeur.

THORAX.

Longueur : 0,53 mm ; largeur : 0,63 mm.

Aile de 1,8 mm. A noter l'existence d'épines dans la 5^e cellule postérieure, non seulement marginales, mais aussi submarginales, ces dernières pouvant être réduites à une ou deux unités. Les épines marginales peuvent aussi être réduites à quelques unités. Vu une fois : un triangle de sept à dix soies.

FIG. 1. — *Raymondia setiloba*, Tête : latéro-vertex

FIG. 2. — *Raymondia setiloba*, Thorax dorsal, soies périphériques

FIG. 3. — *Raymondia setiloba*, 10^e sternite et cerques

FIG. 4. — *Raymondia setiloba*, 10^e tergite et cerques

On peut en outre y relever la présence d'épines marginales et submarginales (de une à trois) dans les cellules 3° et 4° postérieure et aussi dans la cellule costale. Allula sans soie.

La partie dorsale du thorax présente des soies disposées selon le schéma suivant :

- aux angles intérieurs : une soie assez longue la plus externe, quatre petites soies à l'intérieur de la précédente ;
- aux bords médians et latéraux : cinq soies moyennes dont la troisième est un peu plus forte ;
- aux angles postérieurs : deux fortes soies, deux soies marginales postérieures.

Le scutellum présente dans sa partie médiane deux longues soies séparées par deux petites. Dans les parties latérales, trois à quatre petites soies, dont la plus externe est la plus forte.

ABDOMEN.

Les soies latéro-dorsales sont presque aussi fortes que les soies fortes du 2° tergite les précédant.

FEMELLE.

Proctiger : large de 0,185 mm.

Chaque cerque porte trois petites soies et une ou deux épines à la partie médiane, les soies étant insérées sur le bord postérieur des cerques.

L'observation minutieuse permet de remarquer que la répartition de ces soies correspond aux insertions suivantes : deux soies côté ventral, une soie côté dorsal pour une cerque, l'autre cerque pouvant alors présenter la disposition inverse.

Il existe une soie à l'apex des cerques sur le côté dorsal.

10° tergite avec six longues soies.

10° sternite avec quatre soies.

MALE :

L'extrémité des claspers est arrondie, elle est hérissée d'environ dix petites soies espacées. Apodème de l'aedeagus : 0,28 mm ; apodème des gonapophyses : 0,19 mm ; aedeagus : 0,24 mm ; gonapophyse droite : 0,29 mm ; quinze soies marginales irrégulièrement implantées.

RAYMONDIA SIMPLEX Jobling, 1955

Un exemplaire mâle sur A. 1630-1640, grotte Mulungwishi (12-1959).

Nous noterons sur notre exemplaire la présence, au niveau de l'aile, de quelques épines groupées en rangée dans les cellules humérales et costales. Dans la 5° cellule postérieure, les épines sont sur une demi-rangée marginale, quatre ou cinq d'entre elles étant ensuite distribuées irrégulièrement sur la surface apicale de la cellule.

L'apodème des gonapophyses : 312,6 microns.

La gonapophyse droite : 211 microns, l'extrémité en est légèrement infléchie. Il y a huit soies implantées irrégulièrement sur la plus grande courbure et trois soies plus petites sur la petite courbure.

L'apodème de l'aedeagus : 279 microns.

L'aedeagus : 194 microns ; celui-ci va, dans son extrémité apicale, se superposer assez exactement au trajet de la gonapophyse gauche et arriver ainsi approximativement aux trois-quarts de la longueur de la gonapophyse droite.

RAYMONDIA WATERSTONI Jobling, 1931

Un exemplaire femelle sur A. 1708 (*Hipposideros caffer*), grotte Defrennes Pempéré (Jadotville) (8-1960).

Cet exemplaire répond bien à la définition de l'espèce :

- les soies des deux rangées longitudinales de la surface dorsale de l'abdomen sont très petites, et ceci immédiatement derrière les lobes du 2^e tergite, l'apex du proctiger est légèrement plus large que sa partie basale, il n'y a pas d'allula ;
- la tête et le thorax correspondent à la description de l'auteur avec les quelques différences suivantes : les soies de la marge postérieure du scutellum sont plus longues qu'il n'est porté sur la représentation de Jobling ; au niveau des ailes, il existe deux épines dans la 5^e cellule postérieure, qui sont nettement détachées de la rangée marginale, et en position submarginale. Le calypteron présente trois fortes soies, une apicale et deux basales, à la partie médiane se trouvent deux soies moyennes et une troisième soie plus petite à côté de la forte soie apicale.

La surface ventrale de l'abdomen est conforme aux remarques de l'auteur.

Le proctiger, large à son apex de 0,110 mm, présente :

- un 10^e tergite, porteur de quatre fortes et longues soies aux insertions rapprochées et équidistantes, ces soies sont rabattues, dépassant largement l'apex du proctiger, les deux latérales formant une courbure régulière.
- un 10^e sternite, porteur de trois groupes de soies : deux soies apicales, les plus fortes ; deux soies médianes, moins fortes et, à la partie latéro-basale du sternite, de chaque côté, deux petites soies.

Les cerques, au bord extérieur particulièrement arrondi, portent à la partie distale de la face ventrale trois soies fines dont la médiane est la plus courte.

RAYMONDIA BOQUIENI *nv. sp.*

Un exemplaire femelle sur A. 1630-1640, grotte de Mulungwishi (12-1959).

Notre exemplaire est proche de *Raymondia brachyphysa*. Comme cette dernière espèce, *R. boquieni* se distingue de *R. intermedia* par la présence de quelques épines

non marginales dans la 5^e cellule postérieure de l'aile. Elle se distingue en outre de *R. intermedia* et *R. simplex* par la nervure de l'aile 3^e longitudinale (R4 + 5), qui est droite comme celle de *R. brachyphysa*.

FIG. 5. — *Nycteribosca africana*, Extrémité de la gonapophyse droite

FIG. 6. — *Nycteribia scissa*, tergite 3

FIG. 7. — *Raymondia boquieni*, 10^e sternite et cerques

FIG. 8. — *Raymondia boquieni*, Tête : latéro-vertex.

FIG. 9. — *Raymondia boquieni*, Tête : partie médio-ventrale

FIG. 10. — a) *Raymondia brachyphysa*, Tête : latéro-vertex, b) *Raymondia boquieni*, Tête : latéro-vertex

FIG. 11. — *Raymondia boquieni*, Aile

La partie apicale du proctiger, très arrondie au niveau des cerques, presque demi-sphérique (0,152 mm), présente les caractéristiques suivantes : le 10^e sternite ressemble à celui de *R. intermedia* : les deux soies de la partie antérieure sont un peu moins longues que les deux soies médianes, elles-mêmes plus petites que les deux soies postérieures.

res. Ces trois groupes de soies sont équidistants. Le bord postérieur du 10^e tergite ne présente pas l'angulation de celui de *R. simplex* et ne porte que quatre fortes soies.

Comme *R. intermedia* et *R. simplex*, les longues soies sont uniformes de chaque côté de la partie nue de la surface dorsale de l'abdomen, la rangée interne faite d'éléments plus forts qu'au niveau de l'externe.

R. boquieni se distingue de *R. brachyphysa* essentiellement par la forme de la tête.

TÊTE.

Grossièrement quadrangulaire, plus large dans sa partie transverse médiane (0,287 mm), qu'à la partie basale (0,270 mm), et non trapézoïdale comme c'est le cas de *R. brachyphysa*.

Chaque latéro-vertex porte : trois soies de première grandeur, de répartition basale et latérale externe ; cinq soies de deuxième grandeur, de localisation plus antérieure.

Les soies basales fortes vont atteindre 180 microns pour la plus externe. A noter une rangée de douze soies latérales externes, de taille croissante, les plus basales fortes mais assez courtes. Il existe en outre quatorze soies plus petites réparties sur chaque latéro-vertex. Les deux lobes de ces latéro-vertex sont très rapprochés au niveau de la partie médiane.

La surface ventrale de la tête présente de chaque côté de la partie membraneuse médiane une rangée de neuf soies, la plus antérieure moyenne, les trois suivantes plus fortes, les cinq suivantes plus petites, les deux dernières droites et en forme d'épine.

Les palpes sont proportionnellement moins larges que ceux de *R. brachyphysa* et mesurent dans leur plus grande largeur 83 microns.

THORAX.

Longueur : 0,48 mm ; largeur : 0,38 mm.

Il ressemble à celui de *R. brachyphysa*.

Bord antérieur du prescutum très légèrement convexe en sa partie médiane. Aux bords latéraux : présence d'assez grosses soies, en particulier aux angles antérieurs.

Notons que le scutellum est porteur de deux petites soies symétriques, à son bord postérieur.

La surface ventrale du thorax présente des soies identiques à celles du prescutum, mais leur implantation est plus resserrée. A la partie antérieure existent deux lobes n'atteignant pas la base de la tête et qui sont plus rapprochés et plus arrondis que ceux de *R. setiloba*.

Les ailes sont identiques à celles de *R. brachyphysa* et offrent le caractère majeur de présenter une troisième nervure longitudinale droite. L'examen très attentif de cette nervure permet toutefois de déceler deux petites variations de rectitude qui se compensent, il n'existe pas la légère courbure régulièrement divergente que l'on observe sur bon nombre d'espèces voisines. Les calyptérons présentent quatre fortes soies et deux plus petites qui sont subapicales.

ABDOMEN.

Le lobe du premier tergite ne porte que quelques soies, le lobe du 2^e tergite porte des soies plus fortes, disposées selon deux demi-couronnes étagées. La première couronne porte sept soies, dont quatre internes moins fortes, la deuxième couronne porte quatre soies, dont les trois plus fortes sont internes.

Le sternite du 2^e segment abdominal présente des petites soies disposées en image triangulaire au centre, peu marquée, et des soies plus fortes au bord postérieur de ce sternite.

Le 7^e sternite porte quatre fortes soies dont l'insertion est rapprochée.

Résumé

L'étude d'un lot de 77 Diptères Pupipares prélevés sur des Chiroptères du Congo-Léopoldville nous a permis d'identifier :

Nycteribiidae :

Penicillidia fulvida Bigot,
Penicillidia pachymela Speiser,
Nycteribia schmidlii scotti Falcoz,
Nycteribia scissa Speiser,
Nycteribia hoogstraali Theodor,
Eucampsipoda africanum Theodor.

Streblidae :

Nycteribosca africana Speiser,
Raymondia setiloba Jobling,
Raymondia simplex Jobling,
Raymondia waterstoni Jobling.

Nous décrivons *Raymondia boquieni*, espèce proche de *Raymondia brachyphysa*.

Bibliographie

- JOBLING (B.), 1954. — *Streblidae* from the Belgian Congo, with a description of a new genus and three new species (Diptera). *Rev. Zool. Bot. Afric.*, 50, 89-115.
- JOBLING (B.), 1955. — New species of *Raymondia* from the Belgian Congo. *Rev. Zool. Bot. Afric.*, 51, 208-211.
- THÉODOR (O.), 1957. — The *Nycteribiidae* of the Ethiopian region and Madagascar. *Parasitology*, 47, 457-543.
- JOBLING (B.), 1956. — *Streblidae* from the French Ivory Coast, with a description of the New Species (Diptera). *Revue Suisse de Zoologie*, 63, 377-384.

- JOBLING (B.), 1931. — A new species of the genus *Raymondia* Frauenfeld (*Diptera pupipara, Streblidae*) with a note on *Raymondia quadriceps*. *Parasitology*, 23, 79-83.
- JOBLING (B.), 1936. — A revision of the subfamilies of the *Streblidae* and the genera of the subfamily *Streblinae* (*Diptera acalyptera*) including a redescription of *Metelasmus pseudopterus* coq. and a description of two next species from Africa. *Parasitology*, 28, 355-380.

(Chaire de Parasitologie et de Pathologie Exotique (P^r Claude VERMEIL)
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Nantes (L.-Atl.)