

## REDÉCOUVERTE DE DEUX STRIGEATA (TREMATODA) D'AUSTRALIE.

G. DUBOIS\*

Miss L. Madeline Angel, du South Australian Museum, à Adelaide, nous a communiqué pour identification deux matériels récoltés par I. Beveridge, dans l'intestin grêle d'un *Aquila audax* (Lath.) capturé le 8 février 1980, dans les Adelaide Hills (South Australia). Cet oiseau est le plus grand des Rapaces de ce continent.

*Strigea glandulosa* Dubois, 1937. — Trois exemplaires longs de 2,1 à 2,8 mm. (Les deux spécimens originaux, provenant d'*Haliastur sphenurus* Gould, ne mesurent que 1,5 et 1,9 mm, mais ceux que Dubois et Angel (1972) redécouvrirent atteignent jusqu'à 2,8 mm). L'hôte est nouveau.

*Neodiplostomum (Conodiplostomum) spathula australiense* Dubois, 1937. — Un seul exemplaire long de 1,95 mm. (Les spécimens originaux, provenant d'*Aviceda subcristata* (Gould), mesurent 1,53 à 1,65 mm ; ceux dont Dubois et Angel (1972) ont fait mention atteignent jusqu'à 1,75 mm). L'hôte est nouveau.

### BIBLIOGRAPHIE

- DUBOIS G. : Étude de quelques Strigéidés d'Australie et notes sur le genre *Fibricola* Dubois 1932. *Ann. Parasitol. Hum. Comp.*, 1937, *XV*, 231-247 ; 333-353.  
DUBOIS G., ANGEL L. M. : Strigeata (Trematoda) of Australian birds and mammals from the Helminthological Collection of the University of Adelaide. *Trans. R. Soc. S. Aust.*, 1972, *96*, 197-215.

---

\* Grand-Rue 12, CH-2035 Corcelles.

Accepté le 27 mai 1981.